

Lectures on Linear Algebra over Division Ring

Aleks Kleyn

E-mail address: Aleks_Kleyn@MailAPS.org

URL: <http://sites.google.com/site/alekskleyn/>

URL: http://arxiv.org/a/kleyn_a_1

URL: <http://AleksKleyn.blogspot.com/>

ABSTRACT. In this book I treat linear algebra over division ring. A system of linear equations over a division ring has properties similar to properties of a system of linear equations over a field. However, noncommutativity of a product creates a new picture.

Matrices allow two products linked by transpose. Biring is algebra which defines on the set two correlated structures of the ring.

As in the commutative case, solutions of a system of linear equations build up right or left vector space depending on type of system. We study vector spaces together with the system of linear equations because their properties have a close relationship. As in a commutative case, the group of automorphisms of a vector space has a single transitive representation on a frame manifold. This gives us an opportunity to introduce passive and active representations.

Studying a vector space over a division ring uncovers new details in the relationship between passive and active transformations, makes this picture clearer.

Considering of twin representations of division ring in Abelian group leads to the concept of D -vector space and their linear map. Based on polylinear map I considered definition of tensor product of rings and tensor product of D -vector spaces.

Key words and phrases. algebra, representation theory, linear algebra, division ring, quasideterminant, biring, system of linear equations, vector space, basis manifold

Contents

Chapter 1. Preface	5
1.1. Preface to Version 1	5
1.2. Preface to Version 2	7
1.3. Preface to Version 3	8
1.4. Preface to Version 5	9
1.5. Conventions	11
Chapter 2. Biring of Matrices	13
2.1. Concept of Generalized Index	13
2.2. Biring	15
2.3. Quasideterminant	20
Chapter 3. Representation of Universal Algebra	25
3.1. Representation of Universal Algebra	25
3.2. Morphism of Representations of Universal Algebra	27
3.3. Automorphism of Representation of Universal Algebra	38
3.4. Representation of Group	39
3.5. Single Transitive $T\star$ -Representation of Group	43
Chapter 4. Vector Space over Division Ring	47
4.1. Vector Space	47
4.2. Vector Space Type	49
4.3. $\ast D$ -Basis of Vector Space	51
4.4. $\ast D$ -Linear Map of Vector Spaces	54
4.5. System of $\ast D$ -Linear Equations	57
4.6. Rank of Matrix	59
4.7. System of $\ast D$ -Linear Equations	63
4.8. Nonsingular Matrix	65
4.9. Dimension of $\ast D$ -Vector Space	69
Chapter 5. $\ast D$ -Basis Manifold	71
5.1. $\ast D$ -Linear Representation of Group	71
5.2. $\ast D$ -Basis Manifold for Vector Space	72
5.3. Geometric Object of $\ast D$ -Vector Space	75
Chapter 6. $\ast D$ -Linear Map	79
6.1. $\ast D$ -Linear Map	79
6.2. $1 - \ast D$ -Form on a Vector space	81
6.3. Twin Representations of Division Ring	83
6.4. D -Vector Space	84

Chapter 7. Product of Representations	87
7.1. Bimodule	87
7.2. Direct Product of Division Rings	88
7.3. Direct Product of D_* -Vector Spaces	90
7.4. Morphisms of Direct Product of ${}_*D$ -Vector Spaces	93
Chapter 8. Geometry of Division Ring	95
8.1. Center of Division Ring	95
8.2. Geometry of Division Ring over Field	96
Chapter 9. Linear Map of Division Ring	99
9.1. Linear Map of Division Ring	99
9.2. Polylinear Map of Division Ring	106
Chapter 10. Quaternion Algebra	111
10.1. Linear Function of Complex Field	111
10.2. Quaternion Algebra	112
10.3. Linear Function of Quaternion Algebra	113
Chapter 11. Linear Map of D -Vector Spaces	121
11.1. Linear Mapping of D -Vector Spaces	121
11.2. Polylinear Mapping of D -Vector Spaces	124
Chapter 12. Tensor Product	127
12.1. Tensor Product of Rings	127
12.2. Tensor Product of Division Rings	130
12.3. Tensor Product of D_* -Vector Spaces	132
12.4. Tensor Product of D -Vector Spaces	135
Chapter 13. References	139
Chapter 14. Index	140
Chapter 15. Special Symbols and Notations	143

CHAPTER 1

Preface

1.1. Preface to Version 1

Starting a new journey you do not know in the beginning what to expect down the road. I started studying noncommutative algebra just out of curiosity. In the case of a module over a ring it is impossible to give the definition of basis in the way we do it in the case of a vector space over a field. I wanted to understand how the picture changes when I use division ring instead of a field.

I started from the study of systems of linear equations. I started from system of two equations in two unknowns. Even I solved system without problem, it was impossible to express this solution as the ratio of two determinants.

I understood that this problem might be interesting not only for me. I started to search for the mathematicians, who are interested in the same problem. Professor Retakh introduced me papers [7, 8] dedicated to theory of quasideterminants. It was beginning of my research in theory of vector space.

I dedicated chapter 2 to biring of matrices. There are two reasons why I study this algebra.

Suppose we are given basis in vector space. Then we can describe this transformation using a matrix. Product of matrices corresponds to the product of transformations. In contrast to commutative case it is not each time possible to represent this product as the product of rows of first matrix over columns of second one. The same time representation of matrix as

$$A = \begin{pmatrix} A_1^1 & \dots & A_n^1 \\ \dots & \dots & \dots \\ A_1^n & \dots & A_n^n \end{pmatrix}$$

depends on convention. Without loss of generality we can represent matrix as

$$A = \begin{pmatrix} A_1^1 & \dots & A_1^n \\ \dots & \dots & \dots \\ A_n^1 & \dots & A_n^n \end{pmatrix}$$

However in this case the algorithm to find product changes.

Structures like biring are known in algebra. In lattice we define operations $a \vee b$ and $a \wedge b$ which exchange places when order on the set reverses. The symmetry between $\ast$ -product and $\ast_\ast$ -product is phrased as duality principle. Subsequently I extend the duality principle to representation theory and theory of vector spaces. Without considering the duality principle the book would be four times its size, let alone the fact that endless reiterations would make the text hard to read.

According to each product we can extend the definition of a quasideterminant given in [7, 8] and introduce two different types of a quasideterminant.

The chapter 3 is review of representation theory and is basis for following chapters. We extend to representation theory convention described in remark 2.2.15. Theorem about an existence of twin representations in homogeneous space finishes the chapter.

In the chapter 4 I study a few concepts of linear algebra over division ring D . I recall definitions of a vector space and a basis in the beginning.^{1.1} Linear algebra over a division ring is more diverse than linear algebra over a field. In contrast to vector space over a field, we can define left and right vector space over an arbitrary division ring D . To make the definition of a basis stronger I turn to theory of an arbitrary system of linear equations (section 4.5) for each type of vector space. However, in spite of this diversity statements from linear algebra over a division ring are very similar to statements from linear algebra over a field.

Because I apply statements of this chapter in geometry, I will follow the same notation as we use in geometry. To write coordinates of a vector and elements of a matrix we follow the convention described in section 2.1.

We identify the vector and the set of its coordinates relative selected basis. However, they are different objects. To underscore this difference, I returned to traditional notation of vector as $\bar{a}$; at the same time we will use notation a^b for coordinates of vector $\bar{a}$.

We use the same root letter for notation of a basis and vectors which form it. To distinguish a vector and a basis, we will use notation $\bar{e}$ for the basis and notation $\bar{e}_a$ for vectors which form the basis $\bar{e}$.

Studying theory of vector space we use convention described in remark 2.2.15 and in section 3.4.

Chapter 5 is dedicated to the theory of linear representation.

The studying of a homogenous space of a group of symmetry of a D_*^* -vector space leads us to the definition of a basis of this D_*^* -vector space and a basis manifold. We introduce two types of transformation of a basis manifold: active and passive transformations. The difference between them is that the active transformation can be expressed as a transformation of an original space. As it is shown in [3] passive transformation gives ability to define concepts of invariance and of geometric object.

Based on this theory I study basis manifold, passive and active transformations in section 5.2. I study geometric object of the D_*^* -vector space in section 5.3.

We have two opposite points of view about a geometric object. On the one hand we determine coordinates of the geometric object relative to a given basis and introduce the law of transition of coordinates during transformation of the basis. At the same time we study the set of coordinates of the geometric object relative to different bases as a single whole. This gives us an opportunity to study the geometric object without using coordinates.

Chapter 6 is dedicate to $*D$ -linear map of vector spaces over division ring. This statement is basis for development of theory of twin representations of ring D . The notation that I introduced for the theory of vector space seems ponderous. However this notation is guided by the existence of twin representations.

Linear algebra over a division ring is more diverse than linear algebra over a field. Noncommutativity compels us to take care about a proper order of factors

^{1.1}You can see definitions also in [9].

in an expression. This leads not only to diversity of concepts, but also helps more clear see statements of commutative algebra.

January, 2007

1.2. Preface to Version 2

Any criminal once a while makes mistake.

When detective discovered my cap on the table, he became furious. Next time there was rain, and I left a wet track on the floor. Needless to say, I had to start from the scratch again. And I started again and again. The Tunguska Cosmic Body, an unplanned solar eclipse, ... However, finally detective did not find defects in the design.

- Tic-tac-toe, - detective sought sorrowfully.

- You were not tired to code this game? It is time to start something more deep.

Author is unknown. The art of programming.

Science research sometimes reminds programming. Complex and large project gradually becomes surrounded by code. Everything seems to be simple and clear. However, suddenly the bug appears. Fix of this bug demands to alter nearly half of the code. As the wise man observed in any software there is at least one bug, though.

When I started the research in the field of vector spaces over division ring, I saw that I stepped to terra incognita. The concept of quasideterminant extremely lightened my task. The opportunity to solve a system of linear equations made this theory very similar to theory of vector spaces over field. This gave ability to define basis and extent the concept of geometric object.

Tensors of order 2 appeared on the scene as dark cloud. Non commutability seemed to be putting on the structure of tensor insurmountable constrains. However at this time I discovered light in the tunnel.

The considering of D_* -linear maps leads to the concept of twin representations of division ring in Abelian group. Abelian group, in which we define twin representation of division ring D , is called D -vector space. Since we define multiplication over elements of division ring D from left, as well as right, then homomorphisms of D -vector spaces cannot keep this operation. This leads to concept of additive map which is morphism of D -vector space.^{1,2}

D -vector space is the best candidate for building of tensor algebra. However one more important structure was required here.

When we study rings, we study not only left or right module over ring, but bimodule also. Division ring is no exception. However if we add up the concept of the biring, it becomes obvious that it does not matter from what side we multiply.

^{1,2}Design of additive mapping which I made proving theorem 11.1.4, is instructive methodically. From the time when I started to learn differential geometry, I accepted the fact that we can everything express using tensor, that we enumerate components of tensor by indexes and this relationship is permanent. Once I saw that it was not the case, I found myself unprepared to recognize it. It got month before I was able to write down expression that I saw by my eyes. The problem was because I tried to write down this expression in tensor form.

As consequence it appears that bivector space is particular case of direct product of D_*^* -vector spaces. We cannot define polylinear map. However consideration of polyadditive maps of direct product of D_*^* -vector spaces leads to definition of tensor product. Such way we can build tensors of arbitrary structure.

I designed this paper such way that it allows reproduce my not simple and interesting adventure in the world of tensors over division ring.

March, 2009

1.3. Preface to Version 3

Quaternion algebra is the simplest example of division ring. This is why I verify theorems in quaternion algebra to see how they work. Quaternion algebra is similar to complex field and so it is natural to search some parallel.

In real field any additive map automatically turns out to be linear over real field. This statement is caused by statement that real field is completion of rational field and is corollary of theorem 9.1.3.

However the statement changes for complex field. Not every additive map of complex field is linear over complex field. Conjugation is the simplest example of such map. As soon as I discovered this extremely interesting statement, I returned to question about analytical representation of additive map.

Exploring additive maps, I realized that I too abruptly expanded the set of linear maps while switching from field to division ring. The reason for this was not a very clear understanding of how to overcome the noncommutativity of the product. However during the process of research it became more evident that any additive map is linear over some field. For the first time I used this concept when constructing the tensor product and the concept took shape in a subsequent study.

During constructing the tensor product of division rings $D_1, \dots, D_n$ I assumed existence of field F such that additive map of division ring D_i is linear over this field for any i . If all division rings have characteristic 0, then according to theorem 9.1.3 such field always exists. However dependence of tensor product on selected field F arises here. To get rid of this dependence, I assume that field F is maximal field that possesses stated property.

If $D_1 = \dots = D_n = D$, then such field is center $Z(D)$ of division ring D . If the product in division ring D is commutative^{1.3}, then $Z(D) = D$. So, starting with additive map, I arrive at concept of linear map, which is generalization of linear map over field.

Research in area of complex numbers and quaternions revealed one more interesting phenomenon. In spite of the fact that complex field is extension of real field, the structure of linear map over complex field is different from the structure of linear map over real field. This difference leads to the statement that conjugation of complex numbers is additive map but not linear map over complex field.

Similarly, the structure of linear map over division ring of quaternions is different from the structure of linear map over complex field. The source of difference is statement that the center of quaternion algebra has more simple structure, than complex field. This difference leads to the statement that conjugation of quaternion satisfies to equation

$$\bar{p} = -\frac{1}{2}(p + ipi + jpj + kpk)$$

^{1.3}In other words, division ring is field.

Consequently, the problem to find a mapping satisfying to a theorem similar to the Riemann theorem (theorem 10.1.1), is a nontrivial task for quaternions.

August, 2009

1.4. Preface to Version 5

Passenger: ... We will be late at the train station!

Little Engine: ... But if we do not see the first lily of the valley, then we will be late for the entire spring!

...

Passenger: ... We will be too late!

Little Engine: Yes. But if we do not hear the first nightingales, then we will be late for the entire summer!

...

Little Engine: Dawn! ... every sunrise is the only in our life! ... It is time to ride. After all we will be late.

Passenger: Yes. But if we do not see the dawn, we may be late for the whole life!

Gennadi Tsyferov, Little Engine from Romashkovo.

Young man John departed from point A to point B . Two hours later his friend Peter went on a bicycle from point B in the direction to the point A . How fast did Peter ride, if they met in an hour?..

This is the familiar problem of school problem book. But the problem is not so simple as it is formulated. When Peter was near the pond he saw swans and stopped to make picture. John stopped in the grove to hear the nightingales. There they met.

Very often I tempted to take a look at the end of the problem book. The solution is almost there, just a jiffy away. However some uncertainty remains when you see the printed answer. I already see in general the theory that I am looking for. However I understand that I have a long way ahead of me before I will be able to tell about this to others. Besides, my experience tells me that when you stroll along unfamiliar terrain, suddenly see such an amazing landscape that unintentionally stay there longer, to explore this place better.

However, once I could not resist and, in the paper [10], I tried to analyze how it may look like geometry over division ring. Although the paper was premature, the results formed the basis of my subsequent research.

In the paper [13], I explored the system of additive equations in Ω -algebra where the operation of addition is defined. The format of notation of equations in [13] is determined by the format of operations in Ω -algebra. This format is different from format accepted in this book by default. The theory of additive equations is generalization of the theory of $*D$ -linear equations and uses the same methods. Different order of variable and coefficient in equation made it difficult

to compare results in both books. However it is not important for me whether I consider a system of D^*_* -linear equations or a system of $_*^*D$ -linear equations. This stimulated me to edit text of this book and to consider the system of $_*^*D$ -linear equations by default.

Besides, I realized that the notion of a set of additive mappings is artificial in the study of linear algebra over division ring. That is why I removed corresponding definitions and theorems from this version. Now I am directly considering a linear mapping over a given field.

The main difference of linear mappings over division ring is that I cannot represent a linear mapping as product of element of division ring over variable. In papers [12, 13], I found way to functionally separate variable and mapping. This allows me to represent a notation of linear mapping in the familiar form. However in this book I keep the previous notation. It has several reasons for this.

First of all, both forms of notation are correct. We can use any of these forms of notation choosing the one that seems more appropriate. It also enables the reader to compare both forms of notation. In addition, in [13], I consider linear mapping of algebras in parallel with their tensor product, since these two topics are inseparable. In this book, I decided to follow the same path that I covered when I worked on the second version of this book and present the tensor product as distinctive peak to ascend at the end of the book.

However, the road covered after the last version was reflected on last chapters of the book. For instance, since division ring is algebra over field, I decided to use the standard representation of indexes. The key changes are attributed with my perception of D -vector spaces. Let us take a closer look at this subject in greater detail since this subject remains outside of the scope of the book.

D -vector space appeared as corollary of theorem about twin representations of division ring in Abelian group (theorems 6.3.2, 6.3.3). Initially I considered D -vector space as consolidation of structures of D^*_* -vector space and $_*^*D$ -vector space. Correspondingly I considered D^*_* -basis and $_*^*D$ -basis. Against this background, a non-trivial presentation of identity mapping like expression (6.4.3) was a complete surprise to me.

There is another interesting statement that I saved for later analysis, namely the theorem 6.3.4, which states existence of D^*_* -basis which is not $_*^*D$ -basis. We will make a pause here.

According to the theory of representations of Ω -algebra that explored in [11], D -vector space is representation of algebra $D \otimes D$ in Abelian group. Therefore, choice of basis is determined neither by $D\star$ -linear dependence or by $\star D$ -linear dependence, but by dependence like in expression

$$a_{s,0}^i \bar{e}_i a_{s,1}^i$$

Therefore, D^*_* -basis is not also basis of D -vector space if it is not $_*^*D$ -basis. However, it is easy to see that the set of transformations of basis forms a group. This structure of basis leads to the fact that the difference between right and left bases disappears. This is why for D -vector space, I use standard representation of index.

However, even more surprising statement follows from this. Coordinates of vector of D -vector space belong to algebra $D \otimes D$. Few questions arise.

- Can a basis of D -vector space be $_*^*D$ -basis?

- What is relation between dimensions of D -vector space and *D -vector space?
- What is the structure of 1-dimensional D -vector space?

I intend to explore these questions for free modules over arbitrary algebra. This is the main reason why this topic is outside the scope of this book.

But we can already say that the set of *D -linearly dependent vectors cannot be the basis of D -vector space. Therefore dimension of D -vector space does not exceed dimension of corresponding $D_{{}^*}$ -vector space. Therefore, I gave in this book proper description of D -vector space.

Well, I could not resist, and once again looked at the end of the problem book.

August, 2010

1.5. Conventions

- (1) In any expression where we use index I assume that this index may have internal structure. For instance, considering the algebra A we enumerate coordinates of $a \in A$ relative to basis $\bar{e}$ by an index i . This means that a is a vector. However, if a is matrix, then we need two indexes, one enumerates rows, another enumerates columns. In the case, when index has structure, we begin the index from symbol $\cdot$ in the corresponding position. For instance, if I consider the matrix a_j^i as an element of a vector space, then I can write the element of matrix as $a_{\cdot j}^{\cdot i}$.
- (2) I assume sum over index s in expression like

$$a_{s,0} x a_{s,1}$$

- (3) We can consider division ring D as D -vector space of dimension 1. According to this statement, we can explore not only homomorphisms of division ring D_1 into division ring D_2 , but also linear maps of division rings. This means that map is multiplicative over maximum possible field. In particular, linear map of division ring D is multiplicative over center $Z(D)$. This statement does not contradict with definition of linear map of field because for field F is true $Z(F) = F$. When field F is different from maximum possible, I explicit tell about this in text.
- (4) In spite of noncommutativity of product a lot of statements remain to be true if we substitute, for instance, right representation by left representation or right vector space by left vector space. To keep this symmetry in statements of theorems I use symmetric notation. For instance, I consider $D\star$ -vector space and $\star D$ -vector space. We can read notation $D\star$ -vector space as either D-star-vector space or left vector space. We can read notation $D\star$ -linear dependent vectors as either D-star-linear dependent vectors or vectors that are linearly dependent from left.
- (5) Let A be free finite dimensional algebra. Considering expansion of element of algebra A relative basis $\bar{e}$ we use the same root letter to denote this element and its coordinates. However we do not use vector notation in algebra. In expression a^2 , it is not clear whether this is component of expansion of element a relative basis, or this is operation $a^2 = aa$. To make text clearer we use separate color for index of element of algebra. For instance,

$$a = a^i \bar{e}_i$$

- (6) If free finite dimensional algebra has unit, then we identify the vector of basis $\bar{e}_0$ with unit of algebra.
- (7) Without a doubt, the reader of my articles may have questions, comments, objections. I will appreciate any response.

CHAPTER 2

Biring of Matrices

2.1. Concept of Generalized Index

Studying tensor calculus we start from studying univalent covariant and contravariant tensors. In spite on difference of properties both these objects are elements of respective vector spaces. Suppose we introduce a generalized index according to the rule $a^i = a^i$, $b^i = b^i_{\cdot}$. Then we see that these tensors have the similar behavior. For instance, the transformation of a covariant tensor gets form

$$b'^i = b'^i_{\cdot} = f^{\cdot j}_{\cdot i} b^j_{\cdot} = f^i_j b^j$$

This similarity goes as far as we need because tensors also form vector space.

These observations of the similarity between properties of covariant and contravariant tensors lead us to the concept of generalized index.^{2.1} We will use the symbol $\cdot$ in front of a generalized index when we need to describe its structure. I put the sign $'\cdot'$ in place of the index whose position was changed. For instance, if an original term was a_{ij} I will use notation $a^j_{\cdot i}$ instead of notation a^j_i .

Even though the structure of a generalized index is arbitrary we assume that there exists a one-to-one map of the interval of positive integers $1, \dots, n$ to the range of index. Let i be the range of the index i . We denote the power of this set by symbol $|i|$ and assume that $|i| = n$. If we want to enumerate elements a_i we use notation $a_1, \dots, a_n$.

Representation of coordinates of a vector as a matrix allows making a notation more compact. The question of the presentation of vector as a row or a column of the matrix is just a question of convention. We extend the concept of generalized index to elements of the matrix. A matrix is a two dimensional table, the rows and columns of which are enumerated by generalized indexes. To represent a matrix we will use one of the following forms:

Standard representation: in this case we write elements of matrix A as A^a_b .

Alternative representation: in this case we write elements of matrix A as ${}^a A_b$ or ${}_b A^a$.

Since we use generalized index, we cannot tell whether index a of matrix enumerates rows or columns until we know the structure of index.

We could use notation $\ast$ -column and $\ast$ -row which is more close to our custom. However as we can see bellow the form of presentation of matrix is not important for us. To make sure that notation offered below is consistent with the traditional

^{2.1}Set of commands to use generalized index as well other commands that I use in this and following papers you can see in the file Commands.tex.

we will assume that the matrix is presented in the form

$$A = \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_n \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^mA_1 & \dots & {}^mA_n \end{pmatrix}$$

Definition 2.1.1. I use the following names and notation for different minors of the matrix A

A_a : ***-row** with the index a is generalization of a column of a matrix. The upper index enumerates elements of *-rows and the lower index enumerates *-rows.

A_T : the minor obtained from A by selecting *-rows with an index from the set T

$A_{[a]}$: the minor obtained from A by deleting *-row A_a

$A_{[T]}$: the minor obtained from A by deleting *-rows with an index from the set T

bA : ***-row** with the index b is generalization of a row of a matrix. The lower index enumerates elements of *-rows and the upper index enumerates *-rows.

SA : the minor obtained from A by selecting *-rows with an index from the set S

${}^{[b]}A$: the minor obtained from A by deleting *-row bA

${}^{[S]}A$: the minor obtained from A by deleting *-rows with an index from the set S

□

Remark 2.1.2. We will combine the notation of indexes. Thus bA_a is 1×1 minor. The same time this is the notation for a matrix element. This allows an identifying of 1×1 matrix and its element. The index a is number of *-row of matrix and the index b is number of *-rows of matrix. □

Each form of the notation of a matrix has its own advantages. The standard notation is more natural when we study matrix theory. The alternative form of the notation makes expressions in the theory of vector spaces more clear. Extending the alternative notation of indexes to arbitrary tensors we can better understand an interaction of different geometric objects. Using the duality principle (theorem 2.2.14) improves our expressivity.

Remark 2.1.3. We can read symbol ${}^c-$ as c - and symbol ${}_r-$ as r - creating this way names c -row and r -row. Further we extend this rule to other objects of linear algebra. I will use this convention designing index. □

Since transpose of the matrix exchanges *-rows and *-rows we get equation

$$(2.1.1) \quad {}_i(A^T)^j = {}^iA_j$$

Remark 2.1.4. As we can see from the equation (2.1.1), it is not important for us the choice of a side to place a number of *-row and and the choice of a side to place a number of *-row. This is due to the fact that we can enumerate the elements of matrix in different ways. If we want to show the numbers of *-row and *-row according to the definition 2.1.1, then the equation (2.1.1) has form

$${}^j(A^T)_i = {}^iA_j$$

In standard representation, the equation (2.1.1) has form

$$(A^T)_i^j = A_j^i$$

□

We call matrix^{2.2}

$$(2.1.2) \quad \mathcal{H}A = ({}^j\mathcal{H}A_i) = (({}^-_i A.^j)^{-1})$$

Hadamard inverse of matrix $A = ({}_b A^a)$ ([8]-page 4).

I will use the Einstein convention about sums. This means that when an index is present in an expression twice and a set of index is known, I have the sum over this index. If needed to clearly show set of index, I will do it. Also, in this paper I will use the same root letter for a matrix and its elements.

We will study matrices elements of which belong to division ring D . We will also keep in mind that instead of division ring D we may write in text field F . We will clearly write field F in case when commutativity creates new details. We will denote by 1 identity element of division ring D .

Let I , $|I| = n$ be a set of indexes. We introduce the **Kronecker symbol**

$$(2.1.3) \quad \delta_j^i = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad i, j \in I$$

2.2. Biring

We consider matrices whose elements belong to division ring D .

The product of matrices is associated with the product of homomorphisms of vector spaces over field. According to the custom the product of matrices A and B is defined as product of $*$ -rows of the matrix A and $*$ -rows of the matrix B . Conventional character of this definition becomes evident when we put attention that $*$ -row of the matrix A may be a column of this matrix. In such case we multiply columns of the matrix A over rows of the matrix B . Thus we can define two products of matrices. To distinguish between these products we introduced a new notation.^{2.3}

Definition 2.2.1. $*$ -product of matrices A and B has form

$$(2.2.1) \quad \begin{cases} A_*^* B &= ({}^a A_c {}^c B_b) \\ {}^a (A_*^* B)_b &= {}^a A_c {}^c B_b \end{cases}$$

and can be expressed as product of a $*$ -row of matrix A over a $*$ -row of matrix B .^{2.4} □

^{2.2} The notation $({}^-_i A.^j)^{-1}$ means that we exchange rows and columns in Hadamard inverse. We can formally write this expression in following form

$$({}^-_i A.^j)^{-1} = \frac{1}{{}_i A_j}$$

^{2.3}In order to keep this notation consistent with the existing one we assume that we have in mind $*$ -product when no clear notation is present.

^{2.4}In alternative form operation consists from two symbols $*$ which we put in the place of index which participate in sum. In standard notation we write operation as

$$\begin{cases} A_*^* B &= (A_c^a B_b^c) \\ (A_*^* B)_b^a &= A_c^a B_b^c \end{cases}$$

Definition 2.2.2. $*$ -product of matrices A and B has form

$$(2.2.2) \quad \begin{cases} A *_* B &= ({}_a A^c {}_c B^b) \\ {}_a (A *_* B)^b &= {}_a A^c {}_c B^b \end{cases}$$

and can be expressed as product of a $*$ -row of matrix A over a $*$ -row of matrix B .^{2.5} $\square$

Remark 2.2.3. We will use symbol $*$ - or $*$ - in name of properties of each product and in the notation. According to remark 2.1.3 we can read symbols $*$ and $*$ as rc -product and cr -product. This rule we extend to following terminology. $\square$

Remark 2.2.4. Just as in remark 2.1.4, I want to draw attention to the fact that I change the numbering of elements of the matrix. If we want to show the numbers of $*$ -row and $*$ -row according to the definition 2.1.1, then the equation (2.2.2) has form

$$(2.2.3) \quad {}^b (A *_* B)_a = {}^c A_a {}^b B_c$$

However the format of the equation (2.2.3) is unusual. $\square$

Set of $n \times n$ matrices is closed relative $*$ -product and $*$ -product as well relative sum which is defined by rule

$$(A + B)_a^b = A_a^b + B_a^b$$

Theorem 2.2.5.

$$(2.2.4) \quad (A *_* B)^T = A^T *_* B^T$$

PROOF. The chain of equations

$$(2.2.5) \quad \begin{aligned} {}_a ((A *_* B)^T)^b &= {}^a (A *_* B)_b \\ &= {}^a A_c {}^c B_b \\ &= {}_a (A^T)^c {}_c (B^T)^b \\ &= {}_a ((A^T) *_* (B^T))^b \end{aligned}$$

follows from (2.1.1), (2.2.1) and (2.2.2). The equation (2.2.4) follows from (2.2.5). $\square$

Matrix $\delta = (\delta_a^c)$ is identity for both products.

Definition 2.2.6. $\mathcal{A}$ is a **biring** if we defined on $\mathcal{A}$ an unary operation, say transpose, and three binary operations, say $*$ -product, $*$ -product and sum, such that

and can be construed as symbolic notation

$$A *_* B = A *_* B$$

where we write symbol $*$ on place of index which participate in sum.

^{2.5}In alternative form operation consists from two symbols $*$ which we put in the place of index which participate in sum. In standard notation we write operation as

$$\begin{cases} A *_* B &= (A_a^c B_c^b) \\ (A *_* B)_b^a &= A_a^c B_c^b \end{cases}$$

and can be construed as symbolic notation

$$A *_* B = A *_* B$$

where we write symbol $*$ on place of index which participate in sum.

- $*$ -product and sum define structure of ring on $\mathcal{A}$
- ${}^*_{*}$ -product and sum define structure of ring on $\mathcal{A}$
- both products have common identity δ
- products satisfy equation

$$(2.2.6) \quad (A *_* B)^T = A^{T*} *_* B^T$$

- transpose of identity is identity

$$(2.2.7) \quad \delta^T = \delta$$

- double transpose is original element

$$(2.2.8) \quad (A^T)^T = A$$

□

Theorem 2.2.7.

$$(2.2.9) \quad (A^* *_* B)^T = (A^T)_*^* (B^T)$$

PROOF. We can prove (2.2.9) in case of matrices the same way as we proved (2.2.6). However it is more important for us to show that (2.2.9) follows directly from (2.2.6).

Applying (2.2.8) to each term in left side of (2.2.9) we get

$$(2.2.10) \quad (A^* *_* B)^T = ((A^T)^T *_* (B^T)^T)^T$$

From (2.2.10) and (2.2.6) it follows that

$$(2.2.11) \quad (A^* *_* B)^T = ((A^T *_* B^T)^T)^T$$

(2.2.9) follows from (2.2.11) and (2.2.8). □

Definition 2.2.8. We introduce $*$ -**power** of element A of biring $\mathcal{A}$ using recursive definition

$$(2.2.12) \quad A^{0*} = \delta$$

$$(2.2.13) \quad A^{n*} = A^{n-1*} *_* A$$

□

Definition 2.2.9. We introduce ${}^*_{*}$ -**power** of element A of biring $\mathcal{A}$ using recursive definition

$$(2.2.14) \quad A^{0*} = \delta$$

$$(2.2.15) \quad A^{n*} = A^{n-1*} {}^*_{*} A$$

□

Theorem 2.2.10.

$$(2.2.16) \quad (A^T)^{n*} = (A^{n*})^T$$

$$(2.2.17) \quad (A^T)^{n*} = (A^{n*})^T$$

PROOF. We proceed by induction on n .

For $n = 0$ the statement immediately follows from equations (2.2.12), (2.2.14), and (2.2.7).

Suppose the statement of theorem holds when $n = k - 1$

$$(2.2.18) \quad (A^T)^{n-1*} = (A^{n-1*})^T$$

It follows from (2.2.13) that

$$(2.2.19) \quad (A^T)^{k*} = (A^T)^{k-1*} *_* A^T$$

It follows from (2.2.19) and (2.2.18) that

$$(2.2.20) \quad (A^T)^{k*} = (A^{k-1*})^T *_* A^T$$

It follows from (2.2.20) and (2.2.9) that

$$(2.2.21) \quad (A^T)^{k*} = (A^{k-1*} *_* A)^T$$

(2.2.16) follows from (2.2.19) and (2.2.15).

We can prove (2.2.17) by similar way. $\square$

Definition 2.2.11. Element A^{-1*} of biring $\mathcal{A}$ is $*_*$ -inverse element of element A if

$$(2.2.22) \quad A *_* A^{-1*} = \delta$$

Element A^{-1*} of biring $\mathcal{A}$ is $*_*$ -inverse element of element A if

$$(2.2.23) \quad A *_* A^{-1*} = \delta$$

$\square$

Theorem 2.2.12. Suppose element $A \in \mathcal{A}$ has $*_*$ -inverse element. Then transpose element A^T has $*_*$ -inverse element and these elements satisfy equation

$$(2.2.24) \quad (A^T)^{-1*} = (A^{-1*})^T$$

Suppose element $A \in \mathcal{A}$ has $*_*$ -inverse element. Then transpose element A^T has $*_*$ -inverse element and these elements satisfy equation

$$(2.2.25) \quad (A^T)^{-1*} = (A^{-1*})^T$$

PROOF. If we get transpose of both side (2.2.22) and apply (2.2.7) we get

$$(A *_* A^{-1*})^T = \delta^T = \delta$$

Applying (2.2.6) we get

$$(2.2.26) \quad \delta = A^{T*} (A^{-1*})^T$$

(2.2.24) follows from comparison (2.2.23) and (2.2.26).

We can prove (2.2.25) similar way. $\square$

Theorems 2.2.5, 2.2.7, 2.2.10, and 2.2.12 show that some kind of duality exists between $*_*$ -product and $*_*$ -product. We can combine these statements.

Theorem 2.2.13 (duality principle for biring). Let $\mathfrak{A}$ be true statement about biring $\mathcal{A}$. If we exchange the same time

- $A \in \mathcal{A}$ and A^T
- $*_*$ -product and $*_*$ -product

then we soon get true statement.

Theorem 2.2.14 (duality principle for biring of matrices). *Let $\mathcal{A}$ be biring of matrices. Let $\mathfrak{A}$ be true statement about matrices. If we exchange the same time*

- $*$ -rows and ${}_*$ -rows of all matrices
- * -product and ${}_*$ -product

then we soon get true statement.

PROOF. This is the immediate consequence of the theorem 2.2.13. $\square$

Remark 2.2.15. We execute operations in expression

$$A {}^* {}_* B {}^* {}_* C$$

from left to right. However we can execute product from right to left. In custom notation this expression is

$$C {}^* {}_* B {}^* {}_* A$$

We follow the rule that to write power from right of expression. If we use standard representation, then we write indexes from right of expression. If we use alternative representation, then we read indexes in the same order as symbols of operation and root letters. For instance, let original expression be like

$$A^{-1} {}^* {}_* {}^* {}_* B_a$$

Then expression which we read from right to left is like

$$B_a {}^* {}_* A^{-1} {}^* {}_*$$

in standard representation or

$${}_a B {}^* {}_* A^{-1} {}^* {}_*$$

in alternative representation.

Suppose we established the order in which we write indexes. Then we state that we read an expression from top to bottom reading first upper indexes, then lower ones. We assume that this is standard form of reading. We can read this expression from bottom to top. We extend this rule stating that we read symbols of operation in the same order as indexes. For instance, if we read expression

$$A {}^a {}^* {}_* B^{-1} {}^* {}_* = C {}^a$$

from bottom to top, then we can write this expression in standard form

$$A_a {}^* {}_* B^{-1} {}^* {}_* = C_a$$

According to the duality principle if we can prove one statement then we can prove other as well. $\square$

Theorem 2.2.16. *Let matrix A have ${}^* {}_*$ -inverse matrix. Then for any matrices B and C equation*

$$(2.2.27) \quad B = C$$

follows from the equation

$$(2.2.28) \quad B {}^* {}_* A = C {}^* {}_* A$$

PROOF. Equation (2.2.27) follows from the equation (2.2.28) if we multiply both parts of the equation (2.2.28) over $A^{-1} {}^* {}_*$. $\square$

2.3. Quasideterminant

Theorem 2.3.1. Suppose $n \times n$ matrix A has $*$ -inverse matrix.^{2.6} Then $k \times k$ minor of $*$ -inverse matrix satisfy

$$(2.3.1) \quad \left(I(A^{-1*})_J \right)^{-1*} = {}^J A_I - {}^J A_{[I]*} \left({}^{[J]} A_{[I]} \right)^{-1*} {}^* [J] A_I$$

PROOF. Definition (2.2.22) of $*$ -inverse matrix leads to system of linear equations

$$(2.3.2) \quad {}^{[J]} A_{[I]*} {}^* [I] (A^{-1*})_J + {}^{[J]} A_I {}^* I (A^{-1*})_J = 0$$

$$(2.3.3) \quad {}^J A_{[I]*} {}^* [I] (A^{-1*})_J + {}^J A_I {}^* I (A^{-1*})_J = \delta$$

We multiply (2.3.2) by $({}^{[J]} A_{[I]})^{-1*}$

$$(2.3.4) \quad {}^{[I]} (A^{-1*})_J + \left({}^{[J]} A_{[I]} \right)^{-1*} {}^* [J] A_I {}^* I (A^{-1*})_J = 0$$

Now we can substitute (2.3.4) into (2.3.3)

$$(2.3.5) \quad -{}^J A_{[I]*} \left({}^{[J]} A_{[I]} \right)^{-1*} {}^* [J] A_I {}^* I (A^{-1*})_J + {}^J A_I {}^* I (A^{-1*})_J = \delta$$

(2.3.1) follows from (2.3.5). $\square$

Corollary 2.3.2. Suppose $n \times n$ matrix A has $*$ -inverse matrix. Then elements of $*$ -inverse matrix satisfy to the equation^{2.2}

$$(2.3.6) \quad {}^i (A^{-1*})_j = \left({}^j A_i - {}^j A_{[i]*} \left({}^{[j]} A_{[i]} \right)^{-1*} {}^* [j] A_i \right)^{-1}$$

$$(2.3.7) \quad {}^j \left({}^i \mathcal{H} A^{-1*} \right)_i = {}^j A_i - {}^j A_{[i]*} \left({}^{[j]} A_{[i]} \right)^{-1*} {}^* [j] A_i$$

$\square$

Example 2.3.3. Consider matrix

$$\begin{pmatrix} {}^1 A_1 & {}^1 A_2 \\ {}^2 A_1 & {}^2 A_2 \end{pmatrix}$$

According to (2.3.6)

$$(2.3.8) \quad {}^1 (A^{-1*})_1 = ({}^1 A_1 - {}^1 A_2 ({}^2 A_2)^{-1} {}^2 A_1)^{-1}$$

$$(2.3.9) \quad {}^2 (A^{-1*})_1 = ({}^1 A_2 - {}^1 A_1 ({}^2 A_1)^{-1} {}^2 A_2)^{-1}$$

$$(2.3.10) \quad {}^1 (A^{-1*})_2 = ({}^2 A_1 - {}^2 A_2 ({}^1 A_2)^{-1} {}^1 A_1)^{-1}$$

$$(2.3.11) \quad {}^2 (A^{-1*})_2 = ({}^2 A_2 - {}^2 A_1 ({}^1 A_1)^{-1} {}^1 A_2)^{-1}$$

$$A^{-1*} = \begin{pmatrix} ({}^1 A^1 - {}^1 A^2 ({}^2 A^2)^{-1} {}^2 A^1)^{-1} & ({}^1 A^2 - {}^1 A^1 ({}^2 A^1)^{-1} {}^2 A^2)^{-1} \\ ({}^2 A^1 - {}^2 A^2 ({}^1 A^2)^{-1} {}^1 A^1)^{-1} & ({}^2 A^2 - {}^2 A^1 ({}^1 A^1)^{-1} {}^1 A^2)^{-1} \end{pmatrix}$$

$\square$

^{2.6}This statement and its proof are based on statement 1.2.1 from [7] (page 8) for matrix over free division ring.

According to [7], page 3 we do not have an appropriate definition of a determinant for a division ring. However, we can define a quasideterminant which finally gives a similar picture. In definition below we follow definition [7]-1.2.2.

Definition 2.3.4. $(\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix})$ - $\ast$ -**quasideterminant** of $n \times n$ matrix A is formal expression^{2.2}

$$(2.3.12) \quad {}^j \det(A, \ast)_i = {}^j \left(\mathcal{H} A^{-1\ast} \right)_i$$

According to the remark 2.1.2 we can get $(\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix})$ - $\ast$ -quasideterminant as an element of the matrix $\det(a, \ast)$ which we call $\ast$ -**quasideterminant**. $\square$

Theorem 2.3.5. Expression for elements of $\ast$ -inverse matrix has form

$$(2.3.13) \quad A^{-1\ast} = \mathcal{H} \det(A, \ast)$$

PROOF. (2.3.13) follows from (2.3.12). $\square$

Theorem 2.3.6. Expression for $(\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix})$ - $\ast$ -quasideterminant can be evaluated by either form^{2.7}

$$(2.3.14) \quad {}^j \det(A, \ast)_i = {}^j A_i - {}^j A_{[i]\ast} \left([^j] A_{[i]} \right)^{-1\ast} \ast [^j] A_i$$

$$(2.3.15) \quad {}^j \det(A, \ast)_i = {}^j A_i - {}^j A_{[i]\ast} \mathcal{H} \det \left([^j] A_{[i]}, \ast \right) \ast [^j] A_i$$

PROOF. Statement follows from (2.3.7) and (2.3.12). $\square$

Example 2.3.7. Consider matrix

$$\begin{pmatrix} {}^1 A_1 & {}^1 A_2 \\ {}^2 A_1 & {}^2 A_2 \end{pmatrix}$$

According to (2.3.14)

$$\begin{aligned} \det(A, \ast) &= \begin{pmatrix} {}^1 A_1 - {}^1 A_2 ({}^2 A_2)^{-1} {}^2 A_1 & {}^1 A_2 - {}^1 A_1 ({}^2 A_1)^{-1} {}^2 A_2 \\ {}^2 A_1 - {}^2 A_2 ({}^1 A_2)^{-1} {}^1 A_1 & {}^2 A_2 - {}^2 A_1 ({}^1 A_1)^{-1} {}^1 A_2 \end{pmatrix} \\ \det(A, \ast) &= \begin{pmatrix} {}^1 A^1 - {}^1 A^2 ({}^2 A^2)^{-1} {}^2 A^1 & {}^2 A^1 - {}^2 A^2 ({}^1 A^2)^{-1} {}^1 A^1 \\ {}^1 A^2 - {}^1 A^1 ({}^2 A^1)^{-1} {}^2 A^2 & {}^2 A^2 - {}^2 A^1 ({}^1 A^1)^{-1} {}^1 A^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\square$

Theorem 2.3.8.

$$(2.3.16) \quad {}^j \det(A^T, \ast)^i = {}^j \det(A, \ast)_i$$

^{2.7}We can provide similar proof for $(\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix})$ - $\ast$ -**quasideterminant**. However we can write corresponding statement using the duality principle. Thus, if we read equation (2.3.14) from right to left, we get equation

$$\begin{aligned} {}^j \det(A, \ast)_i &= {}^j A_i - [^j] A_i \ast \left([^j] A_{[i]} \right)^{-1\ast} \ast {}^j A_{[i]} \\ {}^j \det(A, \ast)_i &= {}^j A_i - [^j] A_i \ast \mathcal{H} \det \left([^j] A_{[i]}, \ast \right) \ast {}^j A_{[i]} \end{aligned}$$

PROOF. According to (2.3.12) and (2.1.2)

$${}_j \det (A^T, *)^i = ({}_j ((A^T)^{-1*}) \cdot {}_i)^{-1}$$

Using theorem 2.2.12 we get

$${}_j \det (A^T, *)^i = ({}_j ((A^{-1*})^T) \cdot {}_i)^{-1}$$

Using (2.1.1) we get

$$(2.3.17) \quad {}_j \det (A^T, *)^i = ({}_j (A^{-1*}) \cdot {}_i)^{-1}$$

Using (2.3.17), (2.1.2), (2.3.12) we get (2.3.16). $\square$

The theorem 2.3.8 extends the duality principle stated in the theorem 2.2.14 to statements on quasideterminants and tells us that the same expression is $*$ -quasideterminant of matrix A and $*$ -quasideterminant of matrix A^T . Using this theorem, we can write any statement for $*$ -matrix on the basis of similar statement for $*$ -matrix.

Theorem 2.3.9 (duality principle). *Let $\mathfrak{A}$ be true statement about matrix biring. If we exchange the same time*

- $*$ -row and $*$ -row
- $*$ -quasideterminant and $*$ -quasideterminant

then we soon get true statement.

Theorem 2.3.10.

$$(2.3.18) \quad (mA)^{-1*} = A^{-1*} m^{-1}$$

$$(2.3.19) \quad (Am)^{-1*} = m^{-1} A^{-1*}$$

PROOF. To prove equation (2.3.18) we proceed by induction on size of the matrix.

Since

$$(mA)^{-1*} = ((mA)^{-1}) = (A^{-1} m^{-1}) = (A^{-1}) m^{-1} = A^{-1*} m^{-1}$$

the statement is evident for 1×1 matrix.

Let the statement holds for $(n-1) \times (n-1)$ matrix. Then from equation (2.3.1) it follows that

$$\begin{aligned} ({}^I ((mA)^{-1*})_J)^{-1*} &= {}^J (mA)_I - {}^J (mA)_{[I]*} \left({}^{[J]} (mA)_{[I]} \right)^{-1*} {}^{*[J]} (mA)_I \\ &= m^J A_I - m^J A_{[I]*} \left({}^{[J]} A_{[I]} \right)^{-1*} m^{-1*} m^{[J]} A_I \\ &= m^J A_I - m^J A_{[I]*} \left({}^{[J]} A_{[I]} \right)^{-1*} {}^{*[J]} A_I \end{aligned}$$

$$(2.3.20) \quad ({}^I ((mA)^{-1*})_J)^{-1*} = m^I (A^{-1*})_J$$

The equation (2.3.18) follows from the equation (2.3.20). In the same manner we prove the equation (2.3.19). $\square$

Theorem 2.3.11. *Let*

$$(2.3.21) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Then

$$(2.3.22) \quad A^{-1*} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2.3.23) \quad A^{-1*} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

PROOF. It is clear from (2.3.8) and (2.3.11) that ${}^1(A^{-1*})_1 = 1$ and ${}^2(A^{-1*})_2 = 1$. However expression for ${}^2(A^{-1*})_1$ and ${}^1(A^{-1*})_2$ cannot be defined from (2.3.9) and (2.3.10) since ${}^2A_1 = {}^1A_2 = 0$. We can transform these expressions. For instance

$$\begin{aligned} {}^2(A^{-1*})_1 &= ({}^1A_2 - {}^1A_1({}^2A_1)^{-1} {}^2A_2)^{-1} \\ &= ({}^1A_1(({}^1A_1)^{-1} {}^1A_2 - ({}^2A_1)^{-1} {}^2A_2))^{-1} \\ &= (({}^2A_1)^{-1} {}^1A_1({}^2A_1({}^1A_1)^{-1} {}^1A_2 - {}^2A_2))^{-1} \\ &= ({}^1A_1({}^2A_1({}^1A_1)^{-1} {}^1A_2 - {}^2A_2))^{-1} {}^2A_1 \end{aligned}$$

It follows immediately that ${}^2(A^{-1*})_1 = 0$. In the same manner we can find that ${}^1(A^{-1*})_2 = 0$. This completes the proof of (2.3.22).

Equation (2.3.23) follows from (2.3.22), theorem 2.3.8 and symmetry of matrix (2.3.21). $\square$

CHAPTER 3

Representation of Universal Algebra

3.1. Representation of Universal Algebra

Definition 3.1.1. Suppose we defined the structure of Ω_2 -algebra on the set M ([2, 14]). We call the endomorphism of Ω_2 -algebra

$$t : M \rightarrow M$$

transformation of universal algebra M .^{3.1} □

We denote δ identical transformation.

Definition 3.1.2. Transformations is **left-side transformation** or **$T\star$ -transformation** if it acts from left

$$u' = tu$$

We denote ${}^{\star}M$ the set of $T\star$ -transformations of set M . □

Definition 3.1.3. Transformations is **right-side transformations** or **$\star T$ -transformation** if it acts from right

$$u' = ut$$

We denote $M^{\star}$ the set of nonsingular $\star T$ -transformations of set M . □

Definition 3.1.4. Suppose we defined the structure of Ω_1 -algebra on the set ${}^{\star}M$ ([2]). Let A be Ω_1 -algebra. We call homomorphism

$$(3.1.1) \quad f : A \rightarrow {}^{\star}M$$

left-side or $T\star$ -representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra M □

Definition 3.1.5. Suppose we defined the structure of Ω_1 -algebra on the set $M^{\star}$ ([2]). Let A be Ω_1 -algebra. We call homomorphism

$$f : A \rightarrow M^{\star}$$

right-side or $\star T$ -representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra M □

We extend to representation theory convention described in remark 2.2.15. We can write duality principle in the following form

Theorem 3.1.6 (duality principle). *Any statement which holds for $T\star$ -representation of Ω_1 -algebra A holds also for $\star T$ -representation of Ω_1 -algebra A .*

Remark 3.1.7. There exist two forms of notation for transformation of Ω_2 -algebra M . In operational notation, we write the transformation A as either Aa which corresponds to the $T\star$ -transformation or aA which corresponds to the $\star T$ -transformation. In functional notation, we write the transformation A as $A(a)$ regardless

^{3.1}If the set of operations of Ω_2 -algebra is empty, then t is a map.

of the fact whether this is $T\star$ -transformation or this is $\star T$ -transformation. This notation is in agreement with duality principle.

This remark serves as a basis for the following convention. When we use functional notation we do not make a distinction whether this is $T\star$ -transformation or this is $\star T$ -transformation. We denote *M the set of transformations of Ω_2 -algebra M . Suppose we defined the structure of Ω_1 -algebra on the set *M . Let A be Ω_1 -algebra. We call homomorphism

$$(3.1.2) \quad f : A \rightarrow {}^*M$$

representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra M .

Correspondence between operational notation and functional notation is unambiguous. We can select any form of notation which is convenient for presentation of particular subject. $\square$

Diagram

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f(a)} & M \\ & \uparrow f & \\ & A & \end{array}$$

means that we consider the representation of Ω_1 -algebra A . The map $f(a)$ is image of $a \in A$.

Definition 3.1.8. Suppose map (3.1.2) is an isomorphism of the Ω_1 -algebra A into *M . Then the representation of the Ω_1 -algebra A is called **effective**. $\square$

Remark 3.1.9. Suppose the $T\star$ -representation of Ω_1 -algebra is effective. Then we identify an element of Ω_1 -algebra and its image and write $T\star$ -transformation caused by element $a \in A$ as

$$v' = av$$

Suppose the $\star T$ -representation of Ω_1 -algebra is effective. Then we identify an element of Ω_1 -algebra and its image and write $\star T$ -transformation caused by element $a \in A$ as

$$v' = va$$

$\square$

Definition 3.1.10. We call a representation of Ω_1 -algebra **transitive** if for any $a, b \in V$ exists such g that

$$a = f(g)(b)$$

We call a representation of Ω_1 -algebra **single transitive** if it is transitive and effective. $\square$

Theorem 3.1.11. $T\star$ -representation is single transitive if and only if for any $a, b \in M$ exists one and only one $g \in A$ such that $a = f(g)(b)$

PROOF. Corollary of definitions 3.1.8 and 3.1.10. $\square$

3.2. Morphism of Representations of Universal Algebra

Theorem 3.2.1. *Let A and B be Ω_1 -algebras. Representation of Ω_1 -algebra B*

$$g : B \rightarrow {}^*M$$

and homomorphism of Ω_1 -algebra

$$(3.2.1) \quad h : A \rightarrow B$$

define representation f of Ω_1 -algebra A

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & {}^*M \\ & \searrow h \quad \nearrow g & \\ & B & \end{array}$$

PROOF. Since mapping g is homomorphism of Ω_1 -algebra B into Ω_1 -algebra *M , the mapping f is homomorphism of Ω_1 -algebra A into Ω_1 -algebra *M . $\square$

Considering representations of Ω_1 -algebra in Ω_2 -algebras M and N , we are interested in a mapping that preserves the structure of representation.

Definition 3.2.2. Let

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra M and

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

be representation of Ω_1 -algebra B in Ω_2 -algebra N . Tuple of maps

$$(3.2.2) \quad (r : A \rightarrow B, R : M \rightarrow N)$$

such, that

- r is homomorphism of Ω_1 -algebra
- R is homomorphism of Ω_2 -algebra
-

$$(3.2.3) \quad R \circ f(a) = g(r(a)) \circ R$$

is called **morphism of representations from f into g** . We also say that **morphism of representations of Ω_1 -algebra in Ω_2 -algebra** is defined. $\square$

For any $m \in M$ equation (3.2.3) has form

$$(3.2.4) \quad R(f(a)(m)) = g(r(a))(R(m))$$

Remark 3.2.3. We may consider a pair of maps r, R as map

$$F : A \cup M \rightarrow B \cup N$$

such that

$$F(A) = B \quad F(M) = N$$

Therefore, hereinafter we will say that we have the map (r, R) . $\square$


Remark 3.2.4. Let us consider morphism of representations (3.2.2). We denote elements of the set B by letter using pattern $b \in B$. However if we want to show that b is image of element $a \in A$, we use notation $r(a)$. Thus equation

$$r(a) = r(a)$$

means that $r(a)$ (in left part of equation) is image $a \in A$ (in right part of equation). Using such considerations, we denote element of set N as $R(m)$. We will follow this convention when we consider correspondences between homomorphisms of Ω_1 -algebra and mappings between sets where we defined corresponding representations.

There are two ways to interpret (3.2.4)

- Let transformation $f(a)$ map $m \in M$ into $f(a)(m)$. Then transformation $g(r(a))$ maps $R(m) \in N$ into $R(f(a)(m))$.
- We represent morphism of representations from f into g using diagram



From (3.2.3) it follows that diagram (1) is commutative. □

Theorem 3.2.5. Let us consider representation

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

of Ω_1 -algebra A and representation

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

of Ω_1 -algebra B . Morphism

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

of representations from f into g satisfies equation

$$(3.2.5) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = \omega(g(h(a_1)), \dots, g(h(a_n))) \circ H$$

for any n -ary operation ω of Ω_1 -algebra.

PROOF. Since f is homomorphism, we have

$$(3.2.6) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = H \circ f(\omega(a_1, \dots, a_n))$$

From (3.2.3) and (3.2.6) it follows that

$$(3.2.7) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = g(h(\omega(a_1, \dots, a_n))) \circ H$$

Since h is homomorphism, from (3.2.7) it follows that

$$(3.2.8) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = g(\omega(h(a_1), \dots, h(a_n))) \circ H$$

Since g is homomorphism, (3.2.5) follows from (3.2.8). □

Theorem 3.2.6. *Let the map*

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

be morphism from representation

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

of Ω_1 -algebra A into representation

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

of Ω_1 -algebra B . If representation f is effective, then the map

$${}^*H : {}^*M \rightarrow {}^*N$$

defined by equation

$$(3.2.9) \quad {}^*H(f(a)) = g(h(a))$$

is homomorphism of Ω_1 -algebra.

PROOF. Because representation f is effective, then for given transformation $f(a)$ element a is determined uniquely. Therefore, transformation $g(h(a))$ is properly defined in equation (3.2.9).

Since f is homomorphism, we have

$$(3.2.10) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = {}^*H(f(\omega(a_1, \dots, a_n)))$$

From (3.2.9) and (3.2.10) it follows that

$$(3.2.11) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = g(h(\omega(a_1, \dots, a_n)))$$

Since h is homomorphism, from (3.2.11) it follows that

$$(3.2.12) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = g(\omega(h(a_1), \dots, h(a_n)))$$

Since g is homomorphism,

$${}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = \omega(g(h(a_1)), \dots, g(h(a_n))) = \omega({}^*H(f(a_1)), \dots, {}^*H(f(a_n)))$$

follows from (3.2.12). Therefore, the map *H is homomorphism of Ω_1 -algebra. $\square$

Theorem 3.2.7. *Given single transitive representation*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

of Ω_1 -algebra A and single transitive $T\star$ -representation

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

of Ω_1 -algebra B , there exists morphism

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

of representations from f into g .

PROOF. Let us choose homomorphism h . Let us choose element $m \in M$ and element $n \in N$. To define map H , let us consider following diagram

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{H} & N \\
 \downarrow a & & \downarrow h(a) \\
 M & \xrightarrow{H} & N \\
 \uparrow f & & \uparrow g \\
 A & \xrightarrow{h} & B
 \end{array}
 \quad (1)$$

From commutativity of diagram (1), it follows that

$$H(am) = h(a)H(m)$$

For arbitrary $m' \in M$, we defined unambiguously $a \in A$ such that $m' = am$. Therefore, we defined mapping H which satisfies to equation (3.2.3). $\square$

Theorem 3.2.8. *Let*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be single transitive representation of Ω_1 -algebra A and

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

be single transitive representation of Ω_1 -algebra B . Given homomorphism of Ω_1 -algebra

$$h : A \longrightarrow B$$

let us consider a map

$$H : M \longrightarrow N$$

such that (h, H) is morphism of representations from f into g . This map is unique up to choice of image $n = H(m) \in N$ of given element $m \in M$.

PROOF. From proof of theorem 3.2.7 it follows that choice of homomorphism h and elements $m \in M$, $n \in N$ uniquely defines the map H . $\square$

Theorem 3.2.9. *Given single transitive representation*


$$f : A \rightarrow {}^*M$$

of Ω_1 -algebra A , for any endomorphism of Ω_1 -algebra A there exists endomorphism

$$p : A \longrightarrow A \quad P : M \longrightarrow M$$

of representation f .

PROOF. Let us consider following diagram



Statement of theorem is corollary of theorem 3.2.7. □

Theorem 3.2.10. *Let*

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be representation of Ω_1 -algebra A ,

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

be representation of Ω_1 -algebra B ,

$$h : C \rightarrow {}^*L$$

be representation of Ω_1 -algebra C . Given morphisms of representations of Ω_1 -algebra

$$p : A \longrightarrow B \quad P : M \longrightarrow N$$


$$q : B \longrightarrow C \quad Q : N \longrightarrow L$$

There exists morphism of representations of Ω_1 -algebra

$$r : A \longrightarrow C \quad R : M \longrightarrow L$$

*where $r = qp$, $R = QP$. We call morphism (r, R) of representations from f into h **product of morphisms (p, P) and (q, Q) of representations of universal algebra.***

PROOF. We represent statement of theorem using diagram



Map r is homomorphism of Ω_1 -algebra A into Ω_1 -algebra C . We need to show that tuple of maps (r, R) satisfies to (3.2.3):

$$\begin{aligned} R(f(a)m) &= QP(f(a)m) \\ &= Q(g(p(a))P(m)) \\ &= h(qp(a))QP(m) \\ &= h(r(a))R(m) \end{aligned}$$

□

Definition 3.2.11. Let $\mathcal{A}$ be category of Ω_1 -algebras. We define **category $T \star \mathcal{A}$ of $T \star$ -representations of Ω_1 -algebra from category $\mathcal{A}$** . $T \star$ -representations of Ω_1 -algebra are objects of this category. Morphisms of $T \star$ -representations of Ω_1 -algebra are morphisms of this category. □

Theorem 3.2.12. *Endomorphisms of representation f form semigroup.*

PROOF. From theorem 3.2.10, it follows that the product of endomorphisms $(p, P), (r, R)$ of the representation f is endomorphism (pr, PR) of the representation f . □

Definition 3.2.13. Let us define equivalence S on the set M . Transformation f is called **coordinated with equivalence S** , when $f(m_1) \equiv f(m_2)(\text{mod } S)$ follows from condition $m_1 \equiv m_2(\text{mod } S)$. □

Theorem 3.2.14. *Let us consider equivalence S on set M . Let us consider Ω_1 -algebra on set $*M$. Since transformations are coordinated with equivalence S , we can define the structure of Ω_1 -algebra on the set $*(M/S)$.*

PROOF. Let $h = \text{nat } S$. If $m_1 \equiv m_2(\text{mod } S)$, then $h(m_1) = h(m_2)$. Since $f \in *M$ is coordinated with equivalence S , then $h(f(m_1)) = h(f(m_2))$. This allows to define transformation F according to rule

$$F([m]) = h(f(m))$$

Let ω be n -ary operation of Ω_1 -algebra. Suppose $f_1, \dots, f_n \in *M$ and

$$F_1([m]) = h(f_1(m)) \quad \dots \quad F_n([m]) = h(f_n(m))$$

We define operation on the set $*(M/S)$ according to rule

$$\omega(F_1, \dots, F_n)[m] = h(\omega(f_1, \dots, f_n)m)$$

This definition is proper because $\omega(f_1, \dots, f_n) \in *M$ and is coordinated with equivalence S . □

Theorem 3.2.15. *Let*

$$f : A \rightarrow *M$$

be representation of Ω_1 -algebra A ,

$$g : B \rightarrow *N$$


be representation of Ω_1 -algebra B . Let

$$r : A \longrightarrow B \quad R : M \longrightarrow N$$

be morphism of representations from f into g . Suppose

$$s = rr^{-1} \quad S = RR^{-1}$$

Then there exist decompositions of r and R , which we describe using diagram



- (1) $s = \ker r$ is a congruence on A . There exists decompositions of homomorphism r

$$(3.2.13) \quad r = itj$$

$j = \text{nat } s$ is the natural homomorphism

$$(3.2.14) \quad j(a) = j(a)$$

t is isomorphism

$$(3.2.15) \quad r(a) = t(j(a))$$

i is the inclusion mapping

$$(3.2.16) \quad r(a) = i(r(a))$$

- (2) $S = \ker R$ is an equivalence on M . There exists decompositions of homomorphism R

$$(3.2.17) \quad R = ITJ$$

$J = \text{nat } S$ is surjection

$$(3.2.18) \quad J(m) = J(m)$$

T is bijection

$$(3.2.19) \quad R(m) = T(J(m))$$

I is the inclusion mapping

$$(3.2.20) \quad R(m) = I(R(m))$$

- (3) F is $T\star$ -representation of Ω_1 -algebra A/s in M/S

- (4) G is $T\star$ -representation of Ω_1 -algebra rA in RM

- (5) (j, J) is morphism of representations f and F

- (6) (t, T) is morphism of representations F and G

- (7) (t^{-1}, T^{-1}) is morphism of representations G and F

- (8) (i, I) is morphism of representations G and g

(9) *There exists decompositions of morphism of representations*

$$(3.2.21) \quad (r, R) = (i, I)(t, T)(j, J)$$

PROOF. Existence of diagrams (1) and (2) follows from theorem II.3.7 ([14], p. 60).

We start from diagram (4).

Let $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$. Then

$$(3.2.22) \quad R(m_1) = R(m_2)$$

Since $a_1 \equiv a_2 \pmod{S}$, then

$$(3.2.23) \quad r(a_1) = r(a_2)$$

Therefore, $j(a_1) = j(a_2)$. Since (r, R) is morphism of representations, then

$$(3.2.24) \quad R(f(a_1)(m_1)) = g(r(a_1))(R(m_1))$$

$$(3.2.25) \quad R(f(a_2)(m_2)) = g(r(a_2))(R(m_2))$$

From (3.2.22), (3.2.23), (3.2.24), (3.2.25), it follows that

$$(3.2.26) \quad R(f(a_1)(m_1)) = R(f(a_2)(m_2))$$

From (3.2.26) it follows

$$(3.2.27) \quad f(a_1)(m_1) \equiv f(a_2)(m_2) \pmod{S}$$

and, therefore,

$$(3.2.28) \quad J(f(a_1)(m_1)) = J(f(a_2)(m_2))$$

From (3.2.28) it follows that we defined map

$$(3.2.29) \quad F(j(a))(J(m)) = J(f(a)(m))$$

reasonably and this map is transformation of set M/S .

From equation (3.2.27) (in case $a_1 = a_2$) it follows that for any a transformation is coordinated with equivalence S . From theorem 3.2.14 it follows that we defined structure of Ω_1 -algebra on the set $*(M/S)$. Let us consider n -ary operation ω and n transformations

$$F(j(a_i))(J(m)) = J(f(a_i)(m)) \quad i = 1, \dots, n$$

of the set M/S . We assume

$$\omega(F(j(a_1)), \dots, F(j(a_n)))(J(m)) = J(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n)))(m)$$

Therefore, map F is representations of Ω_1 -algebra A/s .

From (3.2.29) it follows that (j, J) is morphism of representations f and F (the statement (5) of the theorem).

Let us consider diagram (5).

Since T is bijection, then we identify elements of the set M/S and the set MR , and this identification has form

$$(3.2.30) \quad T(J(m)) = R(m)$$

We can write transformation $F(j(a))$ of the set M/S as

$$(3.2.31) \quad F(j(a)) : J(m) \rightarrow F(j(a))(J(m))$$

Since T is bijection, we define transformation

$$(3.2.32) \quad T(J(m)) \rightarrow T(F(j(a))(J(m)))$$

of the set RM . Transformation (3.2.32) depends on $j(a) \in A/s$. Since t is bijection, we identify elements of the set A/s and the set rA , and this identification has form

$$(3.2.33) \quad t(j(a)) = r(a)$$

Therefore, we defined map

$$G : rA \rightarrow {}^*RM$$

according to equation

$$(3.2.34) \quad G(t(j(a)))(T(J(m))) = T(F(j(a))(J(m)))$$

Let us consider n -ary operation ω and n transformations

$$G(r(a_i))(R(m)) = T(F(j(a_i))(J(m))) \quad i = 1, \dots, n$$

of space RM . We assume

$$(3.2.35) \quad \omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m)) = T(\omega(F(j(a_1)), \dots, F(j(a_n)))(J(m)))$$

According to (3.2.34) operation ω is defined reasonably on the set *RM . Therefore, the map G is representations of Ω_1 -algebra.

From (3.2.34) it follows that (t, T) is morphism of representations F and G (the statement (6) of the theorem).

Since T is bijection, then from equation (3.2.30) it follows that

$$(3.2.36) \quad J(m) = T^{-1}(R(m))$$

We can write transformation $G(r(a))$ of the set RM as

$$(3.2.37) \quad G(r(a)) : R(m) \rightarrow G(r(a))(R(m))$$

Since T is bijection, we define transformation

$$(3.2.38) \quad T^{-1}(R(m)) \rightarrow T^{-1}(G(r(a))(R(m)))$$

of the set M/S . Transformation (3.2.38) depends on $r(a) \in rA$. Since t is bijection, then from equation (3.2.33) it follows that

$$(3.2.39) \quad j(a) = t^{-1}(r(a))$$

Since, by construction, diagram (5) is commutative, then transformation (3.2.38) coincides with transformation (3.2.31). We can write the equation (3.2.35) as

$$(3.2.40) \quad T^{-1}(\omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m))) = \omega(F(j(a_1)), \dots, F(j(a_n)))(J(m))$$

Therefore (t^{-1}, T^{-1}) is morphism of representations G and F (the statement (7) of the theorem).

Diagram (6) is the most simple case in our prove. Since map I is immersion and diagram (2) is commutative, we identify $n \in N$ and $R(m)$ when $n \in \text{Im}R$. Similarly, we identify corresponding transformations.

$$(3.2.41) \quad g'(i(r(a)))(I(R(m))) = I(G(r(a))(R(m)))$$

$$\omega(g'(r(a_1)), \dots, g'(r(a_n)))(R(m)) = I(\omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m)))$$

Therefore, (i, I) is morphism of representations G and g (the statement (8) of the theorem).

To prove the statement (9) of the theorem we need to show that defined in the proof representation g' is congruent with representation g , and operations over transformations are congruent with corresponding operations over $*N$.

$$\begin{aligned}
 g'(i(r(a)))(I(R(m))) &= I(G(r(a))(R(m))) && \text{by (3.2.41)} \\
 &= I(G(t(j(a)))(T(J(m)))) && \text{by (3.2.15), (3.2.19)} \\
 &= IT(F(j(a))(J(m))) && \text{by (3.2.34)} \\
 &= ITJ(f(a)(m)) && \text{by (3.2.29)} \\
 &= R(f(a)(m)) && \text{by (3.2.17)} \\
 &= g(r(a))(R(m)) && \text{by (3.2.3)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m)) &= T(\omega(F(j(a_1)), \dots, F(j(a_n)))(J(m))) \\
 &= T(F(\omega(j(a_1), \dots, j(a_n)))(J(m))) \\
 &= T(F(j(\omega(a_1, \dots, a_n)))(J(m))) \\
 &= T(J(f(\omega(a_1, \dots, a_n))(m)))
 \end{aligned}$$

□

Definition 3.2.16. Let

$$f : A \rightarrow *M$$

be representation of Ω_1 -algebra A ,

$$g : B \rightarrow *N$$

be representation of Ω_1 -algebra B . Let

$$r : A \longrightarrow B \quad R : M \longrightarrow N$$

be morphism of representations from f into g such that f is isomorphism of Ω_1 -algebra and g is isomorphism of Ω_2 -algebra. Then map (r, R) is called **isomorphism of representations**. □

Theorem 3.2.17. In the decomposition (3.2.21), the map (t, T) is isomorphism of representations F and G .

PROOF. The statement of the theorem is corollary of definition 3.2.16 and statements (6) and (7) of the theorem 3.2.15. □

From theorem 3.2.15 it follows that we can reduce the problem of studying of morphism of representations of Ω_1 -algebra to the case described by diagram

(3.2.42)

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{J} & M/S \\
 \downarrow f(a) & & \downarrow F(j(a)) \\
 M & \xrightarrow{J} & M/S \\
 \uparrow f & & \uparrow F \\
 A & \xrightarrow{j} & A/s
 \end{array}$$

Theorem 3.2.18. *We can supplement diagram (3.2.42) with representation F_1 of Ω_1 -algebra A into set M/S such that diagram*

$$(3.2.43) \quad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{J} & M/S \\ f(a) \downarrow & & \downarrow F(j(a)) \\ M & \xrightarrow{J} & M/S \\ f \swarrow & F_1 \nearrow & \\ A & \xrightarrow{j} & A/s \\ & F \nearrow & \end{array}$$

is commutative. The set of transformations of representation F and the set of transformations of representation F_1 coincide.

PROOF. To prove theorem it is enough to assume

$$F_1(a) = F(j(a))$$

Since map j is surjection, then $\text{Im} F_1 = \text{Im} F$. Since j and F are homomorphisms of Ω_1 -algebra, then F_1 is also homomorphism of Ω_1 -algebra. $\square$

Theorem 3.2.18 completes the series of theorems dedicated to the structure of morphism of representations Ω_1 -algebra. From these theorems it follows that we can simplify task of studying of morphism of representations Ω_1 -algebra and not go beyond morphism of representations of form

$$id : A \longrightarrow A \quad R : M \longrightarrow N$$

In this case we identify morphism of (id, R) representations of Ω_1 -algebra and map R . We will use diagram

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{R} & N \\ f(a) \downarrow & & \downarrow g(a) \\ M & \xrightarrow{R} & N \\ f \swarrow & g \nearrow & \\ A & & \end{array}$$

to represent morphism (id, R) of representations of Ω_1 -algebra. From diagram it follows

$$(3.2.44) \quad R \circ f(a) = g(a) \circ R$$

By analogy with definition 3.2.11. we give following definition.

Definition 3.2.19. We define **category $T \star A$ T -representations of Ω_1 -algebra A** . T -representations of Ω_1 -algebra A are objects of this category. Morphisms (id, R) of T -representations of Ω_1 -algebra A are morphisms of this category. $\square$

3.3. Automorphism of Representation of Universal Algebra

Definition 3.3.1. Let

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra M . The morphism of representations of Ω_1 -algebra

$$(r : A \rightarrow A, R : M \rightarrow M)$$

such, that r is endomorphism of Ω_1 -algebra and R is endomorphism of Ω_2 -algebra is called **endomorphism of representation** f . $\square$

Definition 3.3.2. Let

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra M . The morphism of representations of Ω_1 -algebra

$$(r : A \rightarrow A, R : M \rightarrow M)$$

such, that r is automorphism of Ω_1 -algebra and R is automorphism of Ω_2 -algebra is called **automorphism of representation** f . $\square$

Theorem 3.3.3. Let

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

be representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra M . The set of automorphisms of the representation f forms **loop** $\mathfrak{A}(f)$.^{3.2}

PROOF. Let $(r, R), (p, P)$ be automorphisms of the representation f . According to definition 3.3.2 maps r, p are automorphisms of Ω_1 -algebra A and maps R, P are automorphisms of Ω_2 -algebra M . According to theorem II.3.2 ([14], p. 57), the map rp is automorphism of Ω_1 -algebra A and the map RP is automorphism of Ω_2 -algebra M . From the theorem 3.2.10 and the definition 3.3.2, it follows that product of automorphisms (rp, RP) of representation f is automorphism of the representation f .

Let (r, R) be an automorphism of the representation f . According to definition 3.3.2 the map r is automorphism of Ω_1 -algebra A and the map R is automorphism of Ω_2 -algebra M . Therefore, the map r^{-1} is automorphism of Ω_1 -algebra A and the map R^{-1} is automorphism of Ω_2 -algebra M . The equation (3.2.4) is true for automorphism (r, R) . Assume $a' = r(a)$, $m' = R(m)$. Since r and R are automorphisms then $a = r^{-1}(a')$, $m = R^{-1}(m')$ and we can write (3.2.4) in the form

$$(3.3.1) \quad R(f(r^{-1}(a'))(R^{-1}(m'))) = g(a')(m')$$

Since the map R is automorphism of Ω_2 -algebra M , then from the equation (3.3.1) it follows that

$$(3.3.2) \quad f(r^{-1}(a'))(R^{-1}(m')) = R^{-1}(g(a')(m'))$$

The equation (3.3.2) corresponds to the equation (3.2.4) for the map (r^{-1}, R^{-1}) . Therefore, map (r^{-1}, R^{-1}) of the representation f . $\square$

^{3.2}Look [5], p. 24, [4] for definition of loop.

Remark 3.3.4. It is evident that the set of automorphisms of Ω_1 -algebra A also forms loop. Of course, it is attractive to assume that the set of automorphisms forms a group. Since the product of automorphisms f and g is automorphism fg , then automorphisms $(fg)h$ and $f(gh)$ are defined. However, it does not follow from this statement that

$$(fg)h = f(gh)$$

□

3.4. Representation of Group

Group is among few algebras that allow somebody to consider the product of transformations of the set M in such a way that, if transformations belong to the representation, then their product also belongs to the representation. In case of group representation we can define homomorphism (3.1.1) either as

$$f(ab) = f(a) \circ f(b)$$

or as

$$f(ab) = f(b) \circ f(a)$$

We should remember that order of maps in product depends on order of maps on diagram and how these maps act over elements of the set (from left or from right).

Definition 3.4.1. Let *M be a group and δ be unit of group *M . Let G be group. We call a homomorphism of group

$$(3.4.1) \quad f : G \rightarrow {}^*M$$

covariant $T\star$ -representation of group G in set M if map f holds

$$(3.4.2) \quad f(ab)u = f(a)(f(b)u)$$

□

Remark 3.4.2. Since map (3.4.1) is homomorphism, then

$$(3.4.3) \quad f(ab)u = (f(a)f(b))u$$

We use here convention

$$f(a)f(b) = f(a) \circ f(b)$$

Thus, the idea of covariant representation is that we multiply elements of group in the same order as we multiply transformations of representation. From equations (3.4.2) and (3.4.3) it follows

$$(3.4.4) \quad (f(a)f(b))u = f(a)(f(b)u)$$

Equation (3.4.4) together with associativity of product of transformations expresses **associative law for covariant $T\star$ -representation**. This allows writing of equation (3.4.4) without using of brackets

$$f(ab)u = f(a)f(b)u$$

□

Definition 3.4.3. Let *M be a group and δ be unit of group *M . Let G be group. We call an antihomomorphism of group

$$f : G \rightarrow {}^*M$$

contravariant T -representation of group G in set M if map f holds

$$(3.4.5) \quad f(ba)u = f(a)(f(b)u)$$

□

Definition 3.4.4. Let M^* be a group and δ be unit of group M^* . Let G be group. We call map

$$(3.4.6) \quad f : G \rightarrow M^*$$

covariant *T -representation of group G in set M if map f holds

$$(3.4.7) \quad uf(ab) = (uf(a))f(b)$$

□

Remark 3.4.5. Since map (3.4.6) is homomorphism, then

$$(3.4.8) \quad uf(ab) = u(f(a)f(b))$$

From equations (3.4.7) and (3.4.8) it follows

$$(3.4.9) \quad (f(a)f(b))u = (uf(a))f(b)$$

Equation (3.4.9) together with associativity of product of transformations expresses **associative law for covariant *T -representation**. This allows writing of equation (3.4.9) without using of brackets

$$uf(ab) = uf(a)f(b)$$

□

Definition 3.4.6. Let M^* be a group and δ be unit of group M^* . Let G be group. We call map

$$f : G \rightarrow M^*$$

contravariant *T -representation of group G in set M if map f holds

$$(3.4.10) \quad uf(ab) = (uf(a))f(b)$$

□

Definition 3.4.7. We call the transformation

$$t : M \rightarrow M$$

nonsingular transformation, if there exists inverse map. □

Theorem 3.4.8. For any $g \in G$ transformation is nonsingular and satisfies equation

$$(3.4.11) \quad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$$

PROOF. Since (3.4.5) and

$$f(e) = \delta$$

we have

$$u = \delta(u) = f(gg^{-1})(u) = f(g)(f(g^{-1})(u))$$

This completes the proof. □

Theorem 3.4.9. *The group operation determines two different representations on the group:*

- *The left or $T\star$ -shift $t_\star$*

$$(3.4.12) \quad \begin{aligned} b' &= t_\star(a)b = ab \\ b' &= t_\star(a)(b) = ab \end{aligned}$$

is covariant $T\star$ -representation

$$(3.4.13) \quad t_\star(ab) = t_\star(a) \circ t_\star(b)$$

- *The right or $\star T$ -shift $\star t$*

$$(3.4.14) \quad \begin{aligned} b' &= b \star t(a) = ba \\ b' &= \star t(a)(b) = ba \end{aligned}$$

is covariant $\star T$ -representation

$$(3.4.15) \quad \star t(ab) = \star t(a) \circ \star t(b)$$

PROOF. $T\star$ -shift is not a representation of group in a group, because the transformation $t_\star$ is not a homomorphism of group. $T\star$ -shift is the representation of the group in the set which is carrier of this group. Similar remark is true for $\star T$ -shift.

Equation (3.4.13) follows from associativity of product

$$t_\star(ab)c = (ab)c = a(bc) = t_\star(a)(t_\star(b)c) = (t_\star(a) \circ t_\star(b))c$$

In a similar manner we prove the equation (3.4.15). □

Theorem 3.4.10. *Let $T\star$ -representation*

$$u' = f(a)u$$

be contravariant $T\star$ -representation. Then $T\star$ -representation

$$u' = h(a)u = f(a^{-1})u$$

is covariant $T\star$ -representation.

PROOF. Statement follows from chain of equations

$$h(ab) = f((ab)^{-1}) = f(b^{-1}a^{-1}) = f(a^{-1})f(b^{-1}) = h(a)h(b)$$

□

Remark 3.4.11. If we suppose the choice of a side to place the operator of representation on is arbitrary, we can get the impression we may not go beyond exploration either $T\star$ -representations or covariant representations. Section 5.2 serves as good illustration that different forms of representation are essential. When we need to show the order of factors we will use operational notation. Theorems 3.5.12, 3.5.15 are examples when functional notation has advantage. □

Definition 3.4.12. Let f be $T\star$ -representation of the group G in set M . For any $v \in M$ we define **orbit of $T\star$ -representation of the group G** as set

$$f(G)v = \{w = f(g)v : g \in G\}$$

□

Since $f(e) = \delta$ we have $v \in f(G)v$.

Theorem 3.4.13. *Suppose*

$$(3.4.16) \quad v \in f(G)u$$

Then

$$f(G)u = f(G)v$$

PROOF. From (3.4.16) it follows that there exists $a \in G$ such that

$$(3.4.17) \quad v = f(a)u$$

Suppose $w \in f(G)v$. Then there exists $b \in G$ such that

$$(3.4.18) \quad w = f(b)v$$

If we substitute (3.4.17) into (3.4.18) we get

$$(3.4.19) \quad w = f(b)(f(a)u)$$

Since (3.4.2), we see that from (3.4.19) it follows that $w \in f(G)u$. Thus

$$f(G)v \subseteq f(G)u$$

Since (3.4.11), we see that from (3.4.17) it follows that

$$(3.4.20) \quad u = f(a)^{-1}v = f(a^{-1})v$$

From (3.4.20) it follows that $u \in f(G)v$ and therefore

$$f(G)u \subseteq f(G)v$$

This completes the proof. $\square$

Thus, $T\star$ -representation f of group G in set M forms equivalence S and the orbit $f(G)u$ is equivalence class. We will use notation $M/f(G)$ for quotient set M/S and this set is called **space of orbits of $T\star$ -representation f** .

Theorem 3.4.14. *Suppose f_1 is $T\star$ -representation of group G in set M_1 and f_2 is $T\star$ -representation of group G in set M_2 . Then we introduce **direct product of $T\star$ -representations f_1 and f_2 of group***

$$\begin{aligned} f &= f_1 \times f_2 : G \rightarrow M_1 \otimes M_2 \\ f(g) &= (f_1(g), f_2(g)) \end{aligned}$$

PROOF. To show that f is a representation, it is enough to prove that f satisfies the definition 3.4.1.

$$\begin{aligned} f(e) &= (f_1(e), f_2(e)) = (\delta_1, \delta_2) = \delta \\ f(ab)u &= (f_1(ab)u_1, f_2(ab)u_2) \\ &= (f_1(a)(f_1(b)u_1), f_2(a)(f_2(b)u_2)) \\ &= f(a)(f_1(b)u_1, f_2(b)u_2) \\ &= f(a)(f(b)u) \end{aligned}$$

$\square$

3.5. Single Transitive $T\star$ -Representation of Group

Definition 3.5.1. We call **kernel of inefficiency of $T\star$ -representation of group G** a set

$$K_f = \{g \in G : f(g) = \delta\}$$

□

Theorem 3.5.2. *A kernel of inefficiency of the $T\star$ -representation of group G is a subgroup of the group G .*

PROOF. Assume $f(a_1) = \delta$ and $f(a_2) = \delta$. Then

$$\begin{aligned} f(a_1 a_2)u &= f(a_1)(f(a_2)u) = u \\ f(a^{-1}) &= f^{-1}(a) = \delta \end{aligned}$$

□

Theorem 3.5.3. *$T\star$ -representation of the group G is **effective** iff kernel of inefficiency $K_f = \{e\}$.*

PROOF. Statement is corollary of definitions 3.1.8 and 3.5.1 and of the theorem 3.5.2. □

If an action is not effective we can switch to an effective one by changing group $G_1 = G|K_f$ using factorization by the kernel of inefficiency. This means that we can study only an effective action.

Definition 3.5.4. Consider $T\star$ -representation f of group G in set M . A **little group** or **stability group** of $x \in M$ is the set

$$G_x = \{g \in G : f(g)x = x\}$$

$T\star$ -representation f of group G is said to be **free**, if for any $x \in M$ stability group $G_x = \{e\}$. □

Theorem 3.5.5. *Given free $T\star$ -representation f of group G in the set A , there exist 1 – 1 correspondence between orbits of representation, as well between orbit of representation and group G .*

PROOF. Given $a \in A$ there exist $g_1, g_2 \in G$

$$(3.5.1) \quad f(g_1)a = f(g_2)a$$

We multiply both parts of equation (3.5.1) by $f(g_1^{-1})$

$$a = f(g_1^{-1})f(g_2)a$$

Since the representation is free, $g_1 = g_2$. Since we established 1 – 1 correspondence between orbit and group G , we proved the statement of the theorem. □

Definition 3.5.6. We call a space V **homogeneous space of group G** if we have single transitive $T\star$ -representation of group G on V . □

Theorem 3.5.7. *If we define a single transitive covariant representation f of the group G on the manifold A then we can uniquely define coordinates on A using coordinates on the group G .*

If f is a covariant $T\star$ -representation than $f(a)$ is equivalent to the $T\star$ -shift $t_\star(a)$ on the group G . If f is a covariant $\star T$ -representation than $f(a)$ is equivalent to the $\star T$ -shift $\star t(a)$ on the group G .

PROOF. We select a point $v \in A$ and define coordinates of a point $w \in A$ as coordinates of $a \in G$ such that $w = f(a)v$. Coordinates defined this way are unique up to choice of an initial point $v \in A$ because the action is effective.

If f is a covariant $T\star$ -representation we will use the notation

$$f(a)v = av$$

Because the notation

$$f(a)(f(b)v) = a(bv) = (ab)v = f(ab)v$$

is compatible with the group structure we see that the covariant $T\star$ -representation f is equivalent to the $T\star$ -shift.

If f is a covariant $\star T$ -representation we will use the notation

$$vf(a) = va$$

Because the notation

$$(vf(b))f(a) = (vb)a = v(ba) = vf(ba)$$

is compatible with the group structure we see that the covariant $\star T$ -representation f is equivalent to the $\star T$ -shift. $\square$

Remark 3.5.8. We will write effective $T\star$ -covariant representation of the group G as

$$v' = t_\star(a)v = av$$

Orbit of this representation is

$$Gv = t_\star(G)v$$

We will use notation $M/t_\star(G)$ space of orbits of effective $T\star$ -covariant representation of the group. $\square$

Remark 3.5.9. We will write effective $\star T$ -covariant representation of the group G as

$$v' = v \star t(a) = va$$

Orbit of this representation is

$$vG = v \star t(G)$$

We will use notation $M/\star t(G)$ for the space of orbits of effective $\star T$ -covariant representation of the group. $\square$

Theorem 3.5.10. *Free $T\star$ -representation is effective. Free $T\star$ -representation f of group G in set M is single transitive representation on orbit.*

PROOF. The statement of theorem is the corollary of definition 3.5.4. $\square$

Theorem 3.5.11. *$T\star$ - and $\star T$ -shifts on group G are commuting.*

PROOF. This is the consequence of the associativity on the group G

$$(t_\star(a) \circ \star t(b))c = a(cb) = (ac)b = (\star t(b) \circ t_\star(a))c$$

$\square$

Theorem 3.5.11 can be phrased in the following way.

Theorem 3.5.12. *Let G be group. For any $a \in G$, the map $(id, t_\star(a))$ is automorphism of representation $\star t$.*

PROOF. According to theorem 3.5.11

$$(3.5.2) \quad t_\star(a) \circ \star t(b) = \star t(b) \circ t_\star(a)$$

Equation (3.5.2) coincides with equation (3.2.3) from definition 3.2.2 when $r = id$, $R = t_\star(a)$. $\square$

Theorem 3.5.13. *Suppose we defined a single transitive covariant $T\star$ -representation f of the group G on the manifold M . Then we can uniquely define a single transitive covariant $\star T$ -representation h of the group G on the manifold M such that diagram*

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{h(a)} & M \\ \downarrow f(b) & & \downarrow f(b) \\ M & \xrightarrow{h(a)} & M \end{array}$$

is commutative for any $a, b \in G$.^{3.3}

PROOF. We use group coordinates for points $v \in M$. Then according to theorem 3.5.7 we can write the left shift $t_\star(a)$ instead of the transformation $f(a)$.

Let points $v_0, v \in M$. Then we can find one and only one $a \in G$ such that

$$v = v_0 a = v_0 \star t(a)$$

We assume

$$h(a) = \star t(a)$$

For some $b \in G$ we have

$$w_0 = f(b)v_0 = t_\star(b)v_0 \quad w = f(b)v = t_\star(b)v$$

According to theorem 3.5.11 the diagram

$$(3.5.3) \quad \begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=\star t(a)} & v \\ \downarrow f(b)=t_\star(b) & & \downarrow f(b)=t_\star(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)=\star t(a)} & w \end{array}$$

is commutative.

Changing b we get that w_0 is an arbitrary point of M .

We see from the diagram that if $v_0 = v$ then $w_0 = w$ and therefore $h(e) = \delta$. On other hand if $v_0 \neq v$ then $w_0 \neq w$ because the $T\star$ -representation f is single transitive. Therefore the $\star T$ -representation h is effective.

In the same way we can show that for given w_0 we can find a such that $w = h(a)w_0$. Therefore the $\star T$ -representation h is single transitive.

In general the product of transformations of the $T\star$ -representation f is not commutative and therefore the $\star T$ -representation h is different from the $T\star$ -representation f . In the same way we can create a $T\star$ -representation f using the $\star T$ -representation h . $\square$

Representations f and h are called **twin representations of the group G** .

^{3.3}You can see this statement in [3].

Remark 3.5.14. It is clear that transformations $t_*(a)$ and $_*t(a)$ are different until the group G is nonabelian. However they both are maps onto. Theorem 3.5.13 states that if both $_*T$ - and T_* -shift presentations exist on the manifold M we can define two commuting representations on the manifold M . The $_*T$ -shift or the T_* -shift only cannot represent both types of representation. To understand why it is so let us change diagram (3.5.3) and assume $h(a)v_0 = t_*(a)v_0 = v$ instead of $h(a)v_0 = v_0_*t(a) = v$ and let us see what expression $h(a)$ has at the point w_0 . The diagram

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=t_*(a)} & v \\ \downarrow f(b)=t_*(b) & & \downarrow f(b)=t_*(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

is equivalent to the diagram

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=t_*(a)} & v \\ \uparrow f^{-1}(b)=t_*(b^{-1}) & & \downarrow f(b)=t_*(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

and we have $w = bv = bav_0 = bab^{-1}w_0$. Therefore

$$h(a)w_0 = (bab^{-1})w_0$$

We see that the representation of h depends on its argument. □

Theorem 3.5.15. *Let f and h be twin representations of the group G . For any $a \in G$ the map $(id, h(a))$ is automorphism of representation f .*

PROOF. The statement of theorem is corollary of theorems 3.5.12 and 3.5.13. □

Remark 3.5.16. Is there an automorphism of representation t_* different from automorphism $(id, _*t(a))$? If we assume

$$\begin{aligned} r(g) &= cgc^{-1} \\ R(a)(m) &= cmac^{-1} \end{aligned}$$

then it is easy to see that the map $(r, R(a))$ is automorphism of the representation t_* . □

CHAPTER 4

Vector Space over Division Ring

4.1. Vector Space

To define $T\star$ -representation

$$f : R \rightarrow {}^*\overline{M}$$

of ring R on the set $\overline{M}$ we need to define the structure of the ring on the set ${}^*\overline{M}$.^{4.1}

Theorem 4.1.1. *$T\star$ -representation f of the ring R on the set $\overline{M}$ is defined iff $T\star$ -representations of multiplicative and additive groups of the ring R are defined and these $T\star$ -representations hold relationship*

$$f(a(b+c)) = f(a)f(b) + f(a)f(c)$$

PROOF. Theorem follows from definition 3.1.4. □

Definition 4.1.2. $\overline{M}$ is a $R\star$ -module over a ring R if $\overline{M}$ is an Abelian group and there exists $T\star$ -representation of ring R . □

According to our notation $R\star$ -module is **left module** and $\star R$ -module is **right module**.

Since a field is a special case of a ring, vector space over the field has more properties then module over the ring. It is very hard, if possible at all, to extend definitions, which work in a vector space, to a module over an arbitrary ring. A definition of a basis and dimension of vector space are closely linked with the possibility of finding a solution of a linear equation in a ring. Properties of the linear equation in division ring are close to properties of the linear equation in

^{4.1}Is it possible to define an addition on the set ${}^*\overline{M}$, if this operation is not defined on the set $\overline{M}$. The answer on this question is positive.

Let $\overline{M} = B \cup C$ and let $F : B \rightarrow C$ be one to one map. We define the set ${}^*\overline{M}$ of $T\star$ -transformations of the set $\overline{M}$ according to the following rule. Let $V \subseteq B$. Let the $T\star$ -transformation F_V be given by

$$F_V x = \begin{cases} x & x \in B \setminus V \\ Fx & x \in V \\ x & x \in C \setminus F(V) \\ F^{-1}x & x \in F(V) \end{cases}$$

We define sum of $T\star$ -transformations according rule

$$\begin{aligned} F_V + F_W &= F_{V \triangle W} \\ V \triangle W &= (V \cup W) \setminus (V \cap W) \end{aligned}$$

It is evident that

$$\begin{aligned} F_\emptyset + F_V &= F_V \\ F_V + F_V &= F_\emptyset \end{aligned}$$

Therefore, the map $F_\emptyset$ is zero of the addition, and the set ${}^*\overline{M}$ is the Abelian group.

field. This is why we hope that properties of vector space over division ring are close to properties of the vector space over the field.

Theorem 4.1.3. *$T\star$ -representation of the division ring D is **effective** iff $T\star$ -representation of its multiplicative group is effective.*

PROOF. Suppose

$$(4.1.1) \quad f : D \rightarrow {}^*M$$

is $T\star$ -representation of the division ring D . Suppose elements a, b of the multiplicative group cause the same $T\star$ -transformation. Then

$$(4.1.2) \quad f(a)m = f(b)m$$

for any $m \in M$. Performing transformation $f(a^{-1})$ on both sides of the equation (4.1.2), we obtain

$$m = f(a^{-1})(f(b)m) = f(a^{-1}b)m$$

□

According to the remark 3.1.9, since the representation of the division ring is effective, we identify an element of the division ring and $T\star$ -transformation corresponding to this element.

Definition 4.1.4. $\overline{V}$ is a $D\star$ -vector space over a division ring D if $\overline{V}$ is an Abelian group and there exists effective $T\star$ -representation of division ring D . □

Theorem 4.1.5. *Following conditions hold for $D\star$ -vector space:*

- **associative law**

$$(4.1.3) \quad (ab)\overline{m} = a(b\overline{m})$$

- **distributive law**

$$(4.1.4) \quad a(\overline{m} + \overline{n}) = a\overline{m} + a\overline{n}$$

$$(4.1.5) \quad (a + b)\overline{m} = a\overline{m} + b\overline{m}$$

- **unitarity law**

$$(4.1.6) \quad 1\overline{m} = \overline{m}$$

for any $a, b \in D, \overline{m}, \overline{n} \in \overline{V}$. We call $T\star$ -representation $D\star$ -product of vector over scalar.

PROOF. Since $T\star$ -transformation a is automorphism of the Abelian group, we obtain the equation (4.1.4). Since $T\star$ -representation is homomorphism of the additive group of division ring D , we obtain the equation (4.1.5). Since $T\star$ -representation is $T\star$ -representation of the multiplicative group of division ring D , we obtain the equations (4.1.3) and (4.1.6). □

According to our notation $D\star$ -vector space is **left vector space** and $\star D$ -vector space is **right vector space**.

Definition 4.1.6. Let $\overline{V}$ be a $D\star$ -vector space over a division ring D . Set of vectors $\overline{N}$ is a **subspace of $D\star$ -vector space $\overline{V}$** if

$$\overline{a} + \overline{b} \in \overline{N}$$

$$k\overline{a} \in \overline{N}$$

$$\overline{a}, \overline{b} \in \overline{N} \quad k \in D$$

□

Example 4.1.7. Let D_n^m be set of $m \times n$ matrices over division ring D . We define addition

$$a + b = \begin{pmatrix} a_i^j \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_i^j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_i^j + b_i^j \end{pmatrix}$$

and product over scalar

$$da = d \begin{pmatrix} a_i^j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} da_i^j \end{pmatrix}$$

$a = 0$ iff $a_i^j = 0$ for any i, j . We can verify directly that D_n^m is a $D\star$ -vector space. when product is defined from left. Otherwise D_n^m is $\star D$ -vector space. Vector space D_n^m is called **$D\star$ -matrices vector space**. □

4.2. Vector Space Type

The product of vector over scalar is asymmetric because the product is defined for objects of different sets. However we see difference between $D\star$ - and $\star D$ -vector space only when we work with coordinate representation. When we speak vector space is $D\star$ - or $\star D$ - we point out how we multiply coordinates of vector over elements of division ring: from left or right.

Definition 4.2.1. Suppose u, v are vectors of $D\star$ -vector space $\overline{V}$. We call vector w **$D\star$ -linear composition of vectors** u and v when we can write $w = au + bv$ where a and b are scalars. □

We can extend definition of the linear composition on any finite set of vectors. Using generalized indexes to enumerate vectors we can represent set of vectors as one dimensional matrix. We use the convention that we represent any set of vectors of the vector space or as $\star$ -row either as $\star$ -row. This representation defines type of notation of linear composition. Getting this representation in $D\star$ - or $\star D$ -vector space we get four different models of vector space.

For an opportunity to show without change of the notation what kind of vector space ($D\star$ - or $\star D$ -) we study we introduce new notation. We call symbol **$D\star$ vector space type** and this symbol means that we study $D\star$ -vector space over division ring D . The symbol of product in the type of vector space points to matrix operation used in the linear composition.

Example 4.2.2. Let $\star$ -row

$$\overline{a} = \begin{pmatrix} {}^1\overline{a} \\ \dots \\ {}^n\overline{a} \end{pmatrix}$$

represent the set of vectors ${}^i\overline{a}, i \in I$, of $D_*\star$ -vector space $\overline{V}$ and $\star$ -row

$$c = \begin{pmatrix} c_1 & \dots & c_n \end{pmatrix}$$

represent the set of scalars $c_i, i \in I$. Then we can write the linear composition of vectors ${}^i\overline{a}$ as

$$c_i {}^i\overline{a} = c_* \star \overline{a}$$

We use notation $D_*\star\overline{V}$ when we want to tell that $\overline{V}$ is $D_*\star$ -vector space. □

Example 4.2.3. Let ${}_{*}\text{-row}$

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} {}_1\bar{a} & \dots & {}_n\bar{a} \end{pmatrix}$$

represent the set of vectors ${}_i\bar{a}, i \in I$, of $D^*_{*}\text{-vector space } \bar{V}$ and ${}^*\text{-row}$

$$c = \begin{pmatrix} c^1 \\ \dots \\ c^n \end{pmatrix}$$

represent the set of scalars $c^i, i \in I$. Then we can write the linear composition of vectors ${}_i\bar{a}$ as

$$c^i {}_i\bar{a} = c^* {}_*\bar{a}$$

We use notation $D^*_{*}\bar{V}$ when we want to tell that $\bar{V}$ is D^*_{*} -vector space. $\square$

Example 4.2.4. Let ${}^*\text{-row}$

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} \bar{a}^1 \\ \dots \\ \bar{a}^n \end{pmatrix}$$

represent the set of vectors $\bar{a}^i, i \in I$, of ${}^*D\text{-vector space } \bar{V}$ and ${}^*\text{-row}$

$$c = \begin{pmatrix} {}_1c & \dots & {}_nc \end{pmatrix}$$

represent the set of scalars ${}_ic, i \in I$. Then we can write the linear composition of vectors $\bar{a}^i$ as

$$\bar{a}^i {}_ic = \bar{a}^* {}_*c$$

We use notation $\bar{V}^*_{*}D$ when we want to tell that $\bar{V}$ is *D -vector space. $\square$

Example 4.2.5. Let ${}_{*}\text{-row}$

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} \bar{a}_1 & \dots & \bar{a}_n \end{pmatrix}$$

represent the set of vectors $\bar{A}_i, i \in I$, of ${}^*D\text{-vector space } \bar{V}$ and ${}^*\text{-row}$

$$c = \begin{pmatrix} {}^1c \\ \dots \\ {}^nc \end{pmatrix}$$

represent the set of scalars ${}_ic, i \in I$. Then we can write the linear composition of vectors $\bar{a}_i$ as

$$\bar{a}_i {}^ic = \bar{a}_* {}^*c$$

We use notation $\bar{V}^*_{*}D$ when we want to tell that $\bar{V}$ is *D -vector space. $\square$

Remark 4.2.6. We extend to vector space and its type convention described in remark 2.2.15. For instance, we execute operations in expression

$$A_* {}^*B_* {}^*v\lambda$$

from left to right. This corresponds to the *D -vector space. However we can execute product from right to left. In custom notation this expression is

$$\lambda v {}^*B {}^*A$$

and corresponds to $D^*{}^*$ -vector space. Similarly, reading this expression from down up we get expression

$$A^*{}^*B^*{}^*v\lambda$$

corresponding to *D -vector space. $\square$

4.3. *D -Basis of Vector Space

Definition 4.3.1. Vectors $\overline{A}_i$, $i \in I$, of *D -vector space $\overline{V}$ are *D -linearly independent if $c = 0$ follows from the equation

$$\overline{A}_*{}^*c = 0$$

Otherwise vectors $\overline{A}_i$ are *D -linearly dependent. $\square$

Definition 4.3.2. We call set of vectors $\overline{e} = (\overline{e}_i, i \in I)$ a *D -basis for vector space if vectors $\overline{e}_i$ are *D -linearly independent and adding to this system any other vector we get a new system which is *D -linearly dependent. $\square$

Theorem 4.3.3. If $\overline{e}$ is a *D -basis of vector space $\overline{V}$ then any vector $\overline{v} \in \overline{V}$ has one and only one expansion

$$(4.3.1) \quad \overline{v} = \overline{e}_*{}^*v$$

relative to this *D -basis.

PROOF. Because system of vectors $\overline{e}_i$ is a maximal set of *D -linearly independent vectors the system of vectors $\overline{v}, \overline{e}_i$ is $D^*{}^*$ -linearly dependent and in equation

$$(4.3.2) \quad \overline{v}b + \overline{e}_*{}^*c = 0$$

at least b is different from 0. Then equation

$$(4.3.3) \quad \overline{v} = \overline{e}_*{}^*(-cb^{-1})$$

follows from (4.3.2). (4.3.1) follows from (4.3.3).

Assume we get another expansion

$$(4.3.4) \quad \overline{v} = \overline{e}_*{}^*v'$$

We subtract (4.3.1) from (4.3.4) and get

$$0 = \overline{e}_*{}^*(v' - v)$$

Because vectors $\overline{e}_i$ are *D -linearly independent we get

$$v' - v = 0$$

$\square$

Definition 4.3.4. We call the matrix v in expansion (4.3.1) **coordinate matrix of vector $\overline{v}$ in *D -basis $\overline{e}$** and we call its elements **coordinates of vector $\overline{v}$ in *D -basis $\overline{e}$** . $\square$

Theorem 4.3.5. Set of coordinates a of vector $\overline{a}$ relative *D -basis $\overline{e}$ forms *D -vector space $\textcolor{blue}{D}^n$ isomorphic *D -vector space $\overline{V}$. This *D -vector space is called **coordinate *D -vector space**. This isomorphism is called **coordinate *D -isomorphism**.

PROOF. Suppose vectors $\bar{a}$ and $\bar{b} \in \bar{V}$ have expansion

$$\begin{aligned}\bar{a} &= \bar{e}_*^* a \\ \bar{b} &= \bar{e}_*^* b\end{aligned}$$

relative basis $\bar{e}$. Then

$$\begin{aligned}\bar{a} + \bar{b} &= \bar{e}_*^* a + \bar{e}_*^* b = \bar{e}_*^* (a + b) \\ \bar{a}m &= (\bar{e}_*^* a)m = \bar{e}_*^* (ma)\end{aligned}$$

for any $m \in D$. Thus, operations in a vector space are defined by coordinates

$$\begin{aligned}{}^i(a + b) &= {}^i a + {}^i b \\ {}^i(am) &= {}^i am\end{aligned}$$

This completes the proof. $\square$

Example 4.3.6. Let $\bar{e} = (\bar{e}_i, i \in I, |I| = n)$ be a $*D$ -basis of vector space D^n . The coordinate matrix

$$a = \begin{pmatrix} {}^1a \\ \dots \\ {}^na \end{pmatrix} = ({}^i a, i \in I)$$

of vector $\bar{a}$ in $*D$ -basis $\bar{e}$ is called $*D$ -vector.^{4.2} We call vector space D^n **$*D$ -vector space**.

Let $*\text{-row}$

$$(4.3.5) \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} \bar{A}_1 & \dots & \bar{A}_m \end{pmatrix} = (\bar{A}_j, j \in J)$$

be set of vectors. Vectors $\bar{A}_j$ have expansion

$$\bar{A}_j = \bar{e}_*^* A_j$$

If we substitute coordinate matrices of vectors $\bar{A}_j$ in the matrix (4.3.5) we get matrix

$$A = \left(\begin{pmatrix} {}^1A_1 \\ \dots \\ {}^nA_1 \end{pmatrix} \quad \dots \quad \begin{pmatrix} {}^1A_m \\ \dots \\ {}^nA_m \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_m \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^nA_1 & \dots & {}^nA_m \end{pmatrix} = ({}^i A_j)$$

We call the matrix A **coordinate matrix of set of vectors** $(\bar{A}_j, j \in J)$ in basis $\bar{e}$ and we call its elements **coordinates of set of vectors** $(\bar{A}_j, j \in J)$ in basis $\bar{e}$.

$*\text{-Row}$

$$\bar{f} = \begin{pmatrix} \bar{f}_1 & \dots & \bar{f}_n \end{pmatrix} = (\bar{f}_j, j \in I)$$

represents the $*D$ -basis $\bar{f}$ of $*\text{-rows vector space}$ D^n . We tell that coordinate matrix f of set of vectors $(\bar{f}_j, j \in I)$ defines coordinates ${}^i f_j$ of basis $\bar{f}$ relative basis $\bar{e}$. $\square$

^{4.2} $*D$ -vector is an analogue of column vector. We can also call it $*\text{-row } D\star\text{-vector}$.

Example 4.3.7. Let $\bar{e} = ({}^j\bar{e}, j \in J, |J| = m)$ be a D_*^* -basis of vector space D_n . The coordinate matrix

$$a = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_m \end{pmatrix} = (a_j, j \in J)$$

of vector $\bar{a}$ in D_*^* -basis $\bar{e}$ is called D_*^* -**vector**.^{4.3} We call vector space D_n ***D -rows D_*^* -vector space**.

Let * -row

$$(4.3.6) \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} {}^1\bar{A} \\ \dots \\ {}^n\bar{A} \end{pmatrix} = ({}^i\bar{A}, i \in I)$$

be set of vectors. Vectors ${}^i\bar{A}$ have expansion

$${}^i\bar{A} = {}^iA_*^* \bar{e}$$

If we substitute coordinate matrices of vectors ${}^i\bar{A}$ in the matrix (4.3.6) we get matrix

$$A = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_m \end{pmatrix} \\ \dots \\ \begin{pmatrix} {}^nA_1 & \dots & {}^nA_m \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_m \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^nA_1 & \dots & {}^nA_m \end{pmatrix} = ({}^iA_j)$$

We call the matrix A **coordinate matrix of set of vectors** $({}^i\bar{A}, i \in M)$ in basis $\bar{e}$ and we call its elements **coordinates of set of vectors** $({}^i\bar{A}, i \in M)$ in basis $\bar{e}$.

* -Row

$$\bar{f} = \begin{pmatrix} {}^1\bar{f} & \dots & {}^n\bar{f} \end{pmatrix} = ({}^i\bar{f}, i \in J)$$

represents the D_*^* -**basis** $\bar{f}$ of * -rows vector space D_n . We tell that coordinate matrix f of set of vectors $({}^i\bar{f}, i \in J)$ defines coordinates if_j of basis $\bar{f}$ relative basis $\bar{e}$. $\square$

Since we express linear composition using matrices we can extend the duality principle to the vector space theory. We can write duality principle in one of the following forms

Theorem 4.3.8 (duality principle). *Let $\mathfrak{A}$ be true statement about vector spaces. If we exchange the same time*

- D_*^* -vector and D_*^* -vector
- *D -vector and *D -vector
- * -product and * -product

then we soon get true statement.

Theorem 4.3.9 (duality principle). *Let $\mathfrak{A}$ be true statement about vector spaces. If we exchange the same time*

- D_*^* -vector and *D -vector or D_*^* -vector and *D -vector
- * -quasideterminant and * -quasideterminant

then we soon get true statement.

^{4.3} D_*^* -vector is an analogue of row vector. We can also call it * -row D_*^* -vector

4.4. *D -Linear Map of Vector Spaces

Definition 4.4.1. Suppose $\overline{V}$ is *S -vector space. Suppose $\overline{U}$ is *T -vector space. Morphism

$$f : S \longrightarrow T \quad \overline{A} : \overline{V} \longrightarrow \overline{U}$$

of T -representations of division ring in Abelian group is called $({}^*S, {}^*T)$ -**linear map of vector spaces**. $\square$

By theorem 3.2.15 studying $({}^*S, {}^*T)$ -linear map we can consider case $S = T$.

Definition 4.4.2. Suppose $\overline{V}$ and $\overline{W}$ are *D -vector spaces. We call map

$$(4.4.1) \quad \overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

*D -**linear map of vector spaces** if^{4.4}

$$(4.4.2) \quad \overline{A}(\overline{m}_* {}^*a) = \overline{A}(\overline{m})_* {}^*a$$

for any ${}^*a \in D, \overline{m}_i \in \overline{V}$. $\square$

Theorem 4.4.3. Let

$$\overline{\overline{f}} = (\overline{f}_i, i \in I)$$

be a *D -basis of vector space $\overline{V}$ and

$$\overline{\overline{e}} = (\overline{e}_j, j \in J)$$

be a *D -basis of vector space $\overline{U}$. Then *D -linear map (4.4.1) of vector spaces has presentation

$$(4.4.3) \quad b = A_* {}^*a$$

relative to selected bases. Here

- a is coordinate matrix of vector $\overline{a}$ relative the *D -basis $\overline{\overline{f}}$
- b is coordinate matrix of vector

$$\overline{b} = \overline{A}(\overline{a})$$

relative the *D -basis $\overline{\overline{e}}$

- A is coordinate matrix of set of vectors $(\overline{A}(\overline{f}_i))$ in *D -basis $\overline{\overline{e}}$ called **matrix of *D -linear mapping relative bases $\overline{\overline{f}}$ and $\overline{\overline{e}}$**

PROOF. Vector $\overline{a} \in \overline{V}$ has expansion

$$\overline{a} = \overline{f}_* {}^*a$$

relative to *D -basis $\overline{\overline{f}}$. Vector $\overline{b} = \overline{f}(\overline{a}) \in \overline{U}$ has expansion

$$(4.4.4) \quad \overline{b} = \overline{e}_* {}^*b$$

relative to *D -basis $\overline{\overline{e}}$.

Since $\overline{A}$ is a *D -linear map, from (4.4.2) it follows that

$$(4.4.5) \quad \overline{b} = \overline{A}(\overline{a}) = \overline{A}(\overline{f}_* {}^*a) = \overline{A}(\overline{f})_* {}^*a$$

$\overline{A}(\overline{f}_i)$ is also a vector of $\overline{U}$ and has expansion

$$(4.4.6) \quad \overline{A}(\overline{f}_i) = \overline{e}_* {}^*A_i = \overline{e}_j {}^j A_i$$

relative to basis $\overline{\overline{e}}$. Combining (4.4.5) and (4.4.6) we get

$$(4.4.7) \quad \overline{b} = \overline{e}_* {}^*A_* {}^*a$$

^{4.4}Expression $\overline{A}(\overline{m})_* {}^*a$ means expression $\overline{A}(\overline{m}_i) {}^i a$

(4.4.3) follows from comparison of (4.4.4) and (4.4.7) and theorem 4.3.3. $\square$

On the basis of theorem 4.4.3 we identify the *D -linear map (4.4.1) of vector spaces and the matrix of its presentation (4.4.3).

Theorem 4.4.4. *Let*

$$\overline{\overline{f}} = (\overline{f}_i, i \in I)$$

*be a *D -basis of vector space $\overline{V}$,*

$$\overline{\overline{e}} = (\overline{e}_j, j \in J)$$

be a D_ -basis of vector space $\overline{U}$, and*

$$\overline{\overline{g}} = (\overline{g}_l, l \in L)$$

*be a *D -basis of vector space $\overline{W}$. Suppose diagram of mappings*

$$\begin{array}{ccc} \overline{V} & \xrightarrow{\overline{C}} & \overline{W} \\ & \searrow \overline{A} \quad \nearrow \overline{B} & \\ & \overline{U} & \end{array}$$

*is commutative diagram where *D -linear mapping $\overline{A}$ has presentation*

$$(4.4.8) \quad b = A_*^* a$$

*relative to selected bases and *D -linear mapping $\overline{B}$ has presentation*

$$(4.4.9) \quad c = B_*^* b$$

*relative to selected bases. Then mapping $\overline{C}$ is *D -linear mapping and has presentation*

$$(4.4.10) \quad c = B_*^* A_*^* a$$

relative to selected bases.

PROOF. The mapping $\overline{C}$ is *D -linear mapping because

$$\begin{aligned} \overline{C}_*^*(\overline{f}_*^* a) &= (\overline{A}_*^* \overline{B}_*)^*(\overline{f}_*^* a) \\ &= \overline{B}_*^*(\overline{A}_*^*(\overline{f}_*^* a)) \\ &= \overline{B}_*^*(\overline{e}_*^*(A_*^* a)) \\ &= \overline{g}_*^*(B_*^*(A_*^* a)) \\ &= \overline{g}_*^*((B_*^* A)_*^* a) \\ &= \overline{g}_*^*(C_*^* a) \end{aligned}$$

Equation (4.4.10) follows from substituting (4.4.8) into (4.4.9). $\square$

Presenting *D -linear map as * -product we can rewrite (4.4.2) as

$$(4.4.11) \quad \overline{A}_*^*(\overline{a}k) = (\overline{A}_*^*\overline{a})k$$

We can express the statement of the theorem 4.4.4 in the next form

$$(4.4.12) \quad \overline{B}_*^*(\overline{A}_*^*\overline{a}) = (\overline{B}_*^*\overline{A})_*^*\overline{a}$$

Equations (4.4.11) and (4.4.12) represent the **associative law for *D -linear maps of vector spaces**. This allows us writing of such expressions without using of brackets.

Equation (4.4.3) is coordinate notation for *D -linear map. Based theorem 4.4.3 non coordinate notation also can be expressed using * -product

$$(4.4.13) \quad \bar{b} = \bar{A}_* {}^* \bar{a} = \bar{A}_* {}^* \bar{f}_* {}^* a = \bar{e}_* {}^* A_* {}^* a$$

If we substitute equation (4.4.13) into theorem 4.4.4, then we get chain of equations

$$\begin{aligned} \bar{c} &= \bar{B}_* {}^* \bar{b} = \bar{B}_* {}^* \bar{e}_* {}^* b = \bar{g}_* {}^* B_* {}^* b \\ \bar{c} &= \bar{B}_* {}^* \bar{A}_* {}^* \bar{a} = \bar{B}_* {}^* \bar{A}_* {}^* \bar{f}_* {}^* a = \bar{g}_* {}^* B_* {}^* A_* {}^* a \end{aligned}$$

Remark 4.4.5. One can easily see from the an example of *D -linear map how theorem 3.2.15 makes our reasoning simpler in study of the morphism of T -representations of Ω -algebra. In the framework of this remark, we agree to call the theory of *D -linear mappings reduced theory, and theory stated in this remark is called enhanced theory.

Suppose $\bar{V}$ is *S -vector space. Suppose $\bar{U}$ is *T -vector space. Suppose

$$r : S \longrightarrow T \quad \bar{A} : \bar{V} \longrightarrow \bar{U}$$

is $({}^*S, {}^*T)$ -linear map of vector spaces. Let

$$\bar{\bar{f}} = (\bar{f}_i, i \in I)$$

be a *S -basis of vector space $\bar{V}$ and

$$\bar{\bar{e}} = (\bar{e}_j, j \in J)$$

be a *T -basis of vector space $\bar{U}$.

From definitions 4.4.1 and 3.2.2 it follows

$$(4.4.14) \quad \bar{b} = \bar{A}(\bar{a}) = \bar{A}(\bar{f}_* {}^* a) = \bar{A}(\bar{f})_* {}^* r(a)$$

$\bar{A}(\bar{f}_i)$ is also a vector of $\bar{U}$ and has expansion

$$(4.4.15) \quad \bar{A}(\bar{f}_i) = \bar{e}_* {}^* A_i = \bar{e}_j {}^* A_i$$

relative to basis $\bar{\bar{e}}$. Combining (4.4.14) and (4.4.15), we get

$$(4.4.16) \quad \bar{b} = \bar{e}_* {}^* A_* {}^* r(a)$$

Suppose $\bar{W}$ is *D -vector space. Suppose

$$p : T \longrightarrow D \quad \bar{B} : \bar{U} \longrightarrow \bar{W}$$

is $({}^*T, {}^*D)$ -linear map of vector spaces. Let

$$\bar{\bar{g}} = (\bar{g}_l, l \in L)$$

be *D -basis of vector space $\bar{W}$. Then, according to (4.4.16), the product of $({}^*S, {}^*T)$ -linear map $(r, \bar{A})$ and $({}^*T, {}^*D)$ -linear map $(p, \bar{B})$ has form

$$(4.4.17) \quad \bar{c} = \bar{h}_* {}^* B_* {}^* p(A) {}^* pr(a)$$

Comparison of equations (4.4.10) and (4.4.17) that extended theory of linear maps is more complicated then reduced theory.

If we need we can use extended theory, however we will not get new results comparing with reduced theory. At the same time plenty of details makes picture less clear and demands permanent attention. $\square$

4.5. System of *D -Linear Equations

Definition 4.5.1. Let $\overline{V}$ be a *D -vector space and $\{\overline{A}_i \in \overline{V}, i \in I\}$ be set of vectors. *D -linear span in vector space is set $\text{span}(\overline{A}_i, i \in I)$ of vectors *D -linearly dependent on vectors $\overline{A}_i$. $\square$

Theorem 4.5.2. Let $\text{span}(\overline{A}_i, i \in I)$ be *D -linear span in vector space $\overline{V}$. Then $\text{span}(\overline{A}_i, i \in I)$ is subspace of $\overline{V}$.

PROOF. Suppose

$$\overline{b} \in \text{span}(\overline{A}_i, i \in I)$$

$$\overline{c} \in \text{span}(\overline{A}_i, i \in I)$$

According to definition 4.5.1

$$\overline{b} = \overline{A}_* {}^* b$$

$$\overline{c} = \overline{A}_* {}^* c$$

Then

$$\overline{b} + \overline{c} = \overline{A}_* {}^* b + \overline{A}_* {}^* c = \overline{A}_* {}^* (b + c) \in \text{span}(\overline{A}_i, i \in I)$$

$$\overline{b}k = (\overline{A}_* {}^* b)k = \overline{A}_* {}^* (bk) \in \text{span}(\overline{A}_i, i \in I)$$

This proves the statement. $\square$

Example 4.5.3. Let $\overline{V}$ be a *D -vector space and * -row

$$\overline{A} = \left(\overline{A}_1 \quad \dots \quad \overline{A}_n \right) = (\overline{A}_i, i \in I)$$

be set of vectors. To answer the question of whether vector $\overline{b} \in \text{span}(\overline{A}_i, i \in I)$ we write linear equation

$$(4.5.1) \quad \overline{b} = \overline{A}_* {}^* x$$

where

$$x = \begin{pmatrix} {}^1x \\ \dots \\ {}^nx \end{pmatrix}$$

is * -row of unknown coefficients of expansion. $\overline{b} \in \text{span}(\overline{A}_i, i \in I)$ if equation (4.5.1) has a solution. Suppose $\overline{f} = (\overline{f}_j, j \in J)$ is a *D -basis. Then vectors $\overline{b}$, $\overline{A}_i$ have expansion

$$(4.5.2) \quad \overline{b} = b_* {}^* \overline{f}$$

$$(4.5.3) \quad \overline{A}_i = \overline{f}_* {}^* A_i$$

If we substitute (4.5.2) and (4.5.3) into (4.5.1) we get

$$(4.5.4) \quad \overline{f}_* {}^* b = \overline{f}_* {}^* A_* {}^* x$$

Applying theorem 4.3.3 to (4.5.4) we get system of *D -linear equations

$$(4.5.5) \quad A_* {}^* x = b$$

We can write system of *D -linear equations (4.5.5) in one of the next forms

$$(4.5.6) \quad \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_n \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^mA_1 & \dots & {}^mA_n \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} {}^1x \\ \dots \\ {}^nx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1b \\ \dots \\ {}^mb \end{pmatrix}$$

$${}^jA_i {}^ix = {}^jb$$

$$\begin{matrix} {}^1A_1 {}^1x & + \dots & + {}^1A_n {}^nx & = {}^1b \\ \dots & & & \dots \\ {}^1A_m {}^1x & + \dots & + {}^mA_n {}^nx & = {}^mb \end{matrix}$$

□

Example 4.5.4. Let $\overline{V}$ be a $D {}^*$ -vector space and * -row

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} {}^1\overline{A} \\ \dots \\ {}^m\overline{A} \end{pmatrix} = ({}^j\overline{A}, j \in J)$$

be set of vectors. To answer the question of whether vector $\overline{b} \in \text{span}({}^j\overline{A}, j \in J)$ we write linear equation

$$(4.5.7) \quad \overline{b} = x {}^* \overline{A}$$

where

$$x = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_m \end{pmatrix}$$

is * -row of unknown coefficients of expansion. $\overline{b} \in \text{span}({}^j\overline{A}, j \in J)$ if equation (4.5.7) has a solution. Suppose $\overline{f} = ({}^if, i \in I)$ is a $D {}^*$ -basis. Then vectors $\overline{b}, {}^j\overline{A}$ have expansion

$$(4.5.8) \quad \overline{b} = b {}^* \overline{f}$$

$$(4.5.9) \quad {}^j\overline{A} = {}^jA {}^* \overline{f}$$

If we substitute (4.5.8) and (4.5.9) into (4.5.7) we get

$$(4.5.10) \quad b {}^* \overline{f} = x {}^* A {}^* \overline{f}$$

Applying theorem 4.3.3 to (4.5.10) we get **system of $D {}^*$ -linear equations**^{4.5}

$$(4.5.11) \quad x {}^* A = b$$

We can write system of $D {}^*$ -linear equations (4.5.11) in one of the next forms

$$(4.5.12) \quad \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_m \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_n \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^mA_1 & \dots & {}^mA_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & \dots & b_n \end{pmatrix}$$

$$x_j {}^jA_i = b_i$$

^{4.5}Reading system of *D -linear equations (4.5.5) from bottom up and from left to right we get system of $D {}^*$ -linear equations (4.5.11).

$$\begin{array}{rcl}
x_1^{-1}A_1 & \dots & x_1^{-1}A_n \\
+ & \dots & + \\
\dots & \dots & \dots \\
+ & \dots & + \\
x_m^{-m}A_1 & \dots & x_m^{-m}A_n \\
= & \dots & = \\
b_1 & \dots & b_n
\end{array}$$

□

Definition 4.5.5. If $n \times n$ matrix A has $*$ -inverse matrix we call such matrix $*$ -nonsingular matrix. Otherwise, we call such matrix $*$ -singular matrix. □

Definition 4.5.6. Suppose A is $*$ -nonsingular matrix. We call appropriate system of $*$ - D -linear equations

$$(4.5.13) \quad A_*^{-1}x = b$$

nonsingular system of $*$ - D -linear equations. □

Theorem 4.5.7. Solution of nonsingular system of $*$ - D -linear equations (4.5.13) is determined uniquely and can be presented in either form^{4.6}

$$(4.5.14) \quad x = A^{-1}{}_*^{-1} b$$

$$(4.5.15) \quad x = \overline{H} \det(A, *)_*^{-1} b$$

PROOF. Multiplying both sides of equation (4.5.13) from left by $A^{-1}{}_*^{-1}$ we get (4.5.14). Using definition (2.3.12) we get (4.5.15). Since theorem (2.2.16) the solution is unique. □

4.6. Rank of Matrix

Definition 4.6.1. Matrix^{4.7} ${}^S A_T$ is a minor of an order k . □

Definition 4.6.2. If minor ${}^S A_T$ is $*$ -nonsingular matrix then we say that $*$ -rank of matrix A is not less than k . $*$ -rank of matrix A

$$\text{rank}_* A$$

is the maximal value of k . We call an appropriate minor the $*$ -major minor. □

Theorem 4.6.3. Let matrix A be $*$ -singular matrix and minor ${}^S A_T$ be major minor. Then

$$(4.6.1) \quad {}^p \det \left({}^{S \cup \{p\}} A_{T \cup \{r\}}, * \right)_r = 0$$

^{4.6}We can see a solution of system (4.5.13) in theorem [7]-1.6.1. I repeat this statement because I slightly changed the notation.

^{4.7}In this section, we will make the following assumption.

- $i \in M, |M| = m, j \in N, |N| = n$.
- $A = ({}^i A_j)$ is an arbitrary matrix.
- $k, s \in S \supseteq M, l, t \in T \supseteq N, k = |S| = |T|$.
- $p \in M \setminus S, r \in N \setminus T$.

PROOF. To understand why minor ${}^{S \cup \{p\}}A_{T \cup \{r\}}$ does not have $*$ -inverse matrix,^{4.8} we assume that it has the $*$ -inverse matrix and write down the respective system (2.3.2), (2.3.3). We assume $i = r$, $j = p$ and will try to solve this system. Assume

$$(4.6.2) \quad B = {}^{S \cup \{p\}}A_{T \cup \{r\}}$$

Then we get system

$$(4.6.3) \quad {}^S B_T {}^* T B^{-1} {}^* {}_p + {}^S B_r {}^r B^{-1} {}^* {}_p = 0$$

$$(4.6.4) \quad {}^p B_T {}^* T B^{-1} {}^* {}_p + {}^p B_r {}^r B^{-1} {}^* {}_p = 1$$

We multiply (4.6.3) by $({}^S B_T)^{-1} {}^* {}_p$

$$(4.6.5) \quad {}^T B^{-1} {}^* {}_p + ({}^S B_T)^{-1} {}^* {}_p {}^* S B_r {}^r B^{-1} {}^* {}_p = 0$$

Now we can substitute (4.6.5) into (4.6.4)

$$(4.6.6) \quad -{}^p B_T {}^* ({}^S B_T)^{-1} {}^* {}_p {}^* S B_r {}^r B^{-1} {}^* {}_p + {}^p B_r {}^r B^{-1} {}^* {}_p = 1$$

From (4.6.6) it follows that

$$(4.6.7) \quad ({}^p B_r - {}^p B_T {}^* ({}^S B_T)^{-1} {}^* {}_p {}^* S B_r) {}^r B^{-1} {}^* {}_p = 1$$

Expression in brackets is quasideterminant ${}^p \det(B, {}^* {}_r)$. Substituting this expression into (4.6.7), we get

$$(4.6.8) \quad {}^p \det(B, {}^* {}_r) {}^r B^{-1} {}^* {}_p = 1$$

Thus we proved that quasideterminant ${}^p \det(B, {}^* {}_r)$ is defined and its equation to 0 is necessary and sufficient condition that the matrix B is singular. Since (4.6.2) the statement of theorem is proved. $\square$

Theorem 4.6.4. Suppose A is a matrix,

$$\text{rank}_* A = k < m$$

and ${}^S A_T$ is $*$ -major minor. Then $*$ -row ${}^p A$ is a D_* -linear composition of $*$ -rows ${}^S A$.

$$(4.6.9) \quad M \setminus {}^S A = R_* {}^S A$$

$$(4.6.10) \quad {}^p A = {}^p R_* {}^S A$$

$$(4.6.11) \quad {}^p A_b = {}^p R_s {}^S A_b$$

PROOF. If a number of $*$ -rows is k then assuming that $*$ -row ${}^p A$ is a D_* -linear combination (4.6.10) of $*$ -rows ${}^S A$ with coefficients ${}^p R_s$ we get system (4.6.11). According to theorem 4.5.7 this system has a unique solution^{4.9} and it is nontrivial because all $*$ -quasideterminants are different from 0.

^{4.8}It is natural to expect relationship between $*$ -singularity of the matrix and its $*$ -quasideterminant similar to relationship which is known in commutative case. However $*$ -quasideterminant is defined not always. For instance, it is not defined when $*$ -inverse matrix has too much elements equal 0. As it follows from this theorem, the $*$ -quasideterminant is undefined also in case when $*$ -rank of the matrix is less than $n - 1$.

^{4.9}We assume that unknown variables are $x_s = {}^p R_s$

It remains to prove this statement in case when a number of $*$ -rows is more then k . I get $*$ -row pA and $*$ -row A_r . According to assumption minor ${}^{S \cup \{p\}}A_{T \cup \{r\}}$ is a $*$ -singular matrix and its $*$ -quasideterminant

$$(4.6.12) \quad {}^p \det \left({}^{S \cup \{p\}}A_{T \cup \{r\}}, * \right)_r = 0$$

According to (2.3.14) the equation (4.6.12) has form

$${}^pA_r - {}^pA_T * (({}^SA_T)^{-1} *)_* {}^SA_r = 0$$

Matrix

$$(4.6.13) \quad {}^pR = {}^pA_T * (({}^SA_T)^{-1} *)_*$$

do not depend on r , Therefore, for any $r \in N \setminus T$

$$(4.6.14) \quad {}^pA_r = {}^pR_* {}^SA_r$$

From equation

$$(({}^SA_T)^{-1} *)_* {}^SA_l = {}^T\delta_l$$

it follows that

$$(4.6.15) \quad {}^pA_l = {}^pA_T * {}^T\delta_l = {}^pA_T * (({}^SA_T)^{-1} *)_* {}^SA_l$$

Substituting (4.6.13) into (4.6.15) we get

$$(4.6.16) \quad {}^pA_l = {}^pR_* {}^SA_l$$

(4.6.14) and (4.6.16) finish the proof. $\square$

Corollary 4.6.5. *Suppose A is a matrix, $\text{rank}_* A = k < m$. Then $*$ -rows of the matrix are D_*^* -linearly dependent.*

$$(4.6.17) \quad \lambda_* A = 0$$

PROOF. Suppose $*$ -row pA is a D_*^* -linear composition (4.6.10). We assume $\lambda_p = -1$, $\lambda_s = {}^pR_s$ and the rest $\lambda_c = 0$. $\square$

Theorem 4.6.6. *Let $({}^i\bar{A}, i \in M, |M| = m)$ be set of D_*^* -linear independent vectors. Then $*$ -rank of their coordinate matrix equal m .*

PROOF. According to model built in example 4.3.7, the coordinate matrix of set of vectors $({}^i\bar{A})$ relative basis $\bar{e}$ consists from $*$ -rows which are coordinate matrices of vectors ${}^i\bar{A}$ relative the basis $\bar{e}$. Therefore $*$ -rank of this matrix cannot be more then m .

Let $*$ -rank of the coordinate matrix be less then m . According to corollary 4.6.5 $*$ -rows of matrix are D_*^* -linear dependent. Let us multiply both parts of equation (4.6.17) over $*$ -row $\bar{e}$. Suppose $c = \lambda_* A$. Then we get that D_*^* -linear composition

$$c_* \bar{e} = 0$$

of vectors of basis equal 0. This contradicts to statement that vectors $\bar{e}$ form basis. We proved statement of theorem. $\square$

Theorem 4.6.7. *Suppose A is a matrix,*

$$\text{rank}_{**} A = k < n$$

and ${}^S A_T$ is $$ -major minor. Then $*$ -row A_r is a $*$ - D -linear composition of $*$ -rows A_t*

$$(4.6.18) \quad A_{N \setminus T} = A_T {}^* R$$

$$(4.6.19) \quad A_r = A_T {}^* R_r$$

$$(4.6.20) \quad {}^a A_r = {}^a A_t {}^t R_r$$

PROOF. If a number of $*$ -rows is k then assuming that $*$ -row A_r is a $*$ - D -linear combination (4.6.19) of $*$ -rows A_t with coefficients ${}^t R_r$ we get system (4.6.20). According to theorem 4.5.7 this system has a unique solution^{4.10} and it is nontrivial because all $*$ -quasideterminants are different from 0.

It remains to prove this statement in case when a number of $*$ -rows is more than k . I get $*$ -row A_r and $*$ -row ${}^p A$. According to assumption minor ${}^{S \cup \{p\}} A_{T \cup \{r\}}$ is a $*$ -singular matrix and its $\overline{RC}$ -quasideterminant

$$(4.6.21) \quad {}^p \det \left({}^{S \cup \{p\}} A_{T \cup \{r\}}, * \right)_r = 0$$

According to (2.3.14) (4.6.21) has form

$${}^p A_r - {}^p A_T {}^* (({}^S A_T)^{-1} {}^*) {}^* {}^S A_r = 0$$

Matrix

$$(4.6.22) \quad R_r = (({}^S A_T)^{-1} {}^*) {}^* {}^S A_r$$

do not depend on p , Therefore, for any $p \in M \setminus S$

$$(4.6.23) \quad {}^p A_r = {}^p A_T {}^* R_r$$

From equation

$${}^k A_T {}^* (({}^S A_T)^{-1} {}^*) {}^s = {}^k \delta_s$$

it follows that

$$(4.6.24) \quad {}^k A_r = {}^k \delta_s {}^* {}^S A_r = {}^k A_T {}^* (({}^S A_T)^{-1} {}^*) {}^s {}^* {}^S A_r$$

Substituting (4.6.22) into (4.6.24) we get

$$(4.6.25) \quad {}^k A_r = {}^k A_T {}^* R_r$$

(4.6.23) and (4.6.25) finish the proof. $\square$

Corollary 4.6.8. *Suppose A is a matrix, $\text{rank}_{**} A = k < m$. Then $*$ -rows of the matrix are $*$ - D -linearly dependent.*

$$A {}^* \lambda = 0$$

PROOF. Suppose $*$ -row A_r is a right linear composition (4.6.19). We assume ${}^r \lambda = -1$, ${}^t \lambda = {}^t R_r$ and the rest ${}^c \lambda = 0$. $\square$

Base on theorem 2.3.9 we can write similar statements for $*$ -rank of matrix.

^{4.10}We assume that unknown variables are ${}^t x = {}^t R_r$

Theorem 4.6.9. Suppose A is a matrix,

$$\text{rank}_* A = k < m$$

and ${}_T A^S$ is ${}^*_{*}$ -major minor. Then ${}^*_{*}$ -row A^p is a ${}^*_{*}D$ -linear composition of ${}^*_{*}$ -rows A^s .

$$(4.6.26) \quad A^{M \setminus S} = A^{S*} {}^*_{*} R$$

$$(4.6.27) \quad A^p = A^{S*} {}^*_{*} R^p$$

$$(4.6.28) \quad {}_b A^p = {}_b A^s {}_s R^p$$

Corollary 4.6.10. Suppose A is a matrix, $\text{rank}_* A = k < m$. Then ${}^*_{*}$ -rows of matrix are ${}^*_{*}D$ -linearly dependent.

$$A^* {}^*_{*} \lambda = 0$$

Theorem 4.6.11. Suppose A is a matrix,

$$\text{rank}_* A = k < n$$

and ${}_T A^S$ is ${}^*_{*}$ -major minor. Then ${}^*_{*}$ -row ${}_r A$ is a $D^* {}^*_{*}$ -linear composition of ${}^*_{*}$ -rows ${}_t A$

$$(4.6.29) \quad {}_{N \setminus T} A = R^* {}^*_{*} {}_T A$$

$$(4.6.30) \quad {}_r A = {}_r R^* {}^*_{*} {}_T A$$

$$(4.6.31) \quad {}_r A^a = {}_r R^t {}_t A^a$$

Corollary 4.6.12. Suppose A is a matrix, $\text{rank}_* a = k < m$. Then ${}^*_{*}$ -rows of matrix are $D^* {}^*_{*}$ -linearly dependent.

$$\lambda^* {}^*_{*} A = 0$$

4.7. System of *D -Linear Equations

Definition 4.7.1. Suppose ${}^{4.7} A$ is a matrix of system of $D^* {}^*_{*}$ -linear equations (4.5.12). We call matrix

$$(4.7.1) \quad \begin{pmatrix} {}^j A_i \\ b_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1 A_1 & \dots & {}^1 A_n \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^m A_1 & \dots & {}^m A_n \\ b_1 & \dots & b_n \end{pmatrix}$$

an **extended matrix** of this system. $\square$

Definition 4.7.2. Suppose ${}^{4.7} A$ is a matrix of system of ${}^*_{*}D$ -linear equations (4.5.6). We call matrix

$$(4.7.2) \quad \begin{pmatrix} {}_a A^b & {}_a b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}_1 A^1 & \dots & {}_1 A^n & {}_1 b \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ {}_m A^1 & \dots & {}_m A^n & {}_m b \end{pmatrix}$$

an **extended matrix** of this system. $\square$

Theorem 4.7.3. System of ${}^*_{*}D$ -linear equations (4.5.6) has a solution iff

$$(4.7.3) \quad \text{rank}_* ({}^j A_i) = \text{rank}_* \begin{pmatrix} {}^j A_i & {}^j b \end{pmatrix}$$

PROOF. Let ${}^S A_T$ be ${}^*{}^*$ -major minor of matrix A .

Let a system of ${}^*{}^*D$ -linear equations (4.5.6) have solution ${}^i x = {}^i d$. Then

$$(4.7.4) \quad A_* {}^* d = b$$

Equation (4.7.4) can be rewritten in form

$$(4.7.5) \quad A_T {}^* {}^T d + A_{N \setminus T} {}^* {}^{N \setminus T} d = b$$

Substituting (4.6.18) into (4.7.5) we get

$$(4.7.6) \quad A_T {}^* {}^T d + A_T {}^* R_* {}^* {}^{N \setminus T} d = b$$

From (4.7.6) it follows that * -row b is a ${}^*{}^*D$ -linear combination of * -rows A_T

$$A_T {}^* ({}^T d + R_* {}^* {}^{N \setminus T} d) = b$$

This holds equation (4.7.3).

It remains to prove that an existence of solution of system of ${}^*{}^*D$ -linear equations (4.5.6) follows from (4.7.3). Holding (4.7.3) means that ${}^S A_T$ is ${}^*{}^*$ -major minor of extended matrix as well. From theorem 4.6.7 it follows that * -row b is a ${}^*{}^*D$ -linear composition of * -rows A_T

$$b = A_T {}^* {}^T R$$

Assigning ${}^r R = 0$ we get

$$b = A_* {}^* R$$

Therefore, we found at least one solution of system of ${}^*{}^*D$ -linear equations (4.5.6). $\square$

Theorem 4.7.4. Suppose (4.5.6) is a system of ${}^*{}^*D$ -linear equations satisfying (4.7.3). If $\text{rank}_* A = k \leq m$ then solution of the system depends on arbitrary values of $m - k$ variables not included into ${}^*{}^*$ -major minor.

PROOF. Let ${}^S A_T$ be ${}^*{}^*$ -major minor of matrix a . Suppose

$$(4.7.7) \quad {}^p A_* {}^* x = {}^p b$$

is an equation with number p . Applying theorem 4.6.4 to extended matrix (4.7.1) we get

$$(4.7.8) \quad {}^p A = {}^p R_* {}^* {}^S A$$

$$(4.7.9) \quad {}^p b = {}^p R_* {}^* {}^S b$$

Substituting (4.7.8) and (4.7.9) into (4.7.7) we get

$$(4.7.10) \quad {}^p R_* {}^* {}^S A_* {}^* x = {}^p R_* {}^* {}^S b$$

(4.7.10) means that we can exclude equation (4.7.7) from system (4.5.6) and the new system is equivalent to the old one. Therefore, a number of equations can be reduced to k .

At this point, we have two choices. If the number of variables is also k then according to theorem 4.5.7 the system has unique solution (4.5.15). If the number of variables $m > k$ then we can move $m - k$ variables that are not included into ${}^*{}^*$ -major minor into right side. Giving arbitrary values to these variables, we determine value of the right side and for this value we get a unique solution according to theorem 4.5.7. $\square$

Corollary 4.7.5. *System of *D -linear equations (4.5.6) has a unique solution iff its matrix is nonsingular.* $\square$

Theorem 4.7.6. *Solutions of a homogenous system of *D -linear equations*

$$(4.7.11) \quad A_* {}^*x = 0$$

*form a *D -vector space.*

PROOF. Let $\overline{X}$ be set of solutions of system of *D -linear equations (4.7.11). Suppose $x = ({}^ax) \in \overline{X}$ and $y = ({}^ay) \in \overline{X}$. Then

$$x^a {}_a a^b = 0$$

$$y^a {}_a a^b = 0$$

Therefore

$$\begin{aligned} {}^i A_j ({}^j x + {}^j y) &= {}^i A_j {}^j x + {}^i A_j {}^j y = 0 \\ x + y &= ({}^j x + {}^j y) \in \overline{X} \end{aligned}$$

The same way we see

$$\begin{aligned} {}^i A_j ({}^j x b) &= ({}^i A_j {}^j x) b = 0 \\ x b &= ({}^j x b) \in \overline{X} \end{aligned}$$

According to definition 4.1.4 $\overline{X}$ is a *D -vector space. $\square$

4.8. Nonsingular Matrix

Suppose A is $n \times n$ matrix. Corollaries 4.6.5 and 4.6.8 tell us that if $\text{rank}_* A < n$ then * -rows are D_* -linearly dependent and * -rows are *D -linearly dependent.^{4.11}

Theorem 4.8.1. *Let A be $n \times n$ matrix and * -row A_r be a *D -linear combination of other * -rows. Then $\text{rank}_* A < n$.*

PROOF. The statement that * -row A_r is a *D -linear combination of other * -rows means that system of *D -linear equations

$$A_r = A_{[r]} {}^* \lambda$$

has at least one solution. According theorem 4.7.3

$$\text{rank}_* A = \text{rank}_* A_{[r]}$$

Since a number of * -rows is less than n we get $\text{rank}_* A_{[r]} < n$. $\square$

Theorem 4.8.2. *Let A be $n \times n$ matrix and * -row ${}^p A$ be a D_* -linear combination of other * -rows. Then $\text{rank}_* A < n$.*

PROOF. Proof of statement is similar to proof of theorem 4.8.1 $\square$

Theorem 4.8.3. *Suppose A and B are $n \times n$ matrices and*

$$(4.8.1) \quad C = A_* {}^* B$$

*C is *D -singular matrix iff either matrix A or matrix B is *D -singular matrix.*

^{4.11}This statement is similar to proposition [8]-1.2.5.

PROOF. Suppose matrix B is ${}^*\text{-singular}$. According theorem 4.6.7 * -rows of matrix B are *D -linearly dependent. Therefore

$$(4.8.2) \quad 0 = B_*^* \lambda$$

where $\lambda \neq 0$. From (4.8.1) and (4.8.2) it follows that

$$C_*^* \lambda = A_*^* B_*^* \lambda = 0$$

According theorem 4.8.1 matrix C is ${}^*\text{-singular}$.

Suppose matrix B is not ${}^*\text{-singular}$, but matrix A is ${}^*\text{-singular}$ According to theorem 4.6.4 * -rows of matrix A are *D -linearly dependent. Therefore

$$(4.8.3) \quad 0 = A_*^* \mu$$

where $\mu \neq 0$. According to theorem 4.5.7 the system

$$B_*^* \lambda = \mu$$

has only solution where $\lambda \neq 0$. Therefore

$$C_*^* \lambda = A_*^* B_*^* \lambda = A_*^* \mu = 0$$

According to theorem 4.8.1 matrix C is ${}^*\text{-singular}$.

Suppose matrix C is ${}^*\text{-singular}$ matrix. According to the theorem 4.6.4 * -rows of matrix C are *D -linearly dependent. Therefore

$$(4.8.4) \quad 0 = C_*^* \lambda$$

where $\lambda \neq 0$. From (4.8.1) and (4.8.4) it follows that

$$0 = A_*^* B_*^* \lambda$$

If

$$0 = B_*^* \lambda$$

satisfied then matrix B is ${}^*\text{-singular}$. Suppose that matrix B is not ${}^*\text{-singular}$. Let us introduce

$$\mu = B_*^* \lambda$$

where $\mu \neq 0$. Then

$$(4.8.5) \quad 0 = A_*^* \mu$$

From (4.8.5) it follows that matrix A is ${}^*\text{-singular}$. $\square$

Basing theorem 2.3.9 we can write similar statements for D^* -linear combination of * -rows or *D -linear combination of * -rows and ${}^*\text{-quasideterminant}$.

Theorem 4.8.4. *Let A be $n \times n$ matrix and ${}^*\text{-row } {}_r A$ be a *D -linear combination of other ${}^*\text{-rows}$. Then $\text{rank}_* A < n$.*

Theorem 4.8.5. *Let A be $n \times n$ matrix and ${}^*\text{-row } A^p$ be a D^* -linear combination of other ${}^*\text{-rows}$. Then $\text{rank}_* A < n$.*

Theorem 4.8.6. *Suppose A and B are $n \times n$ matrices and $C = A_*^* B$. C is ${}^*\text{-singular}$ matrix iff either matrix A or matrix B is ${}^*\text{-singular}$ matrix.*

Definition 4.8.7. ${}^*\text{-matrix group } GL_n^{*D}$ is a group of ${}^*\text{-nonsingular}$ matrices where we define ${}^*\text{-product}$ of matrices (2.2.1) and ${}^*\text{-inverse}$ matrix A^{-1*} . $\square$

Definition 4.8.8. ${}^*\text{-matrix group } GL_n^{*D}$ is a group of ${}^*\text{-nonsingular}$ matrices where we define ${}^*\text{-product}$ of matrices (2.2.2) and ${}^*\text{-inverse}$ matrix A^{-1*} . $\square$

Theorem 4.8.9.

$$GL_n^{*D} \neq GL_n^{*D}$$

Remark 4.8.10. From theorem (2.3.11) it follows that there are matrices which are $*$ -nonsingular and $*$ -nonsingular. Theorem 4.8.9 implies that sets of $*$ -nonsingular matrices and $*$ -nonsingular matrices are not identical. For instance, there exists such $*$ -nonsingular matrix which is $*$ -singular matrix. $\square$

PROOF. It is enough to prove this statement for $n = 2$. Assume every $*$ -singular matrix

$$(4.8.6) \quad A = \begin{pmatrix} {}^1A_1 & {}^2A_1 \\ {}^1A_2 & {}^2A_2 \end{pmatrix}$$

is $*$ -singular matrix. It follows from theorem 4.6.4 and theorem 4.6.7 that $*$ -singular matrix satisfies to condition

$$(4.8.7) \quad {}^1A_2 = b {}^1A_1$$

$$(4.8.8) \quad {}^2A_2 = b {}^2A_1$$

$$(4.8.9) \quad {}^2A_1 = {}^1A_1 c$$

$$(4.8.10) \quad {}^2A_2 = {}^1A_2 c$$

If we substitute (4.8.9) into (4.8.8) we get

$${}^2A_2 = b {}^1A_1 c$$

b and c are arbitrary elements of division ring D and $*$ -singular matrix matrix (4.8.6) has form ($d = {}^1A_1$)

$$(4.8.11) \quad A = \begin{pmatrix} d & dc \\ bd & bdc \end{pmatrix}$$

The similar way we can show that $*$ -singular matrix has form

$$(4.8.12) \quad A = \begin{pmatrix} d & c'd \\ db' & c'db' \end{pmatrix}$$

From assumption it follows that (4.8.12) and (4.8.11) represent the same matrix. Comparing (4.8.12) and (4.8.11) we get that for every $d, c \in D$ exists such $c' \in D$ which does not depend on d and satisfies equation

$$dc = c'd$$

This contradicts the fact that D is division ring. $\square$

Example 4.8.11. Since we get division ring of quaternions we assume $b = 1 + k$, $c = j$, $d = k$. Then we get

$$A = \begin{pmatrix} k & kj \\ (1+k)k & (1+k)kj \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & -i \\ k-1 & -i-j \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} {}^2\det(A, *)_2 &= {}^2A_2 - {}^2A_1({}^1A_1)^{-1} {}^1A_2 \\ &= -i - j - (k-1)(k)^{-1}(-i) = -i - j - (k-1)(-k)(-i) \\ &= -i - j - kki + ki = -i - j + i + j \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
{}_1 \det(A, {}^* {}^*)^1 &= {}_1 A^1 - {}_1 A^2 ({}_2 A^2)^{-1} {}_2 A^1 \\
&= k - (k-1)(-i-j)^{-1}(-i) = k - (k-1)\frac{1}{2}(i+j)(-i) \\
&= k + \frac{1}{2}((k-1)i + (k-1)j)i = k + \frac{1}{2}(ki - i + kj - j)i \\
&= k + \frac{1}{2}(j - i - i - j)i = k - ii \\
&= k + 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
{}_1 \det(A, {}^* {}^*)^2 &= {}_1 A^2 - {}_1 A^1 ({}_2 A^1)^{-1} {}_2 A^2 \\
&= k - 1 - k(-i)^{-1}(-i-j) = k - 1 + ki(i+j) \\
&= k - 1 + j(i+j) = k - 1 + ji + jj \\
&= k - 1 - k - 1 \\
&= -2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
{}_2 \det(A, {}^* {}^*)^1 &= {}_2 A^1 - {}_2 A^2 ({}_1 A^2)^{-1} {}_1 A^1 \\
&= (-i) - (-i-j)(k-1)^{-1}k = -i + (i+j)\frac{1}{2}(-k-1)k \\
&= -i - \frac{1}{2}(i+j)(k+1)k = -i - \frac{1}{2}(ik + i + jk + j)k \\
&= -i - \frac{1}{2}(-j + i + i + j)k = -i - ik \\
&= -i + j
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
{}_2 \det(A, {}^* {}^*)^2 &= {}_2 A^2 - {}_2 A^1 ({}_1 A^1)^{-1} {}_1 A^2 \\
&= -i - j - (-i)(k)^{-1}(k-1) = -i - j + i(-k)(k-1) \\
&= -i - j + j(k-1) = -i - j + jk - j = -i - j + i - j \\
&= -2j
\end{aligned}$$

The system of ${}^* D$ -linear equations

$$(4.8.13) \quad \begin{pmatrix} k & -i \\ k-1 & -i-j \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} {}^1 x \\ {}^2 x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1 b \\ {}^2 b \end{pmatrix}$$

has ${}^* \text{-singular}$ matrix. We can write the system of ${}^* D$ -linear equations (4.8.13) in the form

$$\begin{cases} k {}^1 x - i {}^2 x = {}^1 b \\ (k-1) {}^1 x - (i+j) {}^2 x = {}^2 b \end{cases}$$

The system of ${}^* D$ -linear equations

$$(4.8.14) \quad \begin{pmatrix} k & -i \\ k-1 & -i-j \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} {}^1 x & {}^2 x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1 b & {}^2 b \end{pmatrix}$$

has *D -nonsingular matrix. We can write the system of *D -linear equations (4.8.14) in the form

$$\begin{cases} k {}_1x - i {}_1x \\ + (k-1) {}_2x - (i+j) {}_2x \\ = {}_1b = {}_2b \end{cases} \quad \begin{cases} k {}_1x + (k-1) {}_2x = {}_1b \\ -i {}_1x - (i+j) {}_2x = {}_2b \end{cases}$$

The system of D_* -linear equations

$$(4.8.15) \quad \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} k & -i \\ k-1 & -i-j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \end{pmatrix}$$

has *D_* -singular matrix. We can write the system of D_* -linear equations (4.8.15) in the form

$$\begin{cases} x_1 k & -x_1 i \\ + x_2(k-1) & -x_2(i+j) \\ = b_1 & = b_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 k + x_2(k-1) = b_1 \\ -x_1 i - x_2(i+j) = b_2 \end{cases}$$

The system of D^* -linear equations

$$(4.8.16) \quad \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} k & -i \\ k-1 & -i-j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1b \\ {}^2b \end{pmatrix}$$

has ${}^*D^*$ -nonsingular matrix. We can write the system of D^* -linear equations (4.8.16) in the form

$$\begin{cases} k {}^1x - i {}^2x = {}^1b \\ (k-1) {}^1x - (i+j) {}^2x = {}^2b \end{cases}$$

□

4.9. Dimension of *D -Vector Space

Theorem 4.9.1. *Let $\overline{V}$ be a *D -vector space. Suppose $\overline{V}$ has *D -bases $\overline{e} = (\overline{e}_i, i \in I)$ and $\overline{g} = (\overline{g}_j, j \in J)$. If $|I|$ and $|J|$ are finite numbers then $|I| = |J|$.*

PROOF. Suppose $|I| = m$ and $|J| = n$. Suppose

$$(4.9.1) \quad m < n$$

Because $\overline{e}$ is a *D -basis any vector $\overline{g}_j, j \in J$ has expansion

$${}_b \overline{g} = {}_b a {}^* \overline{e}$$

Because $\overline{g}$ is a *D -basis

$$(4.9.2) \quad \lambda = 0$$

should follow from

$$\overline{g}_* {}^* \lambda = \overline{e}_* {}^* A_* {}^* \lambda = 0$$

Because $\overline{e}$ is a *D -basis we get

$$(4.9.3) \quad A_* {}^* \lambda = 0$$

According to (4.9.1) $\text{rank}_* A \leq m$ and system (4.9.3) has more variables than equations. According to theorem 4.7.4 $\lambda \neq 0$. This contradicts statement (4.9.2). Therefore, statement $m < n$ is not valid.

In the same manner we can prove that the statement $n < m$ is not valid. This completes the proof of the theorem. □

Definition 4.9.2. We call **dimension of *D -vector space** the number of vectors in a basis $\square$

Theorem 4.9.3. *The coordinate matrix of *D -basis $\bar{g}$ relative *D -basis $\bar{e}$ of vector space $\bar{V}$ is *D -nonsingular matrix.*

PROOF. According to theorem 4.6.6 *D -rank of the coordinate matrix of basis $\bar{g}$ relative basis $\bar{e}$ equal to the dimension of vector space. This proves the statement of the theorem. $\square$

Definition 4.9.4. We call one-to-one map $\bar{A} : \bar{V} \rightarrow \bar{W}$ ***D -isomorphism of vector spaces** if this map is a *D -linear map of vector spaces. $\square$

Definition 4.9.5. *D -**automorphism of vector space $\bar{V}$** is *D -isomorphism $\bar{A} : \bar{V} \rightarrow \bar{V}$. $\square$

Theorem 4.9.6. *Suppose that $\bar{f}$ is a *D -basis of vector space $\bar{V}$. Then any *D -automorphism $\bar{A}$ of vector space $\bar{V}$ has form*

$$(4.9.4) \quad v' = A_* {}^*v$$

where A is a *D -nonsingular matrix.

PROOF. (4.9.4) follows from theorem 4.4.3. Because $\bar{A}$ is an isomorphism for each vector $\bar{v}'$ exist one and only one vector $\bar{v}$ such that $\bar{v}' = \bar{v} {}^*\bar{A}$. Therefore, system of *D -linear equations (4.9.4) has a unique solution. According to corollary 4.7.5 matrix A is a nonsingular matrix. $\square$

Theorem 4.9.7. *Automorphisms of *D -vector space form a group GL_n^{*D} .*

PROOF. If we have two automorphisms $\bar{A}$ and $\bar{B}$ then we can write

$$\begin{aligned} v' &= A_* {}^*v \\ v'' &= B_* {}^*v' = B_* {}^*A_* {}^*v \end{aligned}$$

Therefore, the resulting automorphism has matrix $A_* {}^*B$. $\square$

CHAPTER 5

*D -Basis Manifold

5.1. *D -Linear Representation of Group

Let $\bar{V}$ be *D -vector space over division ring D . We proved in the theorem 4.9.6 that we can identify any *D -automorphism of a vector space $\bar{V}$ with certain matrix. We proved in the theorem 4.9.7 that *D -automorphisms of vector space form a group. When we study a representation in the *D -vector space *D -linear maps of the vector space interest us.

Definition 5.1.1. Let $\bar{V}$ be *D -vector space over division ring D .^{5.1} We call the representation f of group G in *D -vector space $\bar{V}$ ***D -linear $T\star$ -representation** or **$D\star$ -representation** if $f(a)$ is *D -automorphisms of vector space $\bar{V}$ for any $a \in G$. $\square$

Theorem 5.1.2. *D -automorphisms of vector space form a *D -linear covariant effective $T\star$ -representation of group $GL_n^{{}^*D}$.

PROOF. If we have two automorphisms $\bar{A}$ and $\bar{B}$ then we can write

$$\begin{aligned} v' &= A_* {}^*v \\ v'' &= B_* {}^*v' = B_* {}^*A_* {}^*v \end{aligned}$$

Therefore, the resulting automorphism has matrix $B_* {}^*A$.

It remains to prove that the kernel of inefficiency consists only of identity. Identity transformation satisfies to equation

$${}^i v = {}^i A_j {}^j v$$

Choosing values of coordinates as ${}^i v = {}^i \delta_k$ where we selected k we get

$$(5.1.1) \quad {}^i \delta_k = {}^i A_j {}^j \delta_k$$

From (5.1.1) it follows

$${}^i \delta_k = {}^i A_k$$

Since k is arbitrary, we get the conclusion $A = \delta$. $\square$

Theorem 5.1.3. Let A_1 be matrix of *D -linear map (4.4.1) relative to bases $\bar{\bar{f}}$ and $\bar{e}$ and A_2 be matrix of this *D -linear map relative to bases $\bar{g}$ and $\bar{h}$. Suppose the basis $\bar{\bar{f}}$ has coordinate matrix B relative the basis $\bar{g}$ of *D -vector space $\bar{V}$

$$\bar{\bar{f}} = \bar{g}_* {}^*B$$

and $\bar{e}$ has coordinate matrix C relative the basis $\bar{h}$ of *D -vector space $\bar{W}$

$$(5.1.2) \quad \bar{e} = \bar{h}_* {}^*C$$

^{5.1}Studying representation of the group in the *D -vector space we follow to the agreement described in the remark 2.2.15.

Then there is relationship between matrices A_1 and A_2

$$(5.1.3) \quad A_1 = C^{-1} {}^* {}^* A_2 {}^* {}^* B$$

PROOF. Vector $\bar{a} \in \bar{V}$ has expansion

$$\bar{a} = \bar{f} {}^* {}^* a = \bar{g} {}^* {}^* B {}^* {}^* a$$

relative to bases $\bar{f}$ and $\bar{g}$. Since A is *D -linear map, we can write it as

$$(5.1.4) \quad \bar{b} = \bar{e} {}^* {}^* A_1 {}^* {}^* a$$

relative to bases $\bar{f}$ and $\bar{e}$ and as

$$(5.1.5) \quad \bar{b} = \bar{h} {}^* {}^* B {}^* {}^* A_2 {}^* {}^* a$$

relative to bases $\bar{g}$ and $\bar{h}$. Since theorem 4.9.3 matrix C has * -inverse and from equation (5.1.2) it follows that

$$(5.1.6) \quad \bar{h} = \bar{e} {}^* {}^* C^{-1} {}^* {}^*$$

Substituting (5.1.6) into equation (5.1.5) we get

$$(5.1.7) \quad \bar{b} = \bar{e} {}^* {}^* C^{-1} {}^* {}^* A_2 {}^* {}^* B {}^* {}^* a$$

From theorem 4.3.3 and comparison of equations (5.1.4) and (5.1.7) it follows that

$$(5.1.8) \quad A_1 {}^* {}^* a = C^{-1} {}^* {}^* A_2 {}^* {}^* B {}^* {}^* a$$

Since vector a is arbitrary vector, from theorem 5.1.2 and equation (5.1.8) statement of theorem follows. $\square$

Theorem 5.1.4. Let $\bar{A}$ be automorphism of *D -vector space. Let A_1 be matrix of this automorphism defined relative to basis $\bar{f}$ and A_2 be matrix of the same automorphism defined relative to basis $\bar{g}$. Suppose the basis $\bar{f}$ has coordinate matrix B relative the basis $\bar{g}$

$$\bar{f} = \bar{g} {}^* {}^* B$$

Then there is relationship between matrices A_1 and A_2

$$A_1 = B^{-1} {}^* {}^* A_2 {}^* {}^* B$$

PROOF. Statement follows from theorem 5.1.3, because in this case $C = B$. $\square$

5.2. *D -Basis Manifold for Vector Space

Theorem 5.2.1. *D -automorphism $\bar{A}$ acting on each vector of *D -basis of vector space maps a *D -basis into another *D -basis.

PROOF. Let $\bar{e}$ be *D -basis of vector space $\bar{V}$. According to theorem 4.9.6, vector $\bar{e}_a$ maps into a vector $\bar{e}'_a$

$$(5.2.1) \quad \bar{e}'_a = A {}^* {}^* \bar{e}_a$$

Suppose vectors $\bar{e}'_a$ are *D -linearly dependent. Then $\lambda \neq 0$ in equation

$$(5.2.2) \quad \bar{e}' {}^* {}^* \lambda = 0$$

From equations (5.2.1) and (5.2.2) it follows that

$$A^{-1} {}^* {}^* \bar{e}' {}^* {}^* \lambda = \bar{e} {}^* {}^* \lambda = 0$$

and $\lambda \neq 0$. This contradicts to the statement that vectors $\bar{e}_a$ are *D -linearly independent. Therefore vectors $\bar{e}'_a$ are *D -linearly independent and form basis. $\square$

Thus we can extend a *D -linear covariant $T\star$ -representation of the group GL_n^{*D} to the set of *D -bases. Transformation of this $T\star$ -representation is called **active transformation** because the *D -linear map of the vector space induced this transformation ([6]). Since a *D -linear operation is not defined on the *D -basis manifold the active transformation is not a *D -linear transformation. According to definition we write the action of the transformation $A \in GL_n^{*D}$ on the *D -basis $\bar{e}$ as $A_*\bar{e}$. Homomorphism of the group G into the group GL_n^{*D} of active transformations is called **active $\star T$ -representation**.

Theorem 5.2.2. *Active $T\star$ -representation of group GL_n^{*D} on the set of *D -bases is single transitive representation.*

PROOF. To prove this theorem it is sufficient to show that at least one transformation of $T\star$ -representation is defined for any two *D -bases and this transformation is unique. *D -homomorphism $\bar{A}$ operating on *D -basis $\bar{e}$ has form

$$g_i = A_* e_i$$

where g_i is coordinate matrix of vector $\bar{g}_i$ and e_i is coordinate matrix of vector $\bar{e}_i$ relative *D -basis $\bar{h}$. Therefore, coordinate matrix of image of *D -basis equal to product of coordinate matrix of original *D -basis over matrix of *D -automorphism

$$g = A_* e$$

Since the theorem 4.9.3, matrices g and e are nonsingular. Therefore, matrix

$$A = g_* e^{-1}$$

is the matrix of *D -automorphism mapping *D -basis $\bar{e}$ to *D -basis $\bar{g}$.

Suppose elements g_1, g_2 of group G and *D -basis $\bar{e}$ satisfy equation

$$(5.2.3) \quad g_{1*}\bar{e} = g_{2*}\bar{e}$$

Since theorems 4.9.3 and 2.2.16 we get $g_1 = g_2$. This proves statement of theorem. $\square$

Let us define an additional structure on vector space $\bar{V}$. Then not every *D -linear map keeps properties of the selected structure. In this case we need subgroup G of the group GL_n^{*D} *D -linear maps from which hold properties of the selected structure. We usually call group G **symmetry group**. Without loss of generality we identify element g of group G with corresponding transformation of representation and write its action on vector $\bar{v} \in \bar{V}$ as $g_*\bar{v}$.

Not every two bases can be mapped by a v from the symmetry group because not every nonsingular linear transformation belongs to the representation of group G . Therefore, we can represent the set of bases as a union of orbits of group G .

Definition 5.2.3. We call orbit $G_*\bar{e}$ of the selected basis $\bar{e}$ the **basis manifold $\mathcal{B}(\bar{V}, G)$ of *D -vector space $\bar{V}$** . $\square$

Theorem 5.2.4. *Active $T\star$ -representation of group G on basis manifold is single transitive representation.*

PROOF. This is corollary of theorem 5.2.2 and definition 5.2.3. $\square$

Theorem 5.2.4 means that the basis manifold $\mathcal{B}(\overline{V}, G)$ is a homogenous space of group G . According to theorem 3.5.13 $\star T$ -representation, commuting with active, exists on the basis manifold. As we see from remark 3.5.14 transformation of $\star T$ -representation is different from an active transformation and cannot be reduced to transformation of space $\overline{V}$. To emphasize the difference this transformation is called a **passive transformation** of basis manifold $\mathcal{B}(\overline{V}, G)$ and the $\star T$ -representation is called **passive $\star T$ -representation**. According to the definition we write the passive transformation, defined by element $A \in G$, of basis $\overline{e}$ as $\overline{e}_* \star A$.

Remark 5.2.5. I show samples of active and passive representations in table 5.2.1. $\square$

TABLE 5.2.1. Active and Passive Representations

Vector space	Group of Representation	Active Representation	Passive Representation
*D -vector space	GL_n^{*D}	$T\star$ -	$\star T$ -
*D -vector space	GL_n^{*D}	$T\star$ -	$\star T$ -
D_* -vector space	GL_n^{*D}	$\star T$ -	$T\star$ -
D^* -vector space	GL_n^{*D}	$\star T$ -	$T\star$ -

According to theorem 3.5.7 we can introduce on $\mathcal{B}(\overline{V}, G)$ two types of coordinates defined on group G . Since we defined two representations of group G on $\mathcal{B}(\overline{V}, G)$, we use passive $\star T$ -representation to define coordinates. Our choice is based on the following theorem.

Theorem 5.2.6. *The coordinate matrix of *D -basis $\overline{g}$ relative *D -basis $\overline{e}$ of vector space $\overline{V}$ is identical with the matrix of passive transformation mapping *D -basis $\overline{e}$ to *D -basis $\overline{g}$.*

PROOF. According to model described in the example 4.3.6, the coordinate matrix of *D -basis $\overline{g}$ relative *D -basis $\overline{e}$ consist from * -rows which are coordinate matrices of vectors $\overline{g}_i$ relative the *D -basis $\overline{e}$. Therefore,

$$(5.2.4) \quad \overline{g}_i = \overline{e}_* \star g_i$$

At the same time the passive transformation $\overline{A}$ mapping one *D -basis to another has a form

$$(5.2.5) \quad \overline{g}_i = \overline{e}_* \star A_i$$

Since theorem 4.3.3,

$$g_i = A_i$$

for any i . This proves the theorem. $\square$

Coordinates of representation are called **standard coordinates of *D -basis**. This point of view allows introduction of two types of coordinates for element g of group G . We can either use coordinates defined on the group, or introduce coordinates as elements of the matrix of the corresponding transformation. The former type of coordinates is more effective when we study properties of group G . The latter type of coordinates contains redundant data; however, it may be more

convenient when we study representation of group G . The latter type of coordinates is called **coordinates of representation**.

5.3. Geometric Object of *D -Vector Space

An active transformation changes *D -bases and vectors uniformly and coordinates of vector relative *D -basis do not change. A passive transformation changes only the *D -basis and it leads to change of coordinates of vector relative to *D -basis.

Let passive transformation $\bar{A} \in G$ maps *D -basis $\bar{e} \in \mathcal{B}(\bar{V}, G)$ into *D -basis $\bar{e}' \in \mathcal{B}(\bar{V}, G)$

$$(5.3.1) \quad \bar{e}' = \bar{e}_* {}^*A$$

Let vector $\bar{v} \in \bar{V}$ have expansion

$$(5.3.2) \quad \bar{v} = \bar{e}_* {}^*v$$

relative to *D -basis $\bar{e}$ and have expansion

$$(5.3.3) \quad \bar{v} = \bar{e}'_* {}^*v'$$

relative to *D -basis $\bar{e}'$. From (5.3.1) and (5.3.3) it follows that

$$(5.3.4) \quad \bar{v} = \bar{e}_* {}^*A_* {}^*v'$$

Comparing (5.3.2) and (5.3.4) we get

$$(5.3.5) \quad v = A_* {}^*v'$$

Because A is * -nonsingular matrix we get from (5.3.5)

$$(5.3.6) \quad v' = A^{-1} {}^* {}^*v$$

Coordinate transformation (5.3.6) does not depend on vector $\bar{v}$ or basis $\bar{e}$, but is defined only by coordinates of vector $\bar{v}$ relative to basis $\bar{e}$.

Theorem 5.3.1. *Coordinate transformations (5.3.6) form contravariant effective *D -linear $T\star$ -representation of group $GL_n {}^*D$ which is called **coordinate representation in *D -vector space**.*

PROOF. Suppose we have two consecutive passive transformations $\bar{A}$ and $\bar{B}$. Coordinate transformation (5.3.6) corresponds to passive transformation $\bar{A}$. Coordinate transformation

$$(5.3.7) \quad v'' = B^{-1} {}^* {}^*v'$$

corresponds to passive transformation $\bar{B}$. Product of coordinate transformations (5.3.6) and (5.3.7) has form

$$(5.3.8) \quad v'' = B^{-1} {}^* {}^*A^{-1} {}^* {}^*v = (A_* {}^*B)^{-1} {}^* {}^*v$$

and is coordinate transformation corresponding to passive transformation $\bar{A}_* {}^*\bar{B}$. It proves that coordinate transformations form contravariant *D -linear $T\star$ -representation of group G .

Suppose coordinate transformation does not change vectors δ_k . Then unit of group G corresponds to it because representation is single transitive. Therefore, coordinate representation is effective. $\square$

Let *D -linear map of group G to the group of passive transformations of *D -vector space $\overline{N}$ be coordinated with symmetry group of *D -vector space $\overline{V}$.^{5.2} This means that passive transformation $\overline{A}(\overline{a})$ of *D -vector space $\overline{N}$ corresponds to passive transformation $\overline{A}$ of *D -vector space $\overline{V}$.

$$(5.3.9) \quad \overline{e}'_N = \overline{e}'_N {}^* \overline{A}(\overline{a})$$

Then coordinate transformation in $\overline{N}$ gets form

$$(5.3.10) \quad w' = A(a^{-1} {}^* {}^*) {}^* w = A(a)^{-1} {}^* {}^* w$$

Definition 5.3.2. Orbit

$$(A(G)^{-1} {}^* {}^* w, \overline{e}'_V {}^* G)$$

is called **geometric object in coordinate representation defined in *D -vector space $\overline{V}$** . For any *D -basis $\overline{e}'_V = \overline{e}'_V {}^* \overline{A}$ corresponding point (5.3.10) of orbit defines **coordinates of geometric object in coordinate *D -vector space** relative *D -basis $\overline{e}'_V$. $\square$

Definition 5.3.3. Orbit

$$(A(G)^{-1} {}^* {}^* w, \overline{e}'_N {}^* A(G), \overline{e}'_V {}^* G)$$

is called **geometric object defined in *D -vector space $\overline{V}$** . For any *D -basis $\overline{e}'_V = a {}^* \overline{e}'_V$ corresponding point (5.3.10) of orbit defines **coordinates of a geometric object in *D -vector space** relative to *D -basis $\overline{e}'_V$ and the corresponding vector

$$\overline{w} = \overline{e}'_N {}^* w'$$

is called **representative of geometric object in $D {}^*$ -vector space** in *D -basis $\overline{e}'_V$. $\square$

Since a geometric object is an orbit of representation, we see that according to theorem 3.4.13 the definition of the geometric object is a proper definition.

We also say that $\overline{w}$ is a **geometric object of type A**

Definition 5.3.2 introduces a geometric object in coordinate space. We assume in definition 5.3.3 that we selected a *D -basis of vector space $\overline{W}$. This allows using a representative of the geometric object instead of its coordinates.

The question how large a diversity of geometric objects is well studied in case of vector spaces. However it is not such obvious in case of *D -vector spaces. As we can see from table 5.2.1 $D {}^*$ -vector space and *D -vector space have common symmetry group $GL_n {}^* D$. This allows study a geometric object in $D {}^*$ -vector space when we study passive representation in *D -vector space. Can we study the same time a geometric object in *D -vector space. At first glance, the answer is negative based theorem 4.8.9. However, equation 2.2.6 determines required *D -linear map between $GL_n {}^* D$ and $GL_n {}^* D$.

Theorem 5.3.4 (invariance principle). *Representative of geometric object does not depend on selection of *D -basis $\overline{e}'_V$.*

^{5.2}We use the same notation for type of vector space for vector spaces $\overline{N}$ and $\overline{V}$. However their type may be different.

PROOF. To define representative of geometric object, we need to select *D -basis $\bar{e}_{\bar{V}}$, *D -basis $\bar{e}_{\bar{W}}$ and coordinates of geometric object w^α . Corresponding representative of geometric object has form

$$\bar{w} = \bar{e}_{\bar{W}*} {}^*w$$

Suppose we map *D -basis $\bar{e}_{\bar{V}}$ to *D -basis $\bar{e}'_{\bar{V}}$ by passive transformation

$$\bar{e}'_{\bar{V}} = \bar{e}_{\bar{V}*} {}^*A$$

According building this forms passive transformation (5.3.9) and coordinate transformation (5.3.10). Corresponding representative of geometric object has form

$$\bar{w}' = \bar{e}'_{\bar{W}*} {}^*\bar{w}' = \bar{e}_{\bar{W}*} {}^*A(a) {}^*A(a)^{-1} {}^*w = \bar{e}_{\bar{W}*} {}^*w = \bar{w}$$

Therefore representative of geometric object is invariant relative selection of basis. $\square$

Definition 5.3.5. Let

$$\bar{w}_1 = \bar{e}_{\bar{W}*} {}^*w_1$$

$$\bar{w}_2 = \bar{e}_{\bar{W}*} {}^*w_2$$

be geometric objects of the same type defined in *D -vector space $\bar{V}$. Geometric object

$$\bar{w} = \bar{e}_{\bar{W}*} {}^*(w_1 + w_2)$$

is called **sum**

$$\bar{w} = \bar{w}_1 + \bar{w}_2$$

of geometric objects $\bar{w}_1$ and $\bar{w}_2$. $\square$

Definition 5.3.6. Let

$$\bar{w}_1 = \bar{e}_{\bar{W}*} {}^*w_1$$

be geometric object defined in *D -vector space $\bar{V}$. Geometric object

$$\bar{w}_2 = \bar{e}_{\bar{W}*} {}^*(kw_1)$$

is called **product**

$$\bar{w}_2 = k\bar{w}_1$$

of geometric object $\bar{w}_1$ and constant $k \in D$. $\square$

Theorem 5.3.7. *Geometric objects of type A defined in *D -vector space $\bar{V}$ form *D -vector space.*

PROOF. The statement of the theorem follows from immediate verification of the properties of vector space. $\square$

CHAPTER 6

*D -Linear Map

6.1. *D -Linear Map

In this subsection we assume $\overline{V}, \overline{W}$ are *D -vector spaces.

Definition 6.1.1. Let us denote by $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ set of *D -linear maps

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

of *D -vector space $\overline{V}$ into *D -vector space $\overline{W}$. Let us denote by $\mathcal{L}(D_*; \overline{V}; \overline{W})$ set of D_* -linear maps

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

of D_* -vector space $\overline{V}$ into D_* -vector space $\overline{W}$. □

We can consider division ring D as *D -vector space of dimension 1. Correspondingly we can consider set $\mathcal{L}(D_*; D; \overline{W})$ and $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; D)$.

Definition 6.1.2. Let us denote by $\mathcal{L}({}^*T; S; R)$ set of $\star T$ -representations of division ring S in additive group of division ring R . Let us denote by $\mathcal{L}(T_*; S; R)$ set of $T\star$ -representations of division ring S in additive group of division ring R . □

Theorem 6.1.3. Suppose $\overline{V}, \overline{W}$ are *D -vector spaces. Then set $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ is an Abelian group relative composition law

$$(6.1.1) \quad (\overline{A} + \overline{B})_*^* \overline{x} = \overline{A}_*^* \overline{x} + \overline{B}_*^* \overline{x}$$

PROOF. We need to show that map

$$\overline{A} + \overline{B} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

defined by equation (6.1.1) is *D -linear map of *D -vector spaces. According to definition 4.4.2

$$\overline{A}_*^* (\overline{x}_*^* a) = (\overline{A}_*^* \overline{x})_*^* a$$

$$\overline{B}_*^* (\overline{x}_*^* a) = (\overline{B}_*^* \overline{x})_*^* a$$

We see that

$$\begin{aligned} (\overline{A} + \overline{B})_*^* (a \overline{x}_*^*) &= \overline{A}_*^* (a \overline{x}_*^*) + \overline{B}_*^* (\overline{x}_*^* a) \\ &= (\overline{x}_*^* \overline{A})_*^* a + (\overline{x}_*^* \overline{B})_*^* a \\ &= (\overline{A}_*^* \overline{x} + \overline{B}_*^* \overline{x})_*^* a \\ &= ((\overline{A} + \overline{B})_*^* \overline{x})_*^* a \end{aligned}$$

We need to show also that this operation is commutative.

$$\begin{aligned} (\overline{A} + \overline{B})_*^* \overline{x} &= \overline{A}_*^* \overline{x} + \overline{B}_*^* \overline{x} \\ &= \overline{B}_*^* \overline{x} + \overline{A}_*^* \overline{x} \\ &= (\overline{B} + \overline{A})_*^* \overline{x} \end{aligned}$$

□

Definition 6.1.4. *D -Linear map $\overline{A} + \overline{B}$ is called **sum of *D -linear maps $\overline{A}$ and $\overline{B}$** . □

Theorem 6.1.5. Let $\overline{f} = (\overline{f}_i, i \in I)$ be a *D -basis in vector space $\overline{V}$ and $\overline{e} = (\overline{e}_j, j \in J)$ be a *D -basis in vector space $\overline{W}$. Let $A = ({}^j A_i), i \in I, j \in J$, be arbitrary matrix. Then map

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

defined by equation

$$b = A_*^* a$$

relative to selected *D -bases is a *D -linear map of vector spaces.

PROOF. Theorem 6.1.5 is inverse statement to theorem 4.4.3. Suppose $\overline{A}_*^* \overline{v} = \overline{e}_*^* A_*^* v$. Then

$$\begin{aligned} \overline{A}_*^* (\overline{v}_*^* a) &= \overline{e}_*^* A_*^* v_*^* a \\ &= (\overline{A}_*^* \overline{v})_*^* a \end{aligned}$$

□

Theorem 6.1.6. Let $\overline{f} = (\overline{f}_i, i \in I)$ be a *D -basis in vector space $\overline{V}$ and $\overline{e} = (\overline{e}_j, j \in J)$ be a *D -basis in vector space $\overline{W}$. Suppose *D -linear map $\overline{A}$ has matrix $A = ({}^j A_i), i \in I, j \in J$, relative to selected *D -bases. Let $m \in D$. Then matrix

$${}^j (mA)_i = m {}^j A_i$$

defines *D -linear map

$$m\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

which we call **$D\star$ -product of *D -linear map $\overline{A}$ over scalar**.

PROOF. The statement of the theorem is corollary of the theorem 6.1.5. □

Theorem 6.1.7. Set $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ is D_*^* -vector space.

PROOF. Theorem 6.1.3 states that $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ is an Abelian group. It follows from theorem 6.1.6 that element of division ring D defines $T\star$ -transformation on the Abelian group $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$. From theorems 6.1.5, 4.1.1, and 4.1.3 it follows that set $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ is $D\star$ -vector space.

Writing elements of basis $D\star$ -vector space $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ as * -rows or * -columns, we represent $D\star$ -vector space $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ as D_*^* - or *D -vector space. I want to stress that choice between D_*^* - and *D -linear combination in $D\star$ -vector space $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ does not depend on type of vector spaces $\overline{V}$ and $\overline{W}$.

To select the type of vector space $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ I draw attention to the following observation. let $\overline{V}$ and $\overline{W}$ be *D -vector spaces. Suppose $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ is D_*^* -

vector space. Then we can represent the operation of * -row of *D -linear maps ${}^j\bar{A}$ on * -row of vectors $\bar{f}_i$ as matrix

$$\begin{pmatrix} {}^1\bar{A} \\ \dots \\ {}^m\bar{A} \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} \bar{f}_1 & \dots & \bar{f}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1\bar{A} {}^* \bar{f}_1 & \dots & {}^1\bar{A} {}^* \bar{f}_n \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^m\bar{A} {}^* \bar{f}_1 & \dots & {}^m\bar{A} {}^* \bar{f}_n \end{pmatrix}$$

This notation is coordinated with matrix notation of action of $D {}^*$ -linear combination $a {}^* \bar{A}$ of *D -linear maps $\bar{A}$. $\square$

We can also define $\star D$ -product of *D -linear map $\bar{A}$ over scalar. However in general we cannot carry this $\star T$ -representation of division ring D in $D \star$ -vector space $\mathcal{L}({}^*D; \bar{V}; \bar{W})$ into *D -vector space $\bar{W}$. Indeed, in case of $\star D$ -product we get

$$(\bar{A}m) {}^* \bar{v} = (\bar{A}m) {}^* \bar{f} {}^* v = \bar{e} {}^* (Am) {}^* v$$

Since product in division ring is noncommutative, we cannot express this expression as product of $\bar{A} {}^* \bar{v}$ over m .

Ambiguity of notation

$$m {}^* A {}^* v$$

is corollary of theorem 6.1.7. We may assume that meaning of this notation is clear from the text. To make notation more clear we will use brackets. Expression

$$w = [m {}^* A] {}^* v$$

means that $D {}^*$ -linear composition of *D -linear maps iA maps the vector $\bar{v}$ to the vector $\bar{w}$. Expression

$$w = B {}^* A {}^* v$$

means that * -product of *D -linear maps A and B maps the vector $\bar{v}$ to the vector $\bar{w}$.

6.2. $1 - {}^*D$ -Form on a Vector space

Definition 6.2.1. $1 - {}^*D$ -form on vector space $\bar{V}$ is *D -linear map

$$(6.2.1) \quad \bar{b} : \bar{V} \rightarrow D$$

$\square$

We can write value of $1 - {}^*D$ -form $\bar{b}$, defined for vector $\bar{a}$, as

$$\bar{b}(\bar{a}) = \langle \bar{b}, \bar{a} \rangle$$

Theorem 6.2.2. Set $\mathcal{L}({}^*D; \bar{V}; D)$ is $D \star$ -vector space.

PROOF. *D -vector space of dimension 1 is equivalent to division ring D $\square$

Theorem 6.2.3. Let $\bar{e}$ be a *D -basis in vector space $\bar{V}$. $1 - {}^*D$ -form $\bar{b}$ has presentation

$$(6.2.2) \quad \langle \bar{b}, \bar{a} \rangle = b {}^* a$$

relative to selected *D -basis, where vector $\bar{a}$ has expansion

$$(6.2.3) \quad \bar{a} = \bar{e} {}^* a$$

and

$$(6.2.4) \quad b_i = \langle \bar{b}, \bar{e}_i \rangle$$

PROOF. Because $\bar{b}$ is $1-{}^*D$ -form, it follows from (6.2.3) that

$$(6.2.5) \quad \langle \bar{b}, \bar{a} \rangle = \langle \bar{b}, \bar{e}_*{}^*a \rangle = \langle \bar{b}, \bar{e}_i \rangle {}^i a$$

(6.2.2) follows from (6.2.5) and (6.2.4). $\square$

Theorem 6.2.4. Let $\bar{e}$ be a *D -frame in vector space $\bar{V}$. $1-{}^*D$ -form (6.2.1) is uniquely defined by values (6.2.4) into which $1-{}^*D$ -form $\bar{b}$ maps vectors of frame.

PROOF. Statement follows from theorems 6.2.3 and 4.3.3. $\square$

Theorem 6.2.5. Let $\bar{e}$ be a *D -frame in vector space $\bar{V}$. The set of $1-{}^*D$ -forms ${}^j\bar{d}$ such that

$$(6.2.6) \quad \langle {}^j\bar{d}, \bar{e}_i \rangle = {}^j\delta_i$$

is $D_*{}^*D$ -basis $\bar{\bar{d}}$ of vector space $\mathcal{L}({}_*{}^*D; \bar{V}; D)$.

PROOF. Since we assume $b_i = {}^j\delta_i$, then according to theorem 6.2.4 there exists the $1-{}^*D$ -form ${}^j\bar{d}$ for given j . If we assume that there exists $1-{}^*D$ -form

$$\bar{b} = b_*{}^*\bar{d} = \bar{0}$$

then

$$b_j \langle {}^j\bar{d}, \bar{e}_i \rangle = 0$$

According to equation (6.2.6),

$$b_i = b_j {}^j\delta_i = 0$$

Therefore, $1-{}^*D$ -forms ${}^j\bar{d}$ are linearly independent. $\square$

Definition 6.2.6. Let $\bar{V}$ be *D -vector space. $D_*{}^*D$ -vector space

$$\bar{V}^* = \mathcal{L}({}_*{}^*D; \bar{V}; D)$$

is called **dual space of *D -vector space $\bar{V}$** . Let $\bar{e}$ be a *D -basis in vector space $\bar{V}$. $D_*{}^*D$ -basis $\bar{\bar{d}}$ of vector space $\bar{V}^*$, satisfying to equation (6.2.6), is called **$D_*{}^*D$ -basis dual to *D -basis $\bar{e}$** . $\square$

Theorem 6.2.7. Let $\bar{A}$ be passive transformation of basis manifold $\mathcal{B}(\bar{V}, GL_n^{*D})$. Let *D -basis

$$(6.2.7) \quad \bar{e}' = \bar{e}_*{}^*A$$

be image of *D -basis $\bar{e}$. Let $\bar{B}$ be passive transformation of basis manifold $\mathcal{B}(\bar{V}^*, GL_n^{*D})$ such, that $D_*{}^*D$ -basis

$$(6.2.8) \quad \bar{\bar{d}}' = B_*{}^*\bar{\bar{d}}$$

is dual to *D -basis. Then

$$(6.2.9) \quad B = A^{-1}{}^*$$

PROOF. From equations (6.2.6), (6.2.7), (6.2.8) it follows

$$(6.2.10) \quad \begin{aligned} {}^j\delta_i &= \langle {}^j\bar{d}', \bar{e}'_i \rangle \\ &= {}^jB_l \langle {}^l\bar{d}, \bar{e}'_i \rangle = {}^kA_i \\ &= {}^jB_l {}^l\delta_k {}^kA_i \\ &= {}^jB_k {}^kA_i \end{aligned}$$

Equation (6.2.9) follows from equation (6.2.10). $\square$

6.3. Twin Representations of Division Ring

Theorem 6.3.1. *We can introduce structure of $D\star$ -vector space in any *D -vector space defining $D\star$ -product of vector over scalar using equation*

$$m\bar{v} = m\bar{\delta}_* {}^*\bar{v}$$

PROOF. We verify directly that the map

$$f : D \rightarrow \bar{V}^*$$

defined by equation

$$f(m) = m\bar{\delta}$$

defines $T\star$ -representation of the ring D . □

We can formulate the theorem 6.3.1 by other way.

Theorem 6.3.2. *Suppose we defined an effective $\star T$ -representation f of ring D on the Abelian group $\bar{V}$. Then we can uniquely define an effective $T\star$ -representation h of ring D on the Abelian group $\bar{V}$ such that diagram*

$$\begin{array}{ccc} \bar{V} & \xrightarrow{h(a)} & \bar{V} \\ \downarrow f(b) & & \downarrow f(b) \\ \bar{V} & \xrightarrow{h(a)} & \bar{V} \end{array}$$

is commutative for any $a, b \in D$. □

We call representations f and h **twin representations of the division ring D** .

Theorem 6.3.3. *In vector space $\bar{V}$ over division ring D we can define $D\star$ -product and $\star D$ -product of vector over scalar. According to theorem 6.3.2 these operations satisfy equation*

$$(6.3.1) \quad (a\bar{m})b = a(\bar{m}b)$$

Equation (6.3.1) represents **associative law for twin representations**. This allows us writing of such expressions without using of brackets.

PROOF. In section 6.1 there is definition of $D\star$ -product of *D -linear map $\bar{A}$ over scalar. According to theorem 6.3.1 $T\star$ -representation of division ring D in $D\star$ -vector space $\mathcal{L}({}^*D; \bar{V}; \bar{W})$ can be carried into *D -vector space $\bar{W}$ according to rule

$$[m\bar{A}]_* {}^*\bar{v} = [m\delta]_* ({}^*\bar{A}_* {}^*\bar{v}) = m(\bar{A}_* {}^*\bar{v})$$

□

The analogy of the vector space over field goes so far that we can assume an existence of the concept of basis which serves for $D\star$ -product and $\star D$ -product of vector over skalar.

Theorem 6.3.4. *In vector space *D -basis manifold and *D -basis manifold are different*

$$\mathcal{B}(\bar{V}, D_*^*) \neq \mathcal{B}(\bar{V}, {}^*D)$$

PROOF. To prove this theorem we use the standard representation of a matrix. Without loss of generality we prove theorem in coordinate vector space D^n .

Let $\bar{e} = (\bar{e}_i = (\delta_i^j), i, j \in i, |i| = n)$ be the set of vectors of vector space D^n . $\bar{e}$ is evidently *D -basis and *D -basis. For arbitrary set of vectors $(\bar{f}_i, i \in i, |i| = n)$ *D -coordinate matrix

$$(6.3.2) \quad f = \begin{pmatrix} f_1^1 & \dots & f_1^n \\ \dots & \dots & \dots \\ f_n^1 & \dots & f_n^n \end{pmatrix}$$

relative to basis $\bar{e}$ coincide with *D -coordinate matrix relative to basis $\bar{e}$.

Let the set of vectors $(\bar{f}_i, i \in i, |i| = n)$ be *D -basis. According to theorem 4.9.3 matrix (6.3.2) is * -nonsingular matrix.

Let the set of vectors $(\bar{f}_i, i \in i, |i| = n)$ be *D -basis. According to theorem 4.9.3 matrix (6.3.2) is * -nonsingular matrix.

Therefore, if the set of vectors $(\bar{f}_i, i \in i, |i| = n)$ is *D -basis and *D -basis their coordinate matrix (6.3.2) is * -nonsingular and * -nonsingular matrix. The statement follows from theorem 4.8.9. $\square$

From theorem 6.3.4 it follows that in vector space $\bar{V}$ there exists D_* -basis $\bar{e}$ which is not *D -basis.

6.4. D -Vector Space

For many problems we may confine ourselves to considering of $D\star$ -vector space or $\star D$ -vector space. However there are problems where we forced to reject simple model and consider both structures of vector space at the same time. Such space we call **D -vector space**.

Assume *D -basis $\bar{p}_*$ and D^* -basis ${}^*\bar{p}$ in D -vector space $\bar{V}$. Vector ${}_i\bar{p}$ of D^* -basis ${}^*\bar{p}$ has expansion

$$(6.4.1) \quad {}_i\bar{p} = \bar{p}_j \cdot {}^j_i p_{12} \quad {}_i\bar{p} = \bar{p}_* \cdot {}^*_i p_{12}$$

relative to *D -basis $\bar{p}_*$. Vector $\bar{p}_j$ of *D -basis $\bar{p}_*$ has expansion

$$(6.4.2) \quad \bar{p}_j = p_{21} \cdot {}^i_j \bar{p} \quad \bar{p}_j = p_{21} \cdot {}^*_j {}^*\bar{p}$$

relative to D^* -basis ${}^*\bar{p}$.

It is easy to see from design that p_{12} is coordinate matrix of D^* -basis ${}^*\bar{p}$ relative to *D -basis $\bar{p}_*$. * -rows of matrix p_{12} are D^* -linearly independent.

In the same way, p_{21} is coordinate matrix of *D -basis $\bar{p}_*$ relative to D^* -basis ${}^*\bar{p}$. * -rows of matrix p_{21} are *D -linearly independent.

From equations (6.4.1) and (6.4.2) it follows

$$(6.4.3) \quad {}_i\bar{p} = \bar{p}_j \cdot {}^j_i p_{12} = p_{21} \cdot {}^k_j {}^*_k \bar{p} \cdot {}^j_i p_{12} \quad {}_i\bar{p} = \bar{p}_* \cdot {}^*_i p_{12} = (p_{21} \cdot {}^*_i {}^*\bar{p}) \cdot {}^*_i p_{12}$$

From equation (6.4.3) we see that order of brackets is important.

Though matrices p_{21} and p_{12} are not inter inverse, we see that equation (6.4.3) represents identical transformation of D -vector space. It is possible to write this transformation as

$$(6.4.4) \quad \begin{aligned} \bar{p}_j &= p_{21} \cdot {}^i_j {}^*_i \bar{p} = p_{21} \cdot {}^i_j (\bar{p}_k \cdot {}^k_i p_{12}) \\ \bar{p}_j &= p_{21} \cdot {}^*_j {}^*\bar{p} = p_{21} \cdot {}^*_j ({}^*\bar{p}_* \cdot p_{12}) \end{aligned}$$

From comparison of equations (6.4.3) and (6.4.4) it follows that change of order of brackets changes order of summation. These equations express the symmetry in choice of D^* -basis ${}^*\bar{p}$ and *D -basis $\bar{p}_*$.

Vector $\bar{r} \in \bar{V}$ has expansion

$$(6.4.5) \quad \bar{r} = r^i {}_i\bar{p} = \bar{p}_j {}^j r \quad \bar{r} = r^* {}^*\bar{p} = \bar{p}_* {}^* r$$

Let us substitute (6.4.1) into (6.4.5)

$$(6.4.6) \quad r^i \bar{p}_j {}^j p_{12} = \bar{p}_j {}^j r \quad r^* ({}^*\bar{p}_* {}^* p_{12}) = \bar{p}_* {}^* r$$

Let us substitute (6.4.5) into (6.4.3)

$$(6.4.7) \quad \begin{aligned} r^i {}_i\bar{p} &= r^i \bar{p}_j {}^j p_{12} &= r^i p_{21} {}^k {}_k\bar{p} {}^j p_{12} \\ r^* {}^*\bar{p} &= r^* ({}^*\bar{p}_* {}^* p_{12}) &= r^* ({}^*(p_{21} {}^* {}^*\bar{p}) {}^* p_{12}) \end{aligned}$$

Definition 6.4.1. Coordinates

$${}^r_* = \begin{pmatrix} r^1 \\ \dots \\ r^n \end{pmatrix}$$

of vector $\bar{r}$ relative D^* -basis ${}^*\bar{p}$ are called **D^* -component of coordinates of vector $\bar{r}$** . Coordinates

$${}^*_r = \begin{pmatrix} {}^1_r \\ \dots \\ {}^n_r \end{pmatrix}$$

of vector $\bar{r}$ relative D_* -basis $\bar{p}_*$ are called **D_* -component of coordinates of vector $\bar{r}$** . $\square$

Remark 6.4.2. To avoid the overuse of notation, we follow the rule below. If the product contains a D^* -component of coordinates of vector or a D_* -component of coordinates of vector, or we use corresponding indexes, we may skip symbol * , because it is clear from notation which components of vector we use. We extend similar convention for case of *D -basis ${}^*\bar{p}_*$ and D_* -basis $\bar{p}_*$. We do not use convention in case when brief notation is ambiguous. $\square$

We see in map (6.4.7) that we use transformation of D_* -basis. Expansion of vector relative D_* -basis is the same before and after transformation. We defined active and passive transformations of basis manifold of D_* -vector space in section 5.2. By analogy we assume that transformation (6.4.3) is passive transformation.

Product of Representations

7.1. Bimodule

Definition 7.1.1. $\overline{V}$ is a $(S\star, \star T)$ -bimodule if we define structures of a $S\star$ -vector space and a $\star T$ -vector space on the set $\overline{V}$.^{7.1} $\square$

We also use notation ${}_S\overline{V}_T$ when we want to tell that $\overline{V}$ is (S, T) -bimodule.

Example 7.1.2. In section 6.4 we considered D -vector space where we can define the structure of $(D^*, {}^*D)$ -bimodule. $\square$

Example 7.1.3. Set of $n \times m$ matrices builds up $(D\star, \star D)$ -bimodule. We represent $D\star$ -basis as set of matrices ${}_i^j e = (\delta_i^l \delta_k^j)$. $\square$

Example 7.1.4. To see example of $(S_*, {}^*T)$ -bimodule we can use set of matrices

$$(7.1.1) \quad \begin{pmatrix} (A_1, {}^1B) & \dots & (A_1, {}^mB) \\ \dots & \dots & \dots \\ (A_n, {}^1B) & \dots & (A_n, {}^mB) \end{pmatrix}$$

Formally we can represent this matrix in form

$$\begin{pmatrix} (A_1, {}^1B) & \dots & (A_1, {}^mB) \\ \dots & \dots & \dots \\ (A_n, {}^1B) & \dots & (A_n, {}^mB) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ \dots \\ A_n \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} {}^1B & \dots & {}^mB \end{pmatrix}$$

This presentation clearly shows that S_*^* -dimension of $(S_*, {}^*T)$ -bimodule is n and *T -dimension is m . However in contrast to example 7.1.2 we cannot build up S_*^* -basis or *T -basis which generate $(S_*, {}^*T)$ -bimodule. As a matter of fact, basis of $(S_*, {}^*T)$ -bimodule has form $({}^a\overline{e}, \overline{f}_b)$; and any vector of $(S_*, {}^*T)$ -bimodule has expansion

$$(7.1.2) \quad (\overline{A}, \overline{B}) = A_a ({}^a\overline{e}, \overline{f}_b) {}^b B$$

Coefficients of this expansion generate matrix (7.1.1). $\square$

We can write equation (7.1.2) as

$$(7.1.3) \quad (\overline{A}, \overline{B}) = (A_* {}^* \overline{e}, \overline{f}_* {}^* B)$$

Equation (7.1.3) looks unusual, however it becomes clear, if we assume

$$(\overline{A}, \overline{B}) = (\overline{A}, \overline{0}) + (\overline{0}, \overline{B})$$

^{7.1}I recall, that we use notation $S\star$ -vector space for left S -vector space and $\star T$ -vector space for right T -vector space.

Convention 4.2.6 holds for representation of vectors of *T -vector space is independent from representation of vectors of S_* -vector space. We write down this equation as

$$(7.1.4) \quad (\overline{A}, \overline{B}) = (A^* {}^*\overline{e}, B^* {}^*\overline{f})$$

Coordinates of vector $(\overline{A}, \overline{B})$ do not generate matrix. However we do not care about this now.

We want to write components A and B in equation (7.1.2) on the one hand relative to vectors $({}^a\overline{e}, {}^b\overline{f})$. At first glance it appears impossible. However we accept convention to write this equation as

$$(\overline{A}, \overline{B}) = (A_a, B_b)({}^a\overline{e}, {}^b\overline{f}) = (A_*^*, B_*^*)({}^a\overline{e}, {}^b\overline{f})$$

This structure can be generalized.

7.2. Direct Product of Division Rings

Definition 7.2.1. Let $\mathcal{A}$ be a category. Let $\{B_i, i \in I\}$ be the set of objects of $\mathcal{A}$. Object

$$P = \prod_{i \in I} B_i$$

and set of morphisms

$$\{f_i : P \longrightarrow B_i, i \in I\}$$

is called a **product of objects** $\{B_i, i \in I\}$ **in category** $\mathcal{A}$ ^{7.2} if for any object R and set of morphisms

$$\{g_i : R \longrightarrow B_i, i \in I\}$$

there exists a unique morphism

$$h : R \longrightarrow P$$

such that diagram

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{f_i} & B_i \\ \uparrow h & \nearrow g_i & \\ R & & \end{array} \quad f_i \circ h = g_i$$

is commutative for all $i \in I$. □

If $|I| = n$, then we also will use notation

$$G = \prod_{i=1}^n B_i = B_1 \times \dots \times B_n$$

for product of objects $\{B_i, i \in I\}$ in $\mathcal{A}$.

Definition 7.2.2. Let $\{G_i, i \in I\}$ be the set of groups. Let

$$G = \prod_{i \in I} G_i$$

^{7.2}I made definition according to [1], p. 58

be Cartesian product of the sets $G_i, i \in I$. We can define a group structure on G by componentwise multiplication. If $x = (x_i, i \in I) \in D$ and $y = (y_i, i \in I) \in D$, we define their product

$$xy = (x_i y_i, i \in I)$$

If $x = (x_i, i \in I) \in D$, we define the inverse

$$x^{-1} = (x_i^{-1}, i \in I)$$

The set G is called **product of groups**^{7.3} $G_i, i \in I$. □

If $|I| = n$, then we also will use notation

$$G = \prod_{i=1}^n G_i = G_1 \times \dots \times G_n$$

for product of groups $G_1, \dots, G_n$.

Theorem 7.2.3. *Product of Abelian groups is Abelian group.*

PROOF. Let $x = (x_i, i \in I) \in G$ and $y = (y_i, i \in I) \in G$. Then

$$x + y = (x_i + y_i, i \in I) = (y_i + x_i, i \in I) = y + x$$

□

Definition 7.2.4. Let $\{D_i, i \in I\}$ be the set of division rings. Let

$$D = \prod_{i \in I} D_i$$

be product of additive groups of division rings $D_i, i \in I$. If $x = (x_i, i \in I) \in D$ and $y = (y_i, i \in I) \in D$, we define their product componentwise

$$xy = (x_i y_i, i \in I)$$

The multiplication unit is $e = (e_i, i \in I) \in D$ where $e_i, i \in I$ is multiplication unit of D_i . The set D is called **direct product of division rings**^{7.4} $D_i, i \in I$. □

If $|I| = n$, then we also will use notation

$$D = \prod_{i=1}^n D_i = D_1 \times \dots \times D_n$$

for product of division rings $D_1, \dots, D_n$.

Direct product of division rings $D_i, i \in I$, in general, is not division ring. For instance, let $x_1 \in D_1, x_1 \neq 0, x_2 \in D_2, x_2 \neq 0$. Then

$$(x_1, 0)(0, x_2) = (0, 0)$$

However, direct product of division rings is ring. Therefore, direct product is not defined in category of division rings, however direct product of division rings is defined in category of rings.

^{7.3}I made definition according to example from [1], p. 9

^{7.4}I made definition according to proposition 1.1 from [1], p. 91

7.3. Direct Product of D_*^* -Vector Spaces

Theorem 7.3.1. *Let category $\mathcal{A}$ of $\mathfrak{F}$ -algebras have product. Then in category $T \star \mathcal{A}$ ^{7.5} there exists product of single transitive $T \star$ -representations of $\mathfrak{F}$ -algebra.*

PROOF. Let

$$P = \prod_{i \in I} B_i$$

be product of set of $\mathfrak{F}$ -algebras $\{B_i, i \in I\}$ and for any $i \in I$

$$t_i : P \longrightarrow B_i$$

be morphism from $\mathfrak{F}$ -algebra P into $\mathfrak{F}$ -algebra B_i . Let R be other object of category $\mathcal{A}$ and for any $i \in I$

$$r_i : R \longrightarrow B_i$$

be morphism from $\mathfrak{F}$ -algebra R into $\mathfrak{F}$ -algebra B_i . According to definition 7.2.1 there exists a unique morphism

$$s : R \longrightarrow P$$


such that

$$t_i \circ s = r_i$$

Let

$$N = \prod_{i \in I} K_i$$

be Cartesian product of sets $K_i, i \in I$. For each $i \in I$ let us consider corresponding morphisms of representations of $\mathfrak{F}$ -algebra on diagram



From diagrams (2), (3) and theorem 3.2.10 commutativity of diagram (1) follows. Let $m \in M$. According to theorem 3.2.8 the map S is defined unambiguously, when we select image $S(m) \in N$. Because diagram (1) is commutative, we assume $S(m) = (R_i(m), i \in I)$. $\square$

Theorem 7.3.2. *In category $T \star \mathcal{G}$ of $T \star$ -representations of group there exists product of effective $T \star$ -representations of group.*

^{7.5}See definition 3.2.11

PROOF. Statement of theorem is corollary of theorems 7.3.1 and 3.5.10 $\square$

Definition 7.3.3. Let $\{\bar{V}_i, i \in I\}$ be the set of *D_i -vector spaces. $T\star$ -Representation of ring $D = \prod_{i \in I} D_i$ in the Abelian group $\bar{V} = \prod_{i \in I} \bar{V}_i$ is called **direct product**

$$\bar{V} = \prod_{i \in I} \bar{V}_i$$

of *D_i -vector spaces^{7.6} $\bar{V}_i, i \in I$. $\square$

If $|I| = n$, then we also will use notation

$$\bar{V} = \prod_{i=1}^n \bar{V}_i = \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n$$

for direct product of *D_i -vector spaces $\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n$

According to definition we define representation of ring D in Abelian group $\bar{V}$ componentwise. If $a = (a_i, i \in I) \in D$ and $\bar{v} = (\bar{v}_i, i \in I) \in \bar{V}$, we define $\star T$ -representation corresponding to element a

$$\bar{v}a = (\bar{v}_i a_i, i \in I)$$

We consider convention described in remark 2.2.15 componentwise. We will write linear combination of *D -vectors $\bar{v}_k$ as

$$\bar{v}_* a = (\bar{v}_{i*} a_i, i \in I) = (\bar{v}_{i \cdot k} {}^k a_i, i \in I)$$

We also will use notation

$$(7.3.1) \quad \bar{v}_* a = (\bar{v}_{i*}, i \in I) ({}^* a_i, i \in I) = (\bar{v}_{i \cdot k}, i \in I) ({}^k a_i, i \in I)$$

If $|I| = n$, then we can write equation (7.3.1) as

$$\bar{v}_* a = (\bar{v}_{1*}, \dots, \bar{v}_{n*}) ({}^* a_1, \dots, {}^* a_n) = (\bar{v}_{1 \cdot k_1}, \dots, \bar{v}_{n \cdot k_n}) ({}^{k_1} a_1, \dots, {}^{k_n} a_n)$$

Since direct product of division rings is not division ring, then direct product of *D_i -vector spaces, in general, is module. However structure of this module is close to structure of *D -vector space.

Theorem 7.3.4. Let $\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n$ be the set of *D_i -vector spaces. Let $\bar{e}_i$ be the *D_i -basis of vector space $\bar{V}_i$. $\bar{V}$ the next way. Set of vectors $(\bar{e}_{1 \cdot i_1}, \dots, \bar{e}_{n \cdot i_n})$ builds up a basis of direct product

$$\bar{V} = \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n$$

PROOF. We prove the statement of theorem by induction on n .

When $n = 1$ the statement is evident.

Let statement be true when $n = k - 1$. We represent space $\bar{V}$ as^{7.7}

$$\bar{V} = \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_k = (\bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_{k-1}) \times \bar{V}_k$$

Correspondingly, we can represent arbitrary vector $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) \in \bar{V}$ as

$$(7.3.2) \quad (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) = ((\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{k-1}), \bar{v}_k) = ((\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{k-1}), \bar{0}) + (\bar{0}, \bar{v}_k)$$

^{7.6}I made definition according to [1], p. 127

^{7.7}In general, we need consider more wide class of modules like

$$\bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_k$$

including associativity of product.

Vector $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{k-1}) \in \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_{k-1}$ and according to the assumption of induction

$$(7.3.3) \quad (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{k-1}) = (\bar{e}_{1*}, \dots, \bar{e}_{k-1*}) (*v_1, \dots, *v_{k-1})$$

From equations (7.3.2) and (7.3.3) it follows


$$\begin{aligned} (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) &= ((\bar{e}_{1*}, \dots, \bar{e}_{k-1*}) (*v_1, \dots, *v_{k-1}), \bar{0}) + (\bar{0}, \bar{e}_{k*} *v_k) \\ &= (\bar{e}_{1*}, \dots, \bar{e}_{k-1*}, \bar{e}_k) (*v_1, \dots, *v_{k-1}, 0) + (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{k-1}, \bar{e}_{k*}) (0, \dots, *v_k) \\ &= (\bar{e}_{1*}, \dots, \bar{e}_{k-1*}, \bar{e}_{k*}) (*v_1, \dots, *v_{k-1}, *v_k) \end{aligned}$$

Therefore the statement is true when $n = k$. $\square$

When $\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n$ are D -vector spaces, direct product is called **direct product of D -vector spaces**.

Theorem 7.3.5. *Let category $\mathfrak{A}$ of $\mathfrak{F}$ -algebras have product. Then in category $T \star A^{7.8}$ where A is $\mathfrak{F}$ -algebra, there exists product of single transitive $T \star$ -representations of $\mathfrak{F}$ -algebra A .*

PROOF. Proof of theorem is similar to proof of theorem 7.3.1 with the only difference that we use diagram



$\square$

Let us consider relationship between product of single transitive $T \star$ -representations of $\mathfrak{F}$ -algebra A in category $T \star \mathcal{A}$ and product of single transitive $T \star$ -representations of $\mathfrak{F}$ -algebra A in category $T \star A$. Let for any $i \in I$ representation $\mathfrak{F}$ -of algebra A be defined on set K_i . For every $i \in I$ let us consider diagram

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} A & \xrightarrow{f_i} & A \\ g \uparrow & \nearrow id & \\ A & & \end{array}$$

^{7.8}See definition 3.2.19

where g is map of algebra A onto diagonal in $\prod_{i \in I} A$ and f_i is projection onto factor i . From diagram, it follows that maps g and f_i are injective. Therefore both products are equivalent.

7.4. Morphisms of Direct Product of $*D$ -Vector Spaces

Suppose $\overline{V}_i, i \in I, \overline{W}_j, j \in J$ are $*D$ -vector spaces. Assume

$$\begin{aligned}\overline{V} &= \prod_{i \in I} \overline{V}_i \\ \overline{W} &= \prod_{j \in J} \overline{W}_j\end{aligned}$$

$*D$ -linear map

$$(7.4.1) \quad \overline{f}: \overline{V} \longrightarrow \overline{W}$$

holds linear operations. Since we defined operations in module $\overline{W}$ componentwise, we can represent map $\overline{f}$ as

$$\overline{f} = (\overline{f}_j : \overline{V} \longrightarrow \overline{W}_j, j \in J)$$

Let

$$\overline{I}_i : \overline{V}_i \longrightarrow \overline{V} \quad i \in I$$

be injection $\overline{V}_i$ into $\overline{V}$. Then for any vector $\overline{v} = (\overline{v}_i, i \in I)$ we get

$$\overline{f}_j(\overline{v}) = \sum_{i \in I} \overline{f}_j * \overline{I}_i * \overline{v}_i$$

Therefore, we can represent the mapping (7.4.1) as matrix of $*D$ -linear maps

$$\overline{f} = (\overline{f}_{ij} = \overline{f}_j * \overline{I}_i : \overline{V}_i \longrightarrow \overline{W}_j, i \in I, j \in J)$$

Geometry of Division Ring

8.1. Center of Division Ring

Definition 8.1.1. Let D be a ring.^{8.1} The set $Z(D)$ of elements $a \in D$ such that
(8.1.1) $ax = xa$

for all $x \in D$, is called **center of ring** D . □

Theorem 8.1.2. The center $Z(D)$ of ring D is subring of ring D .

PROOF. The statement follows immediately from definition 8.1.1. □

Theorem 8.1.3. The center $Z(D)$ of division ring D is subfield of division ring D .

PROOF. According to theorem 8.1.2 it is enough to verify that $a^{-1} \in Z(D)$ if $a \in Z(D)$. Let $a \in Z(D)$. Repeatedly using the equation (8.1.1) we get chain of equations

$$(8.1.2) \quad aa^{-1}x = x = xaa^{-1} = axa^{-1}$$

From (8.1.2) it follows

$$a^{-1}x = xa^{-1}$$

Therefore, $a^{-1} \in Z(D)$. □

Definition 8.1.4. Let D be a ring with unit element e .^{8.2} The map

$$l : Z \rightarrow D$$

such that $l(n) = ne$ is a homomorphism of rings, and its kernel is an ideal (n) , generated by integer $n \geq 0$. We have canonical injective homomorphism

$$Z/nZ \rightarrow D$$

which is an isomorphism between Z/nZ and subring of D . If nZ is prime ideal, then we have two cases.

- $n = 0$. D contains as subring a ring which is isomorphic to Z , and which is often identified with Z . In that case, we say that D has **characteristic** 0.
- $n = p$ for some prime number p . D has **characteristic** p , and D contains an isomorphic image of $F_p = Z/pZ$.

□

Theorem 8.1.5. Let D be ring of characteristic 0 and let $d \in D$. Then every integer $n \in Z$ commutes with d .

^{8.1}[1], page 89.

^{8.2}I made definition according to definition from [1], pages 89, 90.

PROOF. We prove statement by induction. The statement is evident for $n = 0$ and $n = 1$. Let statement be true for $n = k$. From chain of equation

$$(k + 1)d = kd + d = dk + d = d(k + 1)$$

evidence of statement for $n = k + 1$ follows. $\square$

Theorem 8.1.6. *Let D be ring of characteristic 0. Then ring of integers Z is subring of center $Z(D)$ of ring D .*

PROOF. Corollary of theorem 8.1.5. $\square$

Let D be division ring. If D has characteristic 0, D contains as subfield an isomorphic image of the field Q of rational numbers. If D has characteristic p , D contains as subfield an isomorphic image of F_p . In either case, this subfield will be called the prime field. Since the prime field is the smallest subfield of D containing 1 and has no automorphism except identity, it is customary to identify it with Q or F_p as the case may be.

Theorem 8.1.7. *Let D be division ring of characteristic 0 and let $d \in D$. Then for any integer $n \in Z$*

$$(8.1.3) \quad n^{-1}d = dn^{-1}$$

PROOF. According to theorem 8.1.5 following chain of equation is true

$$(8.1.4) \quad n^{-1}dn = nn^{-1}d = d$$

Let us multiply right and left sides of equation (8.1.4) by n^{-1} . We get

$$(8.1.5) \quad n^{-1}d = n^{-1}dnn^{-1} = dn^{-1}$$

(8.1.3) follows from (8.1.5). $\square$

Theorem 8.1.8. *Let D be division ring of characteristic 0 and let $d \in D$. Then every rational number $p \in Q$ commutes with d .*

PROOF. Let us represent rational number $p \in Q$ as $p = mn^{-1}$, $m, n \in Z$. Statement of theorem follows from chain of equations

$$pd = mn^{-1}d = n^{-1}dm = dmn^{-1} = dp$$

based on the statement of theorem 8.1.5 and equation (8.1.3). $\square$

Theorem 8.1.9. *Let D be division ring of characteristic 0. Then field of rational numbers Q is subfield of center $Z(D)$ of division ring D .*

PROOF. Corollary of theorem 8.1.8. $\square$

8.2. Geometry of Division Ring over Field

We may consider division ring D as vector space over field $F \subset Z(D)$. We will use following conventions.

- (1) We do not use standard notation for vector when we consider element of division ring D considering it as vector over field F . However we will use another collar for index for notation of coordinates of element of division ring D as vector over field F .
- (2) Because F is field, we can write all indexes on right side of root letter.

Let $\bar{e}$ be basis of division ring D over field F . Then we may present any element $a \in D$ as

$$(8.2.1) \quad a = \bar{e}_i a^i \quad a^i \in F$$

When dimension of division ring D over field F infinite, then basis may be either countable, or its power is not less than power of continuum. If basis is countable, then we put constraints on coefficients a^i of expansion (8.2.1). If power of the set I is continuum, then we assume that there is measure on the set I and sum in expansion (8.2.1) is integral over this measure.

Remark 8.2.1. Since we defined product in the division ring D , we consider the division ring as algebra over field $F \subset Z(D)$. For elements of basis we assume

$$(8.2.2) \quad \bar{e}_i \bar{e}_j = \bar{e}_k B_{ij}^k$$

Coefficients B_{ij}^k of expansion (8.2.2) are called **structural constants of division ring D over field F** .

From equations (8.2.1), (8.2.2), it follows

$$(8.2.3) \quad ab = \bar{e}_k B_{ij}^k a^i b^j$$

From equation (8.2.3) it follows that

$$(8.2.4) \quad (ab)c = \bar{e}_k B_{ij}^k (ab)^i c^j = \bar{e}_k B_{ij}^k B_{mn}^i a^m b^n c^j$$

$$(8.2.5) \quad a(bc) = \bar{e}_k B_{ij}^k a^i (bc)^j = \bar{e}_k B_{ij}^k a^i B_{mn}^j b^m c^n$$

From associativity of product

$$(ab)c = a(bc)$$

and equations (8.2.4) and (8.2.5) it follows that

$$(8.2.6) \quad \bar{e}_k B_{ij}^k B_{mn}^i a^m b^n c^j = \bar{e}_k B_{ij}^k a^i B_{mn}^j b^m c^n$$

Because vectors a, b, c are arbitrary, and vectors $\bar{e}_k$ are linear independent, then from equation (8.2.6) it follows that

$$(8.2.7) \quad B_{jn}^k B_{im}^j = B_{ij}^k B_{mn}^j$$

Theorem 8.2.2. *Coordinates a^j of vector a are tensor*

$$(8.2.8) \quad a^j = A_i^j a'^i$$

PROOF. Let $\bar{e}'$ be another basis. Let

$$(8.2.9) \quad \bar{e}'_i = \bar{e}_j A_i^j$$

be transformation, mapping basis $\bar{e}$ into basis $\bar{e}'$. Because vector a does not change, then

$$(8.2.10) \quad a = \bar{e}'_i a'^i = \bar{e}_j a^j$$

From equations (8.2.9) and (8.2.10) it follows that

$$(8.2.11) \quad \bar{e}_j a^j = \bar{e}'_i a'^i = \bar{e}_j A_i^j a'^i$$

Because vectors $\bar{e}_j$ are linear independent, then equation (8.2.8) follows from equation (8.2.11). Therefore, coordinates of vector are tensor. $\square$

Theorem 8.2.3. *Structural constants of division ring D over field F are tensor*

$$(8.2.12) \quad A_k^l B_{ij}^k A^{-1 \cdot i} A^{-1 \cdot j} = B_{nm}^l$$

PROOF. Let us consider similarly the transformation of product. Equation (8.2.3) has form

$$(8.2.13) \quad ab = \bar{e}'_k B'^k_{ij} a'^i b'^j$$

relative to basis $\bar{e}'$. Let us substitute (8.2.8) and (8.2.9) into (8.2.13). We get

$$(8.2.14) \quad ab = \bar{e}_l A^l_k B'^k_{ij} a^n A^{-1 \cdot i}_{n} b^m A^{-1 \cdot j}_{m}$$

From (8.2.3) and (8.2.14) it follows that

$$(8.2.15) \quad \bar{e}_l A^l_k B'^k_{ij} A^{-1 \cdot i}_{n} a^n A^{-1 \cdot j}_{m} b^m = \bar{e}_l B^l_{nm} a^n b^m$$

Because vectors a and b are arbitrary, and vectors $\bar{e}_l$ are linear independent, then equation (8.2.12) follows from equation (8.2.15). Therefore, structural constants are tensor. $\square$

CHAPTER 9

Linear Map of Division Ring

9.1. Linear Map of Division Ring

According to the remark 8.2.1, we consider division ring D as algebra over field $F \subset Z(D)$.

Definition 9.1.1. Let D_1, D_2 be division rings. Let F be field such that $F \subset Z(D_1), F \subset Z(D_2)$. Linear mapping

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

of F -vector space D_1 into F -vector space D_2 is called **linear mapping of division ring D_1 into division ring D_2** . $\square$

According to definition 9.1.1, linear map f of division ring D_1 into division ring D_2 holds

$$\begin{aligned} f(a+b) &= f(a) + f(b) & a, b \in D \\ f(pa) &= pf(a) & p \in F \end{aligned}$$

Theorem 9.1.2. *Let map*

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

is linear mapping of division ring D_1 of characteristic 0 into division ring D_2 of characteristic 0. Then^{9.1}

$$f(nx) = nf(x)$$

for any integer n .

PROOF. We prove the theorem by induction on n . Statement is obvious for $n = 1$ because

$$f(1x) = f(x) = 1f(x)$$

Let statement is true for $n = k$. Then

$$f((k+1)x) = f(kx+x) = f(kx) + f(x) = kf(x) + f(x) = (k+1)f(x)$$

$\square$

Theorem 9.1.3. *Let map*

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

^{9.1}Let

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

be a linear mapping of division ring D_1 of characteristic 2 into division ring D_2 of characteristic 3. Then for any $a \in D_1$, $2a = 0$, although $2f(a) \neq 0$. Therefore, if we assume that characteristic of division ring D_1 is greater than 0, then must demand that characteristic of division ring D_1 equal to characteristic of division ring D_2 .

is linear mapping of division ring D_1 of characteristic 0 into division ring D_2 of characteristic 0. Then

$$f(ax) = af(x)$$

for any rational a .

PROOF. Let $a = \frac{p}{q}$. Assume $y = \frac{1}{q}x$. Then according to the theorem 9.1.2

$$(9.1.1) \quad f(x) = f(qy) = qf(y) = qf\left(\frac{1}{q}x\right)$$

From equation (9.1.1) it follows

$$(9.1.2) \quad \frac{1}{q}f(x) = f\left(\frac{1}{q}x\right)$$

From equation (9.1.2) it follows

$$f\left(\frac{p}{q}x\right) = pf\left(\frac{1}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x)$$

□

We cannot extend the statement of theorem 9.1.3 for arbitrary subfield of center $Z(D)$ of division ring D .

Theorem 9.1.4. *Let division ring D is algebra over field $F \subset Z(D)$. If $F \neq Z(D)$, then there exists linear mapping*

$$f : D \rightarrow D$$

which is not linear over field $Z(D)$.

PROOF. To prove the theorem it is enough to consider the complex field C because $C = Z(C)$. Because the complex field is algebra over real field, than the function

$$z \rightarrow \bar{z}$$

is linear. However the equation

$$\overline{az} = a\bar{z}$$

is not true.

□

Based on theorem 9.1.4, the question arises. Why do we consider linear mappings over field $F \neq Z(D)$, if this leads us to sharp expansion of the set of linear mappings? The answer to this question is a rich experience of the theory of complex function.

Theorem 9.1.5. *Let mappings*

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

$$g : D_1 \rightarrow D_2$$

be linear mappings of division ring D_1 into division ring D_2 . Then mapping $f + g$ is linear.

PROOF. Statement of theorem follows from chain of equations

$$\begin{aligned}
 (f + g)(x + y) &= f(x + y) + g(x + y) = f(x) + f(y) + g(x) + g(y) \\
 &= (f + g)(x) + (f + g)(y) \\
 (f + g)(px) &= f(px) + g(px) = pf(x) + pg(x) = p(f(x) + g(x)) \\
 &= p(f + g)(x)
 \end{aligned}$$

□

Theorem 9.1.6. *Let map*

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

be linear mapping of division ring D_1 into division ring D_2 . Then mappings af , fb , a , $b \in R_2$ are linear.

PROOF. Statement of theorem follows from chain of equations

$$\begin{aligned}
 (af)(x + y) &= a(f(x + y)) = a(f(x) + f(y)) = af(x) + af(y) \\
 &= (af)(x) + (af)(y) \\
 (af)(px) &= a(f(px)) = a(pf(x)) = p(af(x)) \\
 &= p(af)(x) \\
 (fb)(x + y) &= (f(x + y))b = (f(x) + f(y))b = f(x)b + f(y)b \\
 &= (fb)(x) + (fb)(y) \\
 (fb)(px) &= (f(px))b = (pf(x))b = p(f(x)b) \\
 &= p(fb)(x)
 \end{aligned}$$

□

Definition 9.1.7. Denote $\mathcal{L}(D_1; D_2)$ set of linear mappings

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

of division ring D_1 into division ring D_2 .

□

Theorem 9.1.8. *We may represent linear mapping*

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

of division ring D_1 into division ring D_2 as

$$(9.1.3) \quad f(x) = f_{k \cdot s_k \cdot 0} G_k(x) f_{k \cdot s_k \cdot 1}$$

where $(G_k, k \in K)$ is set of additive maps of division ring D_1 into division ring D_2 .^{9.2} Expression $f_{k \cdot s_k \cdot p}$, $p = 0, 1$, in equation (9.1.3) is called **component of linear map f** .

PROOF. The statement of theorem follows from theorems 9.1.5 and 9.1.6. □

If in the theorem 9.1.8 $|K| = 1$, then the equation (9.1.3) has form

$$(9.1.4) \quad f(x) = f_{s \cdot 0} G(x) f_{s \cdot 1}$$

and mapping f is called **linear mapping generated by mapping G** . Map G is called **generator of linear mapping**.

^{9.2}Here and in the following text we assume sum over index that is used in product few times. Equation (9.1.3) is recursive definition and there is hope that it is possible to simplify it.

Theorem 9.1.9. Let D_1, D_2 be division rings of characteristic 0. Let $F, F \subset Z(D_1), F \subset Z(D_2)$, be field. Let G be F -linear map. Let $\bar{e}$ be basis of division ring D_2 over field F . **Standard F -representation of linear mapping (9.1.4)** has form^{9.3}

$$(9.1.5) \quad f(x) = f_G^{ij} \bar{e}_i G(x) \bar{e}_j$$

Expression f_G^{ij} in equation (9.1.5) is called **standard F -component of linear map f** .

PROOF. Components of additive map f have expansion

$$(9.1.6) \quad f_{s,p} = f_{s,p}^i \bar{e}_i$$

relative to basis $\bar{e}$. If we substitute (9.1.6) into (9.1.4), we get

$$(9.1.7) \quad f(x) = f_{s,0}^i \bar{e}_i G(x) f_{s,1}^j \bar{e}_j$$

If we substitute expression

$$f_G^{ij} = f_{s,0}^i f_{s,1}^j$$

into equation (9.1.7) we get equation (9.1.5). $\square$

Theorem 9.1.10. Let D_1, D_2 be division rings of characteristic 0. Let $F, F \subset Z(D_1), F \subset Z(D_2)$, be field. Let G be F -linear map. Let $\bar{e}_1$ be basis of division ring D_1 over field F . Let $\bar{e}_2$ be basis of division ring D_2 over field F . Let B_{kl}^p be structural constants of division ring D_2 . Then it is possible to represent linear mapping (9.1.4) generated by F -linear map G as

$$(9.1.8) \quad \begin{aligned} f(a) &= \bar{e}_{2,j} f_i^j a^i & f_k^j &\in F \\ a &= \bar{e}_{1,i} a^i & a^i &\in F \quad a \in D_1 \end{aligned}$$

$$(9.1.9) \quad f_i^j = G_i^l f_G^{kr} B_{kl}^p B_{1,pr}^j$$

PROOF. Let us consider map

$$(9.1.10) \quad \begin{aligned} G : D_1 \rightarrow D_2 \quad a = \bar{e}_{1,i} a^i &\rightarrow G(a) = \bar{e}_{2,j} G_i^j a^i \\ x^i &\in F \quad G_i^j \in F \end{aligned}$$

According to theorem 4.4.3 linear mapping $f(a)$ relative to bases $\bar{e}_1$ and $\bar{e}_2$ has form (9.1.8). From equations (9.1.5) and (9.1.10) it follows

$$(9.1.11) \quad f(a) = G_i^l a^i f_G^{kj} \bar{e}_{2,k} \bar{e}_{2,l} \bar{e}_{2,j}$$

From equations (9.1.8) and (9.1.11) it follows

$$(9.1.12) \quad \bar{e}_{2,j} f_i^j a^i = G_i^l a^i f_G^{kr} \bar{e}_{2,k} \bar{e}_{2,l} \bar{e}_{2,r} = G_i^l a^i f_G^{kr} B_{kl}^p B_{2,pr}^j \bar{e}_{2,j}$$

Since vectors $\bar{e}_{2,r}$ are linear independent over field F and values a^k are arbitrary, then equation (9.1.9) follows from equation (9.1.12). $\square$

Considering mapping

$$(9.1.13) \quad f : D \rightarrow D$$

we assume $G(x) = x$.

^{9.3}Representation of linear mapping of of division ring using components of linear map is ambiguous. We can increase or decrease number of summands using algebraic operations. Since dimension of division ring D_2 over field F is finite, standard representation of linear map guarantees finiteness of set of items in the representation of map.

Theorem 9.1.11. *Let D be division ring of characteristic 0. Linear map (9.1.13) has form*

$$(9.1.14) \quad f(x) = f_{s \cdot 0} x f_{s \cdot 1}$$

Theorem 9.1.12. *Let D be division ring of characteristic 0. Let $\bar{e}$ be the basis of division ring D over center $Z(D)$. Standard representation of linear map (9.1.14) of division ring has form*

$$(9.1.15) \quad f(x) = f^{ij} \bar{e}_i x \bar{e}_j$$

Theorem 9.1.13. *Let D be division ring of characteristic 0. Let $\bar{e}$ be basis of division ring D over field $Z(D)$. Then it is possible to represent linear map (9.1.13) as*

$$(9.1.16) \quad \begin{aligned} f(a) &= \bar{e}_j f_i^j a^i & f_k^j &\in Z(D) \\ a &= \bar{e}_i a^i & a^i &\in F \quad a \in D \end{aligned}$$

$$(9.1.17) \quad f_i^j = f^{kr} B_{ki}^p B_{pr}^j$$

Theorem 9.1.14. *Consider matrix*

$$(9.1.18) \quad \mathcal{B} = (\mathcal{B}_{i \cdot kr}^j) = (B_{ki}^p B_{pr}^j)$$

whose rows and columns are indexed by $\cdot \bar{e}_i^j$ and $\bar{e}_i \cdot$, respectively. If $\det \mathcal{B} \neq 0$, then, for given coordinates of linear transformation f_i^j , the system of linear equations (9.1.17) with standard components of this transformation f^{kr} has the unique solution. If $\det \mathcal{B} = 0$, then the equation

$$(9.1.19) \quad \text{rank} \begin{pmatrix} \mathcal{B}_{i \cdot kr}^j & f_i^j \end{pmatrix} = \text{rank } \mathcal{B}$$

is the condition for the existence of solutions of the system of linear equations (9.1.17). In such case the system of linear equations (9.1.17) has infinitely many solutions and there exists linear dependence between values f_i^j .

PROOF. Equation (9.1.14) is special case of equation (9.1.4) when $G(x) = x$. Theorem 9.1.12 is special case of theorem 9.1.9 when $G(x) = x$. Theorem 9.1.13 is special case of theorem 9.1.10 when $G(x) = x$. The statement of the theorem 9.1.14 is corollary of the theory of linear equations over field. $\square$

Theorem 9.1.15. *Standard components of the identity mapping have the form*

$$(9.1.20) \quad f^{kr} = \delta_0^k \delta_0^r$$

PROOF. The equation (9.1.20) is corollary of the equation

$$x = \bar{e}_0 x \bar{e}_0$$

Let us show that the standard components (9.1.20) of a linear transformation satisfy to the equation

$$(9.1.21) \quad \delta_i^j = f^{kr} B_{ki}^p B_{pr}^j$$

which follows from the equation (9.1.17) if $f = \delta$. From equations (9.1.20), (9.1.21), it follows that

$$(9.1.22) \quad \delta_i^j = B_{0i}^p B_{p0}^j$$

The equation (9.1.22) is true, because, from equations

$$\bar{e}_j \bar{e}_0 = \bar{e}_0 \bar{e}_j = \bar{e}_j$$

it follows that

$$B_{0r}^j = \delta_r^j \quad B_{r0}^j = \delta_r^j$$

If $\det \mathcal{B} \neq 0$, then the solution (9.1.20) is unique. If $\det \mathcal{B} = 0$, then the system of linear equations (9.1.21) has infinitely many solutions. However, we are looking for at least one solution. $\square$

Theorem 9.1.16. *If $\det \mathcal{B} \neq 0$, then standard components of the zero mapping*

$$z : A \rightarrow A \quad z(x) = 0$$

are defined uniquely and have form $z^{ij} = 0$. If $\det \mathcal{B} = 0$, then the set of standard components of the zero mapping forms a vector space.

PROOF. The theorem is true because standard components z^{ij} are solution of homogeneous system of linear equations

$$0 = z^{kr} B_{ki}^p B_{pr}^j$$

$\square$

Remark 9.1.17. Consider equation

$$(9.1.23) \quad a^{kr} \bar{e}_k x \bar{e}_r = b^{kr} \bar{e}_k x \bar{e}_r$$

From the theorem 9.1.16, it follows that only when condition $\det \mathcal{B} \neq 0$ is true, from the equation (9.1.23), it follows that

$$(9.1.24) \quad a^{kr} = b^{kr}$$

Otherwise, we must assume equality

$$(9.1.25) \quad a^{kr} = b^{kr} + z^{kr}$$

Despite this, in case $\det \mathcal{B} = 0$, we also use standard representation because in general it is very hard to show the set of linear independent vectors. If we want to define operation over linear mappings in standard representation, then as well as in the case of the theorem 9.1.15 we choose one element from the set of possible representations. $\square$

Theorem 9.1.18. *Expression*

$$f_k^r = f^{ij} B_{ik}^p B_{pj}^r$$

is tensor over field F

$$(9.1.26) \quad {}_i f'^j = {}_i A^k {}_k f^l {}_l A^{-1j}$$

PROOF. D -linear map has form (9.1.16) relative to basis $\bar{e}$. Let $\bar{e}'$ be another basis. Let

$$(9.1.27) \quad \bar{e}'_i = \bar{e}_j A_i^j$$

be transformation mapping basis $\bar{e}$ to basis $\bar{e}'$. Since linear map f is the same, then

$$(9.1.28) \quad f(x) = \bar{e}'_i f'^l {}^l_k x'^k$$

Let us substitute (8.2.8), (9.1.27) into equation (9.1.28)

$$(9.1.29) \quad f(x) = \bar{e}_j A_l^j f'^l {}^l_k A^{-1 \cdot k} {}^i_i x'^i$$

Because vectors $\bar{e}_j$ are linear independent and components of vector x^i are arbitrary, the equation (9.1.26) follows from equation (9.1.29). Therefore, expression f_k^r is tensor over field F . $\square$

Definition 9.1.19. The set

$$\ker f = \{x \in D_1 : f(x) = 0\}$$

is called **kernel of linear mapping**

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

of division ring D_1 into division ring D_2 . $\square$

Theorem 9.1.20. *Kernel of linear mapping*

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

is subgroup of additive group of division ring D_1 .

PROOF. Let $a, b \in \ker f$. Then

$$f(a) = 0$$

$$f(b) = 0$$

$$f(a + b) = f(a) + f(b) = 0$$

Therefore, $a + b \in \ker f$. $\square$

Definition 9.1.21. The linear mapping

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

of division ring D_1 into division ring D_2 is called **singular**, when

$$\ker f \neq \{0\}$$

$\square$

Theorem 9.1.22. *Let D be division ring of characteristic 0. Let $\bar{e}$ be basis of division ring D over center $Z(D)$ of division ring D . Let*

$$(9.1.30) \quad f : D \rightarrow D \quad f(x) = f_{s,0} x f_{s,1}$$

$$(9.1.31) \quad = f^{ij} \bar{e}_i x \bar{e}_j$$

$$(9.1.32) \quad g : D \rightarrow D \quad g(x) = g_{t,0} x g_{t,1}$$

$$(9.1.33) \quad = g^{ij} \bar{e}_i x \bar{e}_j$$

be linear mappings of division ring D . Map

$$(9.1.34) \quad h(x) = gf(x) = g(f(x))$$

is linear map

$$(9.1.35) \quad h(x) = h_{ts,0} x h_{ts,1}$$

$$(9.1.36) \quad = h^{pr} \bar{e}_p x \bar{e}_r$$

where

$$(9.1.37) \quad h_{ts,0} = g_{t,0} f_{s,0}$$

$$(9.1.38) \quad h_{ts,1} = f_{s,1} g_{t,1}$$

$$(9.1.39) \quad h^{pr} = g^{ij} f^{kl} B_{ik}^p B_{lj}^r$$

PROOF. Map (9.1.34) is linear because

$$h(x + y) = g(f(x + y)) = g(f(x) + f(y)) = g(f(x)) + g(f(y)) = h(x) + h(y)$$

$$h(ax) = g(f(ax)) = g(af(x)) = ag(f(x)) = ah(x)$$

If we substitute (9.1.30) and (9.1.32) into (9.1.34), we get

$$(9.1.40) \quad h(x) = g_{t \cdot 0} f(x) g_{t \cdot 1} = g_{t \cdot 0} f_{s \cdot 0} x f_{s \cdot 1} g_{t \cdot 1}$$

Comparing (9.1.40) and (9.1.35), we get (9.1.37), (9.1.38).

If we substitute (9.1.31) and (9.1.33) into (9.1.34), we get

$$(9.1.41) \quad \begin{aligned} h(x) &= g^{ij} \bar{e}_i f(x) \bar{e}_j \\ &= g^{ij} \bar{e}_i f^{kl} \bar{e}_k x \bar{e}_l \bar{e}_j \\ &= g^{ij} f^{kl} B_{ik}^p B_{lj}^r \bar{e}_p x \bar{e}_r \end{aligned}$$

Comparing (9.1.41) and (9.1.36), we get (9.1.39). $\square$

9.2. Polylinear Map of Division Ring

Definition 9.2.1. Let $R_1, \dots, R_n, P$ be rings of characteristic 0. Let S be module over ring P . Let F be commutative ring which is for any i is subring of center of ring R_i . Mapping

$$f : R_1 \times \dots \times R_n \rightarrow S$$

is called **polylinear over commutative ring F** , if

$$\begin{aligned} f(p_1, \dots, p_i + q_i, \dots, p_n) &= f(p_1, \dots, p_i, \dots, p_n) + f(p_1, \dots, q_i, \dots, p_n) \\ f(a_1, \dots, ba_i, \dots, a_n) &= bf(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) \end{aligned}$$

for any $i, 1 \leq i \leq n$, and any $p_i, q_i \in R_i, b \in F$. Let us denote $\mathcal{L}(R_1, \dots, R_n; S)$ set of polylinear mappings of rings $R_1, \dots, R_n$ into module S . $\square$

Theorem 9.2.2. Let D be division ring of characteristic 0. Polylinear map

$$(9.2.1) \quad f : D^n \rightarrow D, d = f(d_1, \dots, d_n)$$

has form

$$(9.2.2) \quad d = f_{s \cdot 0}^n \sigma_s(d_1) f_{s \cdot 1}^n \dots \sigma_s(d_n) f_{s \cdot n}^n$$

σ_s is a transposition of set of variables $\{d_1, \dots, d_n\}$

$$\sigma_s = \begin{pmatrix} d_1 & \dots & d_n \\ \sigma_s(d_1) & \dots & \sigma_s(d_n) \end{pmatrix}$$

PROOF. We prove statement by induction on n .

When $n = 1$ the statement of theorem is corollary of theorem 9.1.11. In such case we may identify^{9.4}

$$f_{s \cdot p}^1 = f_{s \cdot p} \quad p = 0, 1$$

^{9.4}In representation (9.2.2) we will use following rules.

- If range of any index is set consisting of one element, then we will omit corresponding index.
- If $n = 1$, then σ_s is identical transformation. We will not show such transformation in the expression.

Let statement of theorem be true for $n = k - 1$. Then it is possible to represent mapping (9.2.1) as

$$\begin{array}{ccc} D^k & \xrightarrow{f} & D \\ & \searrow g(d_k) & \uparrow h \\ & & D^{k-1} \end{array}$$

$$d = f(d_1, \dots, d_k) = g(d_k)(d_1, \dots, d_{k-1})$$

According to statement of induction pollinear mapping h has form

$$d = h_{t,0}^{k-1} \sigma_t(d_1) h_{t,1}^{k-1} \dots \sigma_t(d_{k-1}) h_{t,k-1}^{k-1}$$

According to construction $h = g(d_k)$. Therefore, expressions $h_{t,p}$ are functions of d_k . Since $g(d_k)$ is linear mapping of d_k , then only one expression $h_{t,p}$ is linear mapping of d_k , and rest expressions $h_{t,q}$ do not depend on d_k .

Without loss of generality, assume $p = 0$. According to equation (9.1.14) for given t

$$h_{t,0}^{k-1} = g_{tr,0} d_k g_{tr,1}$$

Assume $s = tr$. Let us define transposition σ_s according to rule

$$\sigma_s = \sigma_{tr} = \begin{pmatrix} d_k & d_1 & \dots & d_{k-1} \\ d_k & \sigma_t(d_1) & \dots & \sigma_t(d_{k-1}) \end{pmatrix}$$

Suppose

$$\begin{aligned} f_{tr,q+1}^k &= h_{t,q}^{k-1} & q = 1, \dots, k-1 \\ f_{tr,q}^k &= g_{tr,q} & q = 0, 1 \end{aligned}$$

We proved step of induction. $\square$

Definition 9.2.3. Expression $_{s,p}f^n$ in equation (9.2.2) is called **component of polylinear map** f . $\square$

Theorem 9.2.4. Let D be division ring of characteristic 0. Let $\bar{e}$ be basis in division ring D over field $F \subset Z(D)$. **Standard representation of polylinear map of division ring** has form

$$(9.2.3) \quad f(d_1, \dots, d_n) = f_t^{i_0 \dots i_n} \bar{e}_{i_0} \sigma_t(d_1) \bar{e}_{i_1} \dots \sigma_t(d_n) \bar{e}_{i_n}$$

Index t enumerates every possible transpositions σ_t of the set of variables $\{d_1, \dots, d_n\}$. Expression $f_t^{i_0 \dots i_n}$ in equation (9.2.3) is called **standard component of polylinear map** f .

PROOF. Components of polylinear map f have expansion

$$(9.2.4) \quad f_{s,p}^n = \bar{e}_i f_{s,p}^{n,i}$$

relative to basis $\bar{e}$. If we substitute (9.2.4) into (9.2.2), we get

$$(9.2.5) \quad d = f_{s,0}^{n,j_1} \bar{e}_{j_1} \sigma_s(d_1) f_{s,1}^{n,j_2} \bar{e}_{j_2} \dots \sigma_s(d_n) f_{s,n}^{n,j_n} \bar{e}_{j_n}$$

Let us consider expression

$$(9.2.6) \quad f_t^{j_0 \dots j_n} = f_{s,0}^{n,j_1} \dots f_{s,n}^{n,j_n}$$

The right-hand side is supposed to be the sum of the terms with the index s , for which the transposition σ_s is the same. Each such sum has a unique index t . If we substitute expression (9.2.6) into equation (9.2.5) we get equation (9.2.3). $\square$

Theorem 9.2.5. *Let $\bar{e}$ be basis of division ring D over field $F \subset Z(D)$. Polylinear map (9.2.1) can be represented as D -valued form of degree n over field $F \subset Z(D)$ ^{9.5}*

$$(9.2.7) \quad f(a_1, \dots, a_n) = a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} f_{i_1 \dots i_n}$$

where

$$(9.2.8) \quad \begin{aligned} a_j &= \bar{e}_i a_j^i \\ f_{i_1 \dots i_n} &= f(\bar{e}_{i_1}, \dots, \bar{e}_{i_n}) \end{aligned}$$

and values $f_{i_1 \dots i_n}$ are coordinates of D -valued covariant tensor over field F .

PROOF. According to the definition 9.2.1, the equation (9.2.7) follows from the chain of equations

$$f(a_1, \dots, a_n) = f(\bar{e}_{i_1} a_1^{i_1}, \dots, \bar{e}_{i_n} a_n^{i_n}) = a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} f(\bar{e}_{i_1}, \dots, \bar{e}_{i_n})$$

Let $\bar{e}'$ be another basis. Let

$$(9.2.9) \quad \bar{e}'_i = \bar{e}_j A_i^j$$

be transformation, mapping basis $\bar{e}$ into basis $\bar{e}'$. From equations (9.2.9) and (9.2.8) it follows

$$(9.2.10) \quad \begin{aligned} f'_{i_1 \dots i_n} &= f(\bar{e}'_{i_1}, \dots, \bar{e}'_{i_n}) \\ &= f(\bar{e}_{j_1} A_{i_1}^{j_1}, \dots, \bar{e}_{j_n} A_{i_n}^{j_n}) \\ &= A_{i_1}^{j_1} \dots A_{i_n}^{j_n} f(\bar{e}_{j_1}, \dots, \bar{e}_{j_n}) \\ &= A_{i_1}^{j_1} \dots A_{i_n}^{j_n} f_{j_1 \dots j_n} \end{aligned}$$

From equation (9.2.10) the tensor law of transformation of coordinates of polylinear map follows. From equation (9.2.10) and theorem 8.2.2 it follows that value of the map $f(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$ does not depend from choice of basis. $\square$

Polylinear map (9.2.1) is **symmetric**, if

$$f(d_1, \dots, d_n) = f(\sigma(d_1), \dots, \sigma(d_n))$$

for any transposition σ of set $\{d_1, \dots, d_n\}$.

Theorem 9.2.6. *If polyadditive map f is symmetric, then*

$$(9.2.11) \quad f_{i_1, \dots, i_n} = f_{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_n)}$$

PROOF. Equation (9.2.11) follows from equation

$$\begin{aligned} a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} f_{i_1 \dots i_n} &= f(a_1, \dots, a_n) \\ &= f(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)) \\ &= a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} f_{\sigma(i_1) \dots \sigma(i_n)} \end{aligned}$$

$\square$

^{9.5}We proved the theorem by analogy with theorem in [3], p. 107, 108

Polylinear map (9.2.1) is **skew symmetric**, if

$$f(d_1, \dots, d_n) = |\sigma| f(\sigma(d_1), \dots, \sigma(d_n))$$

for any transposition σ of set $\{d_1, \dots, d_n\}$. Here

$$|\sigma| = \begin{cases} 1 & \text{transposition } \sigma \text{ even} \\ -1 & \text{transposition } \sigma \text{ odd} \end{cases}$$

Theorem 9.2.7. *If polylinear map f is skew symmetric, then*

$$(9.2.12) \quad f_{i_1, \dots, i_n} = |\sigma| f_{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_n)}$$

PROOF. Equation (9.2.12) follows from equation

$$\begin{aligned} a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} f_{i_1, \dots, i_n} &= f(a_1, \dots, a_n) \\ &= |\sigma| f(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)) \\ &= a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} |\sigma| f_{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_n)} \end{aligned}$$

□

Theorem 9.2.8. *Coordinates of the polylinear over field F mapping (9.2.1) and its components relative basis $\bar{e}$ satisfy to the equation*

$$(9.2.13) \quad f_{j_1 \dots j_n} = f_t^{i_0 \dots i_n} B_{i_0 \sigma_t(j_1)}^{k_1} B_{k_1 i_1}^{l_1} \dots B_{l_{n-1} \sigma_t(j_n)}^{k_n} B_{k_n i_n}^{l_n} \bar{e}_{l_n}$$

$$(9.2.14) \quad f_{j_1 \dots j_n}^p = f_t^{i_0 \dots i_n} B_{i_0 \sigma_t(j_1)}^{k_1} B_{k_1 i_1}^{l_1} \dots B_{l_{n-1} \sigma_t(j_n)}^{k_n} B_{k_n i_n}^{l_n} \bar{e}_{l_n}^p$$

PROOF. In equation (9.2.3), we assume

$$d_i = \bar{e}_{j_i} d_i^{j_i}$$

Then equation (9.2.3) gets form

$$\begin{aligned} f(d_1, \dots, d_n) &= f_t^{i_0 \dots i_n} \bar{e}_{i_0} \sigma_t(d_1^{j_1} \bar{e}_{j_1}) \bar{e}_{i_1} \dots \sigma_t(d_n^{j_n} \bar{e}_{j_n}) \bar{e}_{i_n} \\ (9.2.15) \quad &= d_1^{j_1} \dots d_n^{j_n} f_t^{i_0 \dots i_n} \bar{e}_{i_0} \sigma_t(\bar{e}_{j_1}) \bar{e}_{i_1} \dots \sigma_t(\bar{e}_{j_n}) \bar{e}_{i_n} \\ &= d_1^{j_1} \dots d_n^{j_n} f_t^{i_0 \dots i_n} B_{i_0 \sigma_t(j_1)}^{k_1} B_{k_1 i_1}^{l_1} \\ &\quad \dots B_{l_{n-1} \sigma_t(j_n)}^{k_n} B_{k_n i_n}^{l_n} \bar{e}_{l_n} \end{aligned}$$

From equation (9.2.7) it follows that

$$(9.2.16) \quad f(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) = \bar{e}_p f_{i_1 \dots i_n}^p a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n}$$

Equation (9.2.13) follows from comparison of equations (9.2.15) and (9.2.7). Equation (9.2.14) follows from comparison of equations (9.2.15) and (9.2.16). □

Quaternion Algebra

10.1. Linear Function of Complex Field

Theorem 10.1.1 (the Cauchy-Riemann equations). *Let us consider complex field C as two-dimensional algebra over real field. Let*

$$(10.1.1) \quad \bar{e}_{C \cdot 0} = 1 \quad \bar{e}_{C \cdot 1} = i$$

be the basis of algebra C . Then in this basis product has form

$$(10.1.2) \quad \bar{e}_{C \cdot 1}^2 = -\bar{e}_{C \cdot 0}$$

and structural constants have form

$$(10.1.3) \quad \begin{aligned} B_{C \cdot 00} &= 1 & B_{C \cdot 01} &= 1 \\ B_{C \cdot 10} &= 1 & B_{C \cdot 11} &= -1 \end{aligned}$$

Matrix of linear function

$$y^i = x^j f_j^i$$

of complex field over real field satisfies relationship

$$(10.1.4) \quad f_0^0 = f_1^1$$

$$(10.1.5) \quad f_0^1 = -f_1^0$$

PROOF. Equations (10.1.2) and (10.1.3) follow from equation $i^2 = -1$. Using equation (9.1.17) we get relationships

$$(10.1.6) \quad f_0^0 = f^{kr} B_{C \cdot k0} B_{C \cdot pr} = f^{0r} B_{C \cdot 00} B_{C \cdot 0r} + f^{1r} B_{C \cdot 10} B_{C \cdot 1r} = f^{00} - f^{11}$$

$$(10.1.7) \quad f_0^1 = f^{kr} B_{C \cdot k0} B_{C \cdot pr} = f^{0r} B_{C \cdot 00} B_{C \cdot 0r} + f^{1r} B_{C \cdot 10} B_{C \cdot 1r} = f^{01} + f^{10}$$

$$(10.1.8) \quad f_1^0 = f^{kr} B_{C \cdot k1} B_{C \cdot pr} = f^{0r} B_{C \cdot 01} B_{C \cdot 0r} + f^{1r} B_{C \cdot 11} B_{C \cdot 1r} = -f^{01} - f^{10}$$

$$(10.1.9) \quad f_1^1 = f^{kr} B_{C \cdot k1} B_{C \cdot pr} = f^{0r} B_{C \cdot 01} B_{C \cdot 1r} + f^{1r} B_{C \cdot 11} B_{C \cdot 1r} = f^{00} - f^{11}$$

(10.1.4) follows from equations (10.1.6) and (10.1.9). (10.1.5) follows from equations (10.1.7) and (10.1.8). $\square$

10.2. Quaternion Algebra

In this paper I explore the set of quaternion algebras defined in [15].

Definition 10.2.1. Let F be field. Extension field $F(i, j, k)$ is called **the quaternion algebra** $E(F, a, b)$ **over the field** $F^{10.1}$ if multiplication in algebra E is defined according to rule

$$(10.2.1) \quad \begin{array}{c|ccc} & i & j & k \\ \hline i & a & k & aj \\ j & -k & b & -bi \\ k & -aj & bi & -ab \end{array}$$

where $a, b \in F$, $ab \neq 0$.

Elements of the algebra $E(F, a, b)$ have form

$$x = x^0 + x^1 i + x^2 j + x^3 k$$

where $x^i \in F$, $i = 0, 1, 2, 3$. Quaternion

$$\bar{x} = x^0 - x^1 i - x^2 j - x^3 k$$

is called conjugate to the quaternion x . We define **the norm of the quaternion** x using equation

$$(10.2.2) \quad |x|^2 = x\bar{x} = (x^0)^2 - a(x^1)^2 - b(x^2)^2 + ab(x^3)^2$$

From equation (10.2.2), it follows that $E(F, a, b)$ is algebra with division only when $a < 0$, $b < 0$. In this case we can renorm basis such that $a = -1$, $b = -1$.

We use symbol $E(F)$ to denote the quaternion division algebra $E(F, -1, -1)$ over the field F . Multiplication in algebra $E(F)$ is defined according to rule

$$(10.2.3) \quad \begin{array}{c|ccc} & i & j & k \\ \hline i & -1 & k & -j \\ j & -k & -1 & i \\ k & j & -i & -1 \end{array}$$

□

In algebra $E(F)$, the norm of the quaternion has form

$$(10.2.4) \quad |x|^2 = x\bar{x} = (x^0)^2 + (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2$$

In this case inverse element has form

$$(10.2.5) \quad x^{-1} = |x|^{-2} \bar{x}$$

We will use notation $H = E(R, -1, -1)$.

The inner automorphism of quaternion algebra $H^{10.2}$

$$(10.2.6) \quad \begin{aligned} p &\rightarrow qpq^{-1} \\ q(ix + jy + kz)q^{-1} &= ix' + jy' + kz' \end{aligned}$$

^{10.1}I follow definition from [15].

^{10.2}See [16], p.643.

describes the rotation of the vector with coordinates x, y, z . The norm of quaternion q is irrelevant, although usually we assume $|q| = 1$. If q is written as sum of scalar and vector

$$q = \cos \alpha + (ia + jb + kc) \sin \alpha \quad a^2 + b^2 + c^2 = 1$$

then (10.2.6) is a rotation of the vector (x, y, z) about the vector (a, b, c) through an angle 2α .

10.3. Linear Function of Quaternion Algebra

Theorem 10.3.1. *Let*

$$(10.3.1) \quad \bar{e}_0 = 1 \quad \bar{e}_1 = i \quad \bar{e}_2 = j \quad \bar{e}_3 = k$$

be basis of quaternion algebra H . Then in the basis (10.3.1), structural constants have form

$$\begin{aligned} B_{00}^0 &= 1 & B_{01}^1 &= 1 & B_{02}^2 &= 1 & B_{03}^3 &= 1 \\ B_{10}^1 &= 1 & B_{11}^0 &= -1 & B_{12}^3 &= 1 & B_{13}^2 &= -1 \\ B_{20}^2 &= 1 & B_{21}^3 &= -1 & B_{22}^0 &= -1 & B_{23}^1 &= 1 \\ B_{30}^3 &= 1 & B_{31}^2 &= 1 & B_{32}^1 &= -1 & B_{33}^0 &= -1 \end{aligned}$$

PROOF. Value of structural constants follows from multiplication table (10.2.3). $\square$

Since calculations in this section get a lot of space, I put in one place references to theorems in this section.

Theorem 10.3.2: the definition of coordinates of linear mapping of quaternion algebra H using standard components of this mapping.

Equation (10.3.22): matrix form of dependence of coordinates of linear mapping of quaternion algebra H from standard components of this mapping.

Equation (10.3.23): matrix form of dependence of standard components of linear mapping of quaternion algebra H from coordinates of this mapping.

Theorem 10.3.4: dependence standard components of linear mapping of quaternion algebra H from coordinates of this mapping.

Theorem 10.3.2. *Standard components of linear function of quaternion algebra H relative to basis (10.3.1) and coordinates of corresponding linear map satisfy relationship*

$$(10.3.2) \quad \begin{cases} f_0^0 = f^{00} - f^{11} - f^{22} - f^{33} \\ f_1^1 = f^{00} - f^{11} + f^{22} + f^{33} \\ f_2^2 = f^{00} + f^{11} - f^{22} + f^{33} \\ f_3^3 = f^{00} + f^{11} + f^{22} - f^{33} \end{cases}$$

$$(10.3.3) \quad \begin{cases} f_0^1 = f^{01} + f^{10} + f^{23} - f^{32} \\ f_1^0 = -f^{01} - f^{10} + f^{23} - f^{32} \\ f_2^3 = -f^{01} + f^{10} - f^{23} - f^{32} \\ f_3^2 = f^{01} - f^{10} - f^{23} - f^{32} \end{cases}$$

$$(10.3.4) \quad \begin{cases} f_0^2 = f^{02} - f^{13} + f^{20} + f^{31} \\ f_1^3 = f^{02} - f^{13} - f^{20} - f^{31} \\ f_2^0 = -f^{02} - f^{13} - f^{20} + f^{31} \\ f_3^1 = -f^{02} - f^{13} + f^{20} - f^{31} \end{cases}$$

$$(10.3.5) \quad \begin{cases} f_0^3 = f^{03} + f^{12} - f^{21} + f^{30} \\ f_1^2 = -f^{03} - f^{12} - f^{21} + f^{30} \\ f_2^1 = f^{03} - f^{12} - f^{21} - f^{30} \\ f_3^0 = -f^{03} + f^{12} - f^{21} - f^{30} \end{cases}$$

PROOF. Using equation (9.1.17) we get relationships

$$(10.3.6) \quad \begin{aligned} f_0^0 &= f^{kr} B_{k0}^p B_{pr}^0 \\ &= f^{00} B_{00}^0 B_{00}^0 + f^{11} B_{10}^1 B_{11}^0 + f^{22} B_{20}^2 B_{22}^0 + f^{33} B_{30}^3 B_{33}^0 \\ &= f^{00} - f^{11} - f^{22} - f^{33} \end{aligned}$$

$$(10.3.7) \quad \begin{aligned} f_0^1 &= f^{kr} B_{k0}^p B_{pr}^1 \\ &= f^{01} B_{00}^0 B_{01}^1 + f^{10} B_{10}^1 B_{10}^1 + f^{23} B_{20}^2 B_{23}^1 + f^{32} B_{30}^3 B_{32}^1 \\ &= f^{01} + f^{10} + f^{23} - f^{32} \end{aligned}$$

$$(10.3.8) \quad \begin{aligned} f_0^2 &= f^{kr} B_{k0}^p B_{pr}^2 \\ &= f^{02} B_{00}^0 B_{02}^2 + f^{13} B_{10}^1 B_{13}^2 + f^{20} B_{20}^2 B_{20}^2 + f^{31} B_{30}^3 B_{31}^2 \\ &= f^{02} - f^{13} + f^{20} + f^{31} \end{aligned}$$

$$(10.3.9) \quad \begin{aligned} f_0^3 &= f^{kr} B_{k0}^p B_{pr}^3 \\ &= f^{03} B_{00}^0 B_{03}^3 + f^{12} B_{10}^1 B_{12}^3 + f^{21} B_{20}^2 B_{21}^3 + f^{30} B_{30}^3 B_{30}^3 \\ &= f^{03} + f^{12} - f^{21} + f^{30} \end{aligned}$$

$$(10.3.10) \quad \begin{aligned} f_1^0 &= f^{kr} B_{k1}^p B_{pr}^0 \\ &= f^{01} B_{01}^1 B_{11}^0 + f^{10} B_{11}^0 B_{00}^0 + f^{23} B_{21}^3 B_{33}^0 + f^{32} B_{31}^2 B_{22}^0 \\ &= -f^{01} - f^{10} + f^{23} - f^{32} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.11) \quad f_1^1 &= f^{kr} B_{k1}^p B_{pr}^1 \\
&= f^{00} B_{01}^1 B_{10}^1 + f^{11} B_{11}^0 B_{01}^1 + f^{22} B_{21}^3 B_{32}^1 + f^{33} B_{31}^2 B_{23}^1 \\
&= f^{00} - f^{11} + f^{22} + f^{33}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.12) \quad f_1^2 &= f^{kr} B_{k1}^p B_{pr}^2 \\
&= f^{03} B_{01}^1 B_{13}^2 + f^{12} B_{11}^0 B_{02}^2 + f^{21} B_{21}^3 B_{31}^2 + f^{30} B_{31}^2 B_{20}^2 \\
&= -f^{03} - f^{12} - f^{21} + f^{30}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.13) \quad f_1^3 &= f^{kr} B_{k1}^p B_{pr}^3 \\
&= f^{02} B_{01}^1 B_{12}^3 + f^{13} B_{11}^0 B_{03}^3 + f^{20} B_{21}^3 B_{30}^3 + f^{31} B_{31}^2 B_{21}^3 \\
&= f^{02} - f^{13} - f^{20} - f^{31}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.14) \quad f_2^0 &= f^{kr} B_{k2}^p B_{pr}^0 \\
&= f^{02} B_{02}^2 B_{22}^0 + f^{13} B_{12}^3 B_{33}^0 + f^{20} B_{22}^0 B_{00}^0 + f^{31} B_{32}^1 B_{11}^0 \\
&= -f^{02} - f^{13} - f^{20} + f^{31}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.15) \quad f_2^1 &= f^{kr} B_{k2}^p B_{pr}^1 \\
&= f^{03} B_{02}^2 B_{23}^1 + f^{12} B_{12}^3 B_{32}^1 + f^{21} B_{22}^0 B_{01}^1 + f^{30} B_{32}^1 B_{10}^1 \\
&= f^{03} - f^{12} - f^{21} - f^{30}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.16) \quad f_2^2 &= f^{kr} B_{k2}^p B_{pr}^2 \\
&= f^{00} B_{02}^2 B_{20}^2 + f^{11} B_{12}^3 B_{31}^2 + f^{22} B_{22}^0 B_{02}^2 + f^{33} B_{32}^1 B_{13}^2 \\
&= f^{00} + f^{11} - f^{22} + f^{33}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.17) \quad f_2^3 &= f^{kr} B_{k2}^p B_{pr}^3 \\
&= f^{01} B_{02}^2 B_{21}^3 + f^{10} B_{12}^3 B_{30}^3 + f^{23} B_{22}^0 B_{03}^3 + f^{32} B_{32}^1 B_{12}^3 \\
&= -f^{01} + f^{10} - f^{23} - f^{32}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.18) \quad f_3^0 &= f^{kr} B_{k3}^p B_{pr}^0 \\
&= f^{03} B_{03}^3 B_{33}^0 + f^{12} B_{13}^2 B_{22}^0 + f^{21} B_{23}^1 B_{11}^0 + f^{30} B_{33}^0 B_{00}^0 \\
&= -f^{03} + f^{12} - f^{21} - f^{30}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.19) \quad f_3^1 &= f^{kr} B_{k3}^p B_{pr}^1 \\
&= f^{02} B_{03}^3 B_{32}^1 + f^{13} B_{13}^2 B_{23}^1 + f^{20} B_{23}^1 B_{10}^1 + f^{31} B_{33}^0 B_{01}^1 \\
&= -f^{02} - f^{13} + f^{20} - f^{31}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.20) \quad f_3^2 &= f^{kr} B_{k3}^p B_{pr}^2 \\
&= f^{01} B_{03}^3 B_{31}^2 + f^{10} B_{13}^2 B_{20}^2 + f^{23} B_{23}^1 B_{13}^2 + f^{32} B_{33}^0 B_{02}^2 \\
&= f^{01} - f^{10} - f^{23} - f^{32}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.21) \quad f_3^3 &= f^{kr} B_{k3}^p B_{pr}^3 \\
&= f^{00} B_{03}^3 B_{30}^3 + f^{11} B_{13}^2 B_{21}^3 + f^{22} B_{23}^1 B_{12}^3 + f^{33} B_{33}^0 B_{03}^3 \\
&= f^{00} + f^{11} + f^{22} - f^{33}
\end{aligned}$$

Equations (10.3.6), (10.3.11), (10.3.16), (10.3.21) form the system of linear equations (10.3.2).

Equations (10.3.7), (10.3.10), (10.3.17), (10.3.20) form the system of linear equations (10.3.3).

Equations (10.3.8), (10.3.13), (10.3.14), (10.3.19) form the system of linear equations (10.3.4).

Equations (10.3.9), (10.3.12), (10.3.15), (10.3.18) form the system of linear equations (10.3.5). $\square$

Theorem 10.3.3. Consider quaternion algebra H with the basis (10.3.1). Standard components of additive function over field F and coordinates of this function over field F satisfy relationship

$$\begin{aligned}
(10.3.22) \quad & \begin{pmatrix} f_0^0 & f_1^0 & f_2^0 & f_3^0 \\ f_1^1 & -f_0^1 & f_3^1 & -f_2^1 \\ f_2^2 & -f_3^2 & -f_0^2 & f_1^2 \\ f_3^3 & f_2^3 & -f_1^3 & -f_0^3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{00} & -f^{01} & -f^{02} & -f^{03} \\ f^{11} & f^{10} & f^{13} & -f^{12} \\ f^{22} & -f^{23} & f^{20} & f^{21} \\ f^{33} & f^{32} & -f^{31} & f^{30} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.23) \quad & \begin{pmatrix} f^{00} & -f^{01} & -f^{02} & -f^{03} \\ f^{11} & f^{10} & f^{13} & -f^{12} \\ f^{22} & -f^{23} & f^{20} & f^{21} \\ f^{33} & f^{32} & -f^{31} & f^{30} \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0^0 & f_1^0 & f_2^0 & f_3^0 \\ f_1^1 & -f_0^1 & f_3^1 & -f_2^1 \\ f_2^2 & -f_3^2 & -f_0^2 & f_1^2 \\ f_3^3 & f_2^3 & -f_1^3 & -f_0^3 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

where

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

PROOF. Let us write the system of linear equations (10.3.2) as product of matrices

$$(10.3.24) \quad \begin{pmatrix} f_0^0 \\ f_1^1 \\ f_2^2 \\ f_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{00} \\ f^{11} \\ f^{22} \\ f^{33} \end{pmatrix}$$

Let us write the system of linear equations (10.3.3) as product of matrices

$$(10.3.25) \quad \begin{pmatrix} f_0^1 \\ f_1^0 \\ f_2^3 \\ f_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{01} \\ f^{10} \\ f^{23} \\ f^{32} \end{pmatrix}$$

From the equation (10.3.25), it follows that

$$(10.3.26) \quad \begin{pmatrix} -f_0^1 \\ f_1^0 \\ f_2^3 \\ -f_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{01} \\ f^{10} \\ f^{23} \\ f^{32} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{01} \\ f^{10} \\ -f^{23} \\ f^{32} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} f_1^0 \\ -f_0^1 \\ -f_3^2 \\ f_2^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{01} \\ f^{10} \\ -f^{23} \\ f^{32} \end{pmatrix}$$

Let us write the system of linear equations (10.3.4) as product of matrices

$$(10.3.27) \quad \begin{pmatrix} f_0^2 \\ f_1^3 \\ f_2^0 \\ f_3^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{02} \\ f^{13} \\ f^{20} \\ f^{31} \end{pmatrix}$$

From the equation (10.3.27), it follows that

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} -f_0^2 \\ -f_1^3 \\ f_2^0 \\ f_3^1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{02} \\ f^{13} \\ f^{20} \\ f^{31} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{02} \\ f^{13} \\ f^{20} \\ -f^{31} \end{pmatrix} \\
 (10.3.28) \quad \begin{pmatrix} f_2^0 \\ f_3^1 \\ -f_0^2 \\ -f_1^3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{02} \\ f^{13} \\ f^{20} \\ -f^{31} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Let us write the system of linear equations (10.3.5) as product of matrices

$$(10.3.29) \quad \begin{pmatrix} f_0^3 \\ f_1^2 \\ f_2^1 \\ f_3^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{03} \\ f^{12} \\ f^{21} \\ f^{30} \end{pmatrix}$$

From the equation (10.3.29), it follows that

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} -f_0^3 \\ f_1^2 \\ -f_2^1 \\ f_3^0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{03} \\ f^{12} \\ f^{21} \\ f^{30} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{03} \\ -f^{12} \\ f^{21} \\ f^{30} \end{pmatrix} \\
 (10.3.30) \quad \begin{pmatrix} f_3^0 \\ -f_2^1 \\ f_1^2 \\ -f_0^3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{03} \\ -f^{12} \\ f^{21} \\ f^{30} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

We join equations (10.3.24), (10.3.26), (10.3.28), (10.3.30) into equation (10.3.22).

□

Theorem 10.3.4. *Standard components of linear function of quaternion algebra H relative to basis (10.3.1) and coordinates of corresponding linear map satisfy*

relationship

$$(10.3.31) \quad \begin{cases} 4f^{00} = f_0^0 + f_1^1 + f_2^2 + f_3^3 \\ 4f^{11} = -f_0^0 - f_1^1 + f_2^2 + f_3^3 \\ 4f^{22} = -f_0^0 + f_1^1 - f_2^2 + f_3^3 \\ 4f^{33} = -f_0^0 + f_1^1 + f_2^2 - f_3^3 \end{cases}$$

$$(10.3.32) \quad \begin{cases} 4f^{10} = -f_1^0 + f_0^1 - f_3^2 + f_2^3 \\ 4f^{01} = -f_1^0 + f_0^1 + f_3^2 - f_2^3 \\ 4f^{32} = -f_1^0 - f_0^1 - f_3^2 - f_2^3 \\ 4f^{23} = f_1^0 + f_0^1 - f_3^2 - f_2^3 \end{cases}$$

$$(10.3.33) \quad \begin{cases} 4f^{20} = -f_2^0 + f_3^1 + f_0^2 - f_1^3 \\ 4f^{31} = f_2^0 - f_3^1 + f_0^2 - f_1^3 \\ 4f^{02} = -f_2^0 - f_3^1 + f_0^2 + f_1^3 \\ 4f^{13} = -f_2^0 - f_3^1 - f_0^2 - f_1^3 \end{cases}$$

$$(10.3.34) \quad \begin{cases} 4f^{30} = -f_3^0 - f_2^1 + f_1^2 + f_0^3 \\ 4f^{21} = -f_3^0 - f_2^1 - f_1^2 - f_0^3 \\ 4f^{12} = f_3^0 - f_2^1 - f_1^2 + f_0^3 \\ 4f^{03} = -f_3^0 + f_2^1 - f_1^2 + f_0^3 \end{cases}$$

PROOF. We get systems of linear equations (10.3.31), (10.3.32), (10.3.33), (10.3.34) as the product of matrices in equation (10.3.23). $\square$

Theorem 10.3.5. *We can identify quaternion*

$$(10.3.35) \quad a = a^0 + a^1 i + a^2 j + a^3 k$$

and matrix

$$(10.3.36) \quad J_a = \begin{pmatrix} a^0 & -a^1 & -a^2 & -a^3 \\ a^1 & a^0 & -a^3 & a^2 \\ a^2 & a^3 & a^0 & -a^1 \\ a^3 & -a^2 & a^1 & a^0 \end{pmatrix}$$

PROOF. The product of quaternions (10.3.35) and

$$x = x^0 + x^1 i + x^2 j + x^3 k$$

has form

$$\begin{aligned} ax &= a^0 x^0 - a^1 x^1 - a^2 x^2 - a^3 x^3 + (a^0 x^1 + a^1 x^0 + a^2 x^3 - a^3 x^2)i \\ &\quad + (a^0 x^2 + a^2 x^0 + a^3 x^1 - a^1 x^3)j + (a^0 x^3 + a^3 x^0 + a^1 x^2 - a^2 x^1)k \end{aligned}$$

Therefore, function $f_a(x) = ax$ has Jacobian matrix (10.3.36). It is evident that $f_a \circ f_b = f_{ab}$. Similar equation is true for matrices

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} a^0 & -a^1 & -a^2 & -a^3 \\ a^1 & a^0 & -a^3 & a^2 \\ a^2 & a^3 & a^0 & -a^1 \\ a^3 & -a^2 & a^1 & a^0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b^0 & -b^1 & -b^2 & -b^3 \\ b^1 & b^0 & -b^3 & b^2 \\ b^2 & b^3 & b^0 & -b^1 \\ b^3 & -b^2 & b^1 & b^0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a^0 b^0 - a^1 b^1 & -a^0 b^1 - a^1 b^0 & -a^0 b^2 + a^1 b^3 & -a^0 b^3 - a^1 b^2 \\ -a^2 b^2 - a^3 b^3 & -a^2 b^3 + a^3 b^2 & -a^2 b^0 - a^3 b^1 & +a^2 b^1 - a^3 b^0 \\ a^0 b^1 + a^1 b^0 & a^0 b^0 - a^1 b^1 & -a^0 b^3 - a^1 b^2 & a^0 b^2 - a^1 b^3 \\ +a^2 b^3 - a^3 b^2 & -a^2 b^2 - a^3 b^3 & +a^2 b^1 - a^3 b^0 & +a^2 b^0 + a^3 b^1 \\ a^0 b^2 - a^1 b^3 & a^0 b^3 + a^1 b^2 & a^0 b^0 - a^1 b^1 & -a^0 b^1 - a^1 b^0 \\ +a^2 b^0 + a^3 b^1 & -a^2 b^1 + a^3 b^0 & -a^2 b^2 - a^3 b^3 & -a^2 b^3 - a^3 b^2 \\ a^0 b^3 + a^1 b^2 & -a^0 b^2 + a^1 b^3 & a^0 b^1 + a^1 b^0 & a^0 b^0 - a^1 b^1 \\ -a^2 b^1 + a^3 b^0 & -a^2 b^0 - a^3 b^1 & +a^2 b^3 - a^3 b^2 & -a^2 b^2 - a^3 b^3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Therefore, we can identify the quaternion a and the matrix J_a . □

CHAPTER 11

Linear Map of D -Vector Spaces

11.1. Linear Mapping of D -Vector Spaces

Considering linear mapping of D -vector spaces we assume that division ring D is finite dimensional algebra over field F .

Definition 11.1.1. Let field F be subring of center $Z(D)$ of division ring D . Suppose $\overline{V}$ and $\overline{W}$ are D -vector spaces. We call map

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

of D -vector space $\overline{V}$ into D -vector space $\overline{W}$ **linear map over field F** if

$$\begin{aligned} \overline{A}(\overline{x} + \overline{y}) &= \overline{A}(\overline{x}) + \overline{A}(\overline{y}) & \overline{x}, \overline{y} \in \overline{V} \\ \overline{A}(p\overline{x}) &= p\overline{A}(\overline{x}) & p \in F \end{aligned}$$

Let us denote $\mathcal{L}(D; \overline{V}; \overline{W})$ set of linear mappings

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

of D -vector space $\overline{V}$ into D -vector space $\overline{W}$. □

It is evident that D_* -linear mapping as well ${}_*D$ -linear mapping are linear mappings. Set of morphisms of D -vector space is wider then set of morphisms of D_* -vector space. To consider linear mapping of vector space, we will follow method used in section 4.4.

Theorem 11.1.2. Let D be division ring of characteristic 0. Linear mapping

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

relative to ${}_*$ D -basis $\overline{e}_{V.*}$ of D -vector space $\overline{V}$ and ${}_*$ D -basis $\overline{e}_{W.*}$ of D -vector space $\overline{W}$ has form

$$(11.1.1) \quad \overline{A}(\overline{v}) = \overline{e}_{W.j} A_i^j(v^i) \quad \overline{v} = \overline{e}_{V.*} v$$

where $A_i^j(v^i)$ linearly depends on one variable v^i and does not depends on the rest of coordinates of vector $\overline{v}$.

PROOF. According to definition 11.1.1

$$(11.1.2) \quad \overline{A}(\overline{v}) = \overline{A}(\overline{e}_{V.*} v) = \overline{A} \left(\sum_i \overline{e}_{V.i} v^i \right) = \sum_i \overline{A}(\overline{e}_{V.i} v^i)$$

For any given i vector $\overline{A}(\overline{e}_{V.i} v^i) \in \overline{W}$ has only expansion

$$(11.1.3) \quad \overline{A}(\overline{e}_{V.i} v^i) = \overline{e}_{W.j} A_i^j(v^i) \quad \overline{A}(\overline{e}_{V.i} v^i) = \overline{e}_{W.*} A_i(v^i)$$

relative to ${}_*$ D -basis $\overline{e}_{W.*}$. Let us substitute (11.1.3) into (11.1.2). We get (11.1.1). □

Definition 11.1.3. The linear mapping

$$A_i^j : D \rightarrow D$$

is called **partial linear map of variable** v^i . □

We can write linear mapping as product of matrices

$$(11.1.4) \quad \overline{A}(\overline{v}) = \begin{pmatrix} \overline{e}_{W \cdot 1} & \dots & \overline{e}_{W \cdot m} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} A_i^1(v^i) \\ \dots \\ A_i^m(v^i) \end{pmatrix}$$

Let us define product of matrices

$$(11.1.5) \quad \begin{pmatrix} A_1^1 & \dots & A_n^1 \\ \dots & \dots & \dots \\ A_1^m & \dots & A_n^m \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_i^1(v^i) \\ \dots \\ A_i^m(v^i) \end{pmatrix}$$

where $A = ({}_i A^j)$ is matrix of partial linear mappings. Using the equation (11.1.5), we can write the equation (11.1.4) in the form

$$(11.1.6) \quad \overline{A}(\overline{v}) = \begin{pmatrix} \overline{e}_{W \cdot 1} & \dots & \overline{e}_{W \cdot m} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} A_1^1 & \dots & A_n^1 \\ \dots & \dots & \dots \\ A_1^m & \dots & A_n^m \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix}$$

Theorem 11.1.4. Let D be division ring of characteristic 0. Linear mapping

$$(11.1.7) \quad \overline{A} : \overline{v} \in \overline{V} \rightarrow \overline{w} \in \overline{W} \quad \overline{w} = \overline{A}(\overline{v})$$

relative to $*D$ -basis $\overline{e}_{V \cdot *}$ of D -vector space $\overline{V}$ and $*D$ -basis $\overline{e}_{W \cdot *}$ of D -vector space $\overline{W}$ ^{11.1} has form

$$(11.1.8) \quad \overline{v} = \overline{e}_V * v$$

$$(11.1.8) \quad \overline{w} = \overline{e}_W * w$$

$$(11.1.9) \quad w^j = A_i^j(v^i) = A_{s \cdot 0 \cdot i}^j v^i A_{s \cdot 1 \cdot i}^j$$

PROOF. According to theorem 11.1.2 we can write linear map $\overline{A}(\overline{v})$ as (11.1.1). Because for given indexes i, j partial linear map $A_i^j(v^i)$ is linear with respect to variable v^i , than according to (9.1.14) it is possible to represent expression $A_i^j(v^i)$ as

$$(11.1.10) \quad A_i^j(v^i) = A_{s \cdot 0 \cdot i}^j v^i A_{s \cdot 1 \cdot i}^j$$

where index s is numbering items. Range of index s depends on indexes i and j . Combining equations (11.1.2) and (11.1.10), we get

$$(11.1.11) \quad \begin{aligned} \overline{A}(\overline{v}) &= \overline{e}_{W \cdot j} A_i^j(v^i) = \overline{e}_{W \cdot j} A_{s \cdot 0 \cdot i}^j v^i A_{s \cdot 1 \cdot i}^j \\ \overline{A}(\overline{v}) &= \overline{e}_W * A_i(v^i) = \overline{e}_W * (A_{s \cdot 0 \cdot i} v^i A_{s \cdot 1 \cdot i}) \end{aligned}$$

In equation (11.1.11), we add also by index i . Equation (11.1.9) follows from comparison of equations (11.1.8) and (11.1.11). □

Definition 11.1.5. Expression $A_{s \cdot p \cdot i}^j$ in equation (11.1.3) is called **component of linear map** $\overline{A}$. □

^{11.1}Coordinate representation of map (11.1.7) depends on choice of basis. Equations change form if, for instance, we choose $*D$ -basis $\overline{r}_*$ in D -vector space $\overline{W}$.

Theorem 11.1.6. Let D be division ring of characteristic 0. Let $\bar{e}_{V.*}$ be a *D -basis of D -vector space $\bar{V}$, $\bar{e}_{U.*}$ be a *D -basis of D -vector space $\bar{U}$, and $\bar{e}_{W.*}$ be a *D -basis of D -vector space $\bar{W}$. Suppose diagram of maps

$$\begin{array}{ccc} \bar{V} & \xrightarrow{\bar{C}} & \bar{W} \\ & \searrow \bar{A} \quad \nearrow \bar{B} & \\ & \bar{U} & \end{array}$$

is commutative diagram where linear map A has presentation

$$(11.1.12) \quad \bar{u} = \bar{A}(\bar{v}) = \bar{e}_{U.j} A_i^j(v^i) = \bar{e}_{U.j} A_{s.0.i}^j v^i A_{s.1.i}^j$$

relative to selected bases and linear map B has presentation

$$(11.1.13) \quad \bar{w} = \bar{B}(\bar{u}) = \bar{e}_{W.k} B_j^k(u^j) = \bar{e}_{W.k} B_{t.0.j}^k u^j B_{t.1.j}^k$$

relative to selected bases. Then map C is linear map and has presentation

$$(11.1.14) \quad \bar{w} = \bar{C}(\bar{v}) = \bar{e}_{W.k} C_i^k(v^i) = \bar{e}_{W.k} C_{u.0.i}^k v^i C_{u.1.i}^k$$

relative to selected bases, where^{11.2}

$$(11.1.15) \quad \begin{aligned} C_i^k(v^i) &= B_j^k(A_i^j(v^i)) \\ C_{u.0.i}^k &= C_{ts.0.i}^k = B_{t.0.j}^k A_{s.0.i}^j \\ C_{u.1.i}^k &= C_{ts.1.i}^k = A_{s.1.i}^j B_{t.1.j}^k \end{aligned}$$

PROOF. The mapping $\bar{C}$ is linear mapping because

$$\begin{aligned} \bar{C}(\bar{a} + \bar{b}) &= \bar{B}(\bar{A}(\bar{a} + \bar{b})) \\ &= \bar{B}(\bar{A}(\bar{a}) + \bar{A}(\bar{b})) \\ &= \bar{B}(\bar{A}(\bar{a})) + \bar{B}(\bar{A}(\bar{b})) \\ &= \bar{C}(\bar{a}) + \bar{C}(\bar{b}) \\ \bar{C}(a\bar{b}) &= \bar{B}(\bar{A}(a\bar{b})) = \bar{B}(a\bar{A}(\bar{b})) \\ &= a\bar{B}(\bar{A}(\bar{b})) = a\bar{C}(\bar{b}) \\ \bar{a}, \bar{b} &\in \bar{V} \\ a &\in F \end{aligned}$$

Equation (11.1.14) follows from substituting (11.1.12) into (11.1.13). $\square$

Theorem 11.1.7. For linear mapping $\bar{A}$ there exists linear mapping $\bar{B}$ such, that

$$\begin{aligned} \bar{A}(a\bar{x}b) &= \bar{B}(\bar{x}) \\ B_{s.0.i}^j &= A_{s.0.i}^j a \\ B_{s.1.i}^j &= b A_{s.1.i}^j \end{aligned}$$

^{11.2}Index u appeared composite index, $u = st$. However it is possible that some items in (11.1.15) may be summed together.

PROOF. The mapping $\overline{B}$ is linear mapping because

$$\overline{B}(\overline{x} + \overline{y}) = \overline{A}(a(\overline{x} + \overline{y})b) = \overline{A}(a\overline{x}b + a\overline{y}b) = \overline{A}(a\overline{x}b) + \overline{A}(a\overline{y}b) = \overline{B}(\overline{x}) + \overline{B}(\overline{y})$$

$$\overline{B}(c\overline{x}) = \overline{A}(ac\overline{x}b) = \overline{A}(ca\overline{x}b) = c\overline{A}(a\overline{x}b) = c\overline{B}(\overline{x})$$

$$\overline{x}, \overline{y} \in \overline{V}, c \in F$$

According to equation (11.1.9)

$$B_{s \cdot 0 \cdot i}^j v^i B_{s \cdot 1 \cdot i}^j = A_{s \cdot 0 \cdot i}^j (a v^i b) A_{s \cdot 1 \cdot i}^j = (A_{s \cdot 0 \cdot i}^j a) v^i (b A_{s \cdot 1 \cdot i}^j)$$

□

Theorem 11.1.8. Let D be division ring of characteristic 0. Let

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

linear mapping of D -vector space $\overline{V}$ into D -vector space $\overline{W}$. Then $\overline{A}(\overline{0}) = \overline{0}$.

PROOF. Corollary of equation

$$\overline{A}(\overline{a} + \overline{0}) = \overline{A}(\overline{a}) + \overline{A}(\overline{0})$$

□

Definition 11.1.9. The set

$$\ker \overline{A} = \{\overline{x} \in \overline{V} : \overline{A}(\overline{x}) = \overline{0}\}$$

is called **kernel of linear mapping**

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

of D -vector space $\overline{V}$ into D -vector space $\overline{W}$.

□

Definition 11.1.10. The linear mapping

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

of D -vector space $\overline{V}$ into D -vector space $\overline{W}$ is called **singular**, if

$$\ker \overline{A} = \overline{V}$$

□

11.2. Polylinear Mapping of D -Vector Spaces

Definition 11.2.1. Let field F be subring of center $Z(D)$ of division ring D of characteristic 0. Suppose $\overline{V}_1, \dots, \overline{V}_n, \overline{W}_1, \dots, \overline{W}_m$ are D -vector spaces. We call mapping

$$(11.2.1) \quad \begin{aligned} \overline{A} : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n &\rightarrow \overline{W}_1 \times \dots \times \overline{W}_m \\ \overline{w}_1 \times \dots \times \overline{w}_m &= \overline{A}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) \end{aligned}$$

polylinear mapping of $\times$ - D -vector space $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$ into $\times$ - D -vector space $\overline{W}_1 \times \dots \times \overline{W}_m$, if

$$\overline{A}(\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_i + \overline{q}_i, \dots, \overline{p}_n) = \overline{A}(\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_i, \dots, \overline{p}_n) + \overline{A}(\overline{p}_1, \dots, \overline{q}_i, \dots, \overline{p}_n)$$

$$\overline{A}(\overline{p}_1, \dots, a\overline{p}_i, \dots, \overline{p}_n) = a\overline{A}(\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_i, \dots, \overline{p}_n)$$

$$1 \leq i \leq n \quad \overline{p}_i, \overline{q}_i \in \overline{V}_i \quad a \in F$$

□

Definition 11.2.2. Let us denote $\mathcal{L}(D; \overline{V}_1, \dots, \overline{V}_n; \overline{W}_1, \dots, \overline{W}_m)$ set of polylinear mappings of $\times$ - D -vector space $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$ into $\times$ - D -vector space $\overline{W}_1 \times \dots \times \overline{W}_m$. $\square$

Theorem 11.2.3. Let D be division ring of characteristic 0. For each $k \in K = [1, n]$ let $\overline{e}_{V_k \cdot *}$ be $*D$ -basis in D -vector space $\overline{V}_k$ and

$$\overline{v}_k = \overline{e}_{V_k \cdot *} v_k \quad \overline{v}_k \in \overline{V}_k$$

For each $l, 1 \leq l \leq m$, let $\overline{e}_{W_l \cdot *}$ be $*D$ -basis in D -vector space $\overline{W}_l$ and $\overline{w}_l \in \overline{W}_l$

$$\overline{w}_l = \overline{e}_{W_l \cdot *} w_l \quad \overline{w}_l \in \overline{W}_l$$

Polylinear mapping (11.2.1) relative to basis $\overline{e}_{V_1 \cdot *} \times \dots \times \overline{e}_{V_n \cdot *}$ and basis $\overline{e}_{W_1 \cdot *} \times \dots \times \overline{e}_{W_m \cdot *}$ has form

$$(11.2.2) \quad \begin{aligned} w_l^j &= A_{i_1, \dots, i_n \cdot l}^j(v_1^{i_1}, \dots, v_n^{i_n}) \\ &= A_{s \cdot 0 \cdot i_1, \dots, i_n \cdot l}^j \sigma_s(v_1^{i_1}) A_{s \cdot 1 \cdot i_1, \dots, i_n \cdot l}^j \dots \sigma_s(v_n^{i_n}) A_{s \cdot n \cdot i_1, \dots, i_n \cdot l}^j \end{aligned}$$

Range S of index s depends on values of indexes $i_1, \dots, i_n$. σ_s is a transposition of set of variables $\{v_1^{i_1}, \dots, v_n^{i_n}\}$.

PROOF. Since we may consider map $\overline{A}$ into $\times$ - D -vector space $\overline{W}_1 \times \dots \times \overline{W}_m$ componentwise, then we may confine to considering of map

$$(11.2.3) \quad \overline{A}_l : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \rightarrow \overline{W}_l \quad \overline{w}_l = \overline{A}_l(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$$

We prove statement by induction on n .

When $n = 1$ the statement of theorem is statement of theorem 11.1.4. In such case we may identify^{11.3}

$$A_{s \cdot p \cdot i}^1 = A_{s \cdot p \cdot i}^j \quad p = 0, 1$$

Let statement of theorem be true for $n = k - 1$. Then it is possible to represent map (11.2.3) as

$$\begin{array}{ccc} \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_k & \xrightarrow{\overline{A}_l} & \overline{W}_l \\ & \searrow \overline{C}_l(\overline{v}_k) & \uparrow \overline{B}_l \\ & & \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_{k-1} \end{array}$$

$$\overline{w}_l = \overline{A}_l(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_k) = \overline{C}_l(\overline{v}_k)(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_{k-1})$$

According to statement of induction polylinear mapping $\overline{B}_l$ has form

$$w_l^j = B_{t \cdot 0 \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1} \sigma_t(v_1^{i_1}) B_{t \cdot 1 \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1} \dots \sigma_t(v_{k-1}^{i_{k-1}}) B_{t \cdot k-1 \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1}$$

According to construction $\overline{B}_l = \overline{C}_l(\overline{v}_k)$. Therefore, expressions $B_{t \cdot p \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1}$ are functions of $\overline{v}_k$. Since $\overline{C}_l(\overline{v}_k)$ is linear mapping of $\overline{v}_k$, then only one expression

^{11.3}In representation (11.2.2) we will use following rules.

- If range of any index is set consisting of one element, then we will omit corresponding index.
- If $n = 1$, then σ_s is identical transformation. We will not show such transformation in the expression.

$B_{t \cdot p \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j}$ is linear mapping $\bar{v}_k$, and rest expressions $B_{t \cdot q \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j}$ do not depend on $\bar{v}_k$.

Without loss of generality, assume $p = 0$. According to theorem 11.1.4

$$B_{t \cdot 0 \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j} = C_{tr \cdot 0 \cdot i_k i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^k v_k^{i_k} C_{tr \cdot 1 \cdot i_k i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^k$$

Assume $s = tr$. Let us define transposition σ_s according to rule

$$\sigma_s = \sigma(tr) = \begin{pmatrix} v_k^{i_k} & v_1^{i_1} & \dots & v_{k-1}^{i_{k-1}} \\ v_k^{i_k} & \sigma_t(v_1^{i_1}) & \dots & \sigma_t(v_{k-1}^{i_{k-1}}) \end{pmatrix}$$

Suppose

$$\begin{aligned} A_{tr \cdot q+1 \cdot i_k i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^k &= B_{t \cdot q \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j} & q = 1, \dots, k-1 \\ A_{tr \cdot q \cdot i_k i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^k &= C_{tr \cdot q \cdot i_k i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^k & q = 0, 1 \end{aligned}$$

We proved step of induction. □

Definition 11.2.4. Expression $A_{s \cdot p \cdot i_1, \dots, i_n \cdot l}^n$ in equation (11.2.2) is called **component of polylinear mapping $\bar{A}$** . □

CHAPTER 12

Tensor Product

12.1. Tensor Product of Rings

Theorem 12.1.1. *Let G be semigroup. Let M be free module with basis G over commutative ring F . Then the structure of ring is defined on M such that F is subring of center $Z(M)$ of ring M .*

PROOF. Arbitrary vectors $a, b, c \in M$ have unique expansion

$$a = a^i g_i \quad b = b^j g_j \quad c = c^k g_k$$

relative to basis G . $i \in I, j \in J, k \in K$ where I, J, K are finite sets. Without loss of generality, we assume $i, j, k \in I \cup J \cup K$.

Let us define product a and b by equation

$$(12.1.1) \quad ab = (a^i b^j)(g_i g_j)$$

From chain of equations

$$\begin{aligned} (a + b)c &= ((a^i + b^i)g_i)(c^j g_j) \\ &= ((a^i + b^i)c^j)(g_i g_j) \\ &= (a^i c^j + b^i c^j)(g_i g_j) \\ &= (a^i c^j)(g_i g_j) + (b^i c^j)(g_i g_j) \\ &= (a^i g_i)(c^j g_j) + (b^i g_i)(c^j g_j) \\ &= ac + bc \end{aligned}$$

it follows that this product is right-distributive relative to sum. The same way we prove that this product is left-distributive relative to sum. From chain of equations

$$\begin{aligned} (ab)c &= ((a^i g_i)(b^j g_j))(c^k g_k) \\ &= ((a^i b^j)(g_i g_j))(c^k g_k) \\ &= ((a^i b^j)c^k)((g_i g_j)g_k) \\ &= (a^i(b^j c^k))(g_i(g_j g_k)) \\ &= (a^i g_i)((b^j c^k)(g_j g_k)) \\ &= (a^i g_i)((b^j g_j)(c^k g_k)) \\ &= a(bc) \end{aligned}$$

it follows that this product is associative.

Let $e \in G$ be unit of semigroup G . From equation

$$ae = (a^i g_i)e = a^i(g_i e) = a^i g_i = a$$

it follows that e is unit of ring M .

Map

$$f : p \in F \rightarrow pe \in M$$

is homomorphic injection of ring F into ring M . Therefore, center $Z(M)$ of ring M contains ring F . $\square$

Let $R_1, \dots, R_n$ be rings of characteristic 0.^{12.1} Let F be maximum commutative ring which for any $i, i = 1, \dots, n$, is subring of center $Z(R_i)$. Let us consider category $\mathcal{A}$ whose objects are polylinear over commutative ring F maps

$$f : R_1 \times \dots \times R_n \longrightarrow S_1 \quad g : R_1 \times \dots \times R_n \longrightarrow S_2$$

where S_1, S_2 are modules over ring F . We define morphism $f \rightarrow g$ to be linear over commutative ring F map $h : S_1 \rightarrow S_2$ making diagram

$$\begin{array}{ccc} & & S_1 \\ & \nearrow f & \downarrow h \\ R_1 \times \dots \times R_n & & \\ & \searrow g & \downarrow h \\ & & S_2 \end{array}$$

commutative. Universal object $R_1 \otimes \dots \otimes R_n$ of category $\mathcal{A}$ is called **tensor product of rings $R_1, \dots, R_n$ over commutative ring F** .

Theorem 12.1.2. *There exists tensor product of rings.*

PROOF. Let M be module over ring F generated by product $R_1 \times \dots \times R_n$ of multiplicative semigroups of rings $R_1, \dots, R_n$. Injection

$$i : R_1 \times \dots \times R_n \longrightarrow M$$

is defined according to rule

$$(12.1.2) \quad i(d_1, \dots, d_n) = (d_1, \dots, d_n)$$

and is homomorphism of multiplicative semigroup of ring $R_1 \times \dots \times R_n$ onto basis of module M . Therefore, product of vectors of basis is defined componentwise

$$(12.1.3) \quad (d_1, \dots, d_n)(c_1, \dots, c_n) = (d_1 c_1, \dots, d_n c_n)$$

Let $N \subset M$ be submodule generated by elements of the following type

$$(12.1.4) \quad (d_1, \dots, d_i + c_i, \dots, d_n) - (d_1, \dots, d_i, \dots, d_n) - (d_1, \dots, c_i, \dots, d_n)$$

$$(12.1.5) \quad (d_1, \dots, ad_i, \dots, d_n) - a(d_1, \dots, d_i, \dots, d_n)$$

where $d_i \in R_i, c_i \in R_i, a \in F$. Let

$$j : M \rightarrow M/N$$

be canonical map on factor module. Let us consider commutative diagram

$$(12.1.6) \quad \begin{array}{ccc} & & M/N \\ & \nearrow f & \uparrow j \\ R_1 \times \dots \times R_n & \xrightarrow{i} & M \end{array}$$

^{12.1}I give definition of tensor product of rings following to definition in [1], p. 601 - 603.

Since elements (12.1.4) and (12.1.5) belong to kernel of linear map j , then from equation (12.1.2) it follows

$$(12.1.7) \quad f(d_1, \dots, d_i + c_i, \dots, d_n) = f(d_1, \dots, d_i, \dots, d_n) + f(d_1, \dots, c_i, \dots, d_n)$$

$$(12.1.8) \quad f(d_1, \dots, ad_i, \dots, d_n) = af(d_1, \dots, d_i, \dots, d_n)$$

From equations (12.1.7) and (12.1.8) it follows that map f is polylinear over field F . Since M is module with basis $R_1 \times \dots \times R_n$, then according to theorem [1]-4.1, on p. 135 for any module V and any polylinear over F map

$$g : R_1 \times \dots \times R_n \longrightarrow V$$

there exists a unique homomorphism $k : M \rightarrow V$, for which following diagram is commutative

$$(12.1.9) \quad \begin{array}{ccc} R_1 \times \dots \times R_n & \xrightarrow{i} & M \\ & \searrow g & \downarrow k \\ & & V \end{array}$$

Since g is polylinear over F , then $\ker k \subseteq N$. According to statement on p. [1]-119 map j is universal in the category of homomorphisms of vector space M whose kernel contains N . Therefore, we have homomorphism

$$h : M/N \rightarrow V$$

which makes the following diagram commutative

$$(12.1.10) \quad \begin{array}{ccc} & M/N & \\ \nearrow j & \downarrow h & \\ M & & V \\ \searrow k & & \end{array}$$

We join diagrams (12.1.6), (12.1.9), (12.1.10), and get commutative diagram

$$(12.1.11) \quad \begin{array}{ccccc} & & & M/N & \\ & \nearrow f & & \downarrow h & \\ R_1 \times \dots \times R_n & \xrightarrow{i} & M & \searrow k & \\ & \searrow g & & & \downarrow \\ & & & & V \end{array}$$

Since $\text{Im } f$ generates M/N , then map h is uniquely determined. $\square$

According to proof of theorem 12.1.2

$$R_1 \otimes \dots \otimes R_n = M/N$$

If $d_i \in R_i$, we write

$$(12.1.12) \quad j(d_1, \dots, d_n) = d_1 \otimes \dots \otimes d_n$$

From equations (12.1.2) and (12.1.12) it follows

$$(12.1.13) \quad f(d_1, \dots, d_n) = d_1 \otimes \dots \otimes d_n$$

We can write equations (12.1.7) and (12.1.8) as

$$(12.1.14) \quad \begin{aligned} & d_1 \otimes \dots \otimes (d_i + c_i) \otimes \dots \otimes d_n \\ &= d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n + d_1 \otimes \dots \otimes c_i \otimes \dots \otimes d_n \end{aligned}$$

$$(12.1.15) \quad d_1 \otimes \dots \otimes (ad_i) \otimes \dots \otimes d_n = a(d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n)$$

Theorem 12.1.3. *Tensor product $R_1 \otimes \dots \otimes R_n$ of rings $R_1, \dots, R_n$ of characteristic 0 over ring F is ring.*

PROOF. According to proof of theorem 12.1.2 basis of module M over ring F is semigroup. According to theorem 12.1.1 structure of ring is defined in module M . Submodule N is two-sided ideal of ring M . Canonical map on factor module

$$j : M \rightarrow M/N$$

is also canonical map on factor ring. Therefore, the structure of ring is determined in module $M/N = R_1 \otimes \dots \otimes R_n$. From equation (12.1.3) it follows that

$$(12.1.16) \quad (d_1 \otimes \dots \otimes d_n)(c_1 \otimes \dots \otimes c_n) = (d_1 c_1) \otimes \dots \otimes (d_n c_n)$$

From equation (12.1.14) it follows that

$$\begin{aligned} & d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n \\ &= d_1 \otimes \dots \otimes (d_i + 0) \otimes \dots \otimes d_n \\ &= d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n + d_1 \otimes \dots \otimes 0 \otimes \dots \otimes d_n \end{aligned}$$

Therefore, we can identify tensor $d_1 \otimes \dots \otimes 0 \otimes \dots \otimes d_n$ with zero $0 \otimes \dots \otimes 0$. According to statement of theorem product equal $0 \otimes \dots \otimes 0$ if only one of factors equal $0 \otimes \dots \otimes 0$. Tensor $e_1 \otimes \dots \otimes e_n$ unit of product. $\square$

12.2. Tensor Product of Division Rings

Let $D_1, \dots, D_n$ be division rings of characteristic 0. Let F be field which for any $i, i = 1, \dots, n$ is subring of center $Z(R_i)$. Tensor

$$(a_1 \otimes \dots \otimes a_n)^{-1} = (a_1)^{-1} \otimes \dots \otimes (a_n)^{-1}$$

is inverse tensor to tensor

$$a_1 \otimes \dots \otimes a_n \in D_1 \otimes \dots \otimes D_n$$

However **tensor product $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$ of division rings $D_1, \dots, D_n$** , in general, is not division ring, because we cannot answer on following question. Does element

$$p(a_1 \otimes \dots \otimes a_n) + q(b_1 \otimes \dots \otimes b_n)$$

have inverse one?

Remark 12.2.1. Representation of tensor as

$$(12.2.1) \quad a^s d_{s,1} \otimes \dots \otimes d_{s,n}$$

is ambiguous. Since $r \in F$, then

$$(d_1 r) \otimes d_2 = d_1 \otimes (r d_2)$$

We can increase or decrease number of summands using algebraic operations. Following transformation

$$\begin{aligned}
 & d_1 \otimes d_2 + c_1 \otimes c_2 \\
 &= d_1 \otimes (d_2 - c_2 + c_2) + c_1 \otimes c_2 \\
 &= d_1 \otimes (d_2 - c_2) + d_1 \otimes c_2 + c_1 \otimes c_2 \\
 &= d_1 \otimes (d_2 - c_2) + (d_1 + c_1) \otimes c_2
 \end{aligned}$$

is between possible transformations. $\square$

Let us consider following theorem for the purposes of illustration of remark 12.2.1.

Theorem 12.2.2. *Since in division ring D of characteristic 0 there exist elements a, b, c product of which is not commutative, then there exists nontrivial representation of zero tensor.*

PROOF. Proof of theorem follows from chain of equations

$$\begin{aligned}
 0 \otimes 0 &= a \otimes a - a \otimes a + b \otimes b - b \otimes b \\
 &= (a + c) \otimes a - c \otimes a - a \otimes (a - c) - a \otimes c \\
 &\quad + (b - c) \otimes b + c \otimes b - b \otimes (b + c) + b \otimes c \\
 &= (a + c) \otimes a - a \otimes (a - c) + (b - c) \otimes b \\
 &\quad + c \otimes (b - a) - b \otimes (b + c) + (b - a) \otimes c
 \end{aligned}$$

$\square$

From ambiguity of representation of tensor follows that we must to find canonical representation of tensor. We can find answer of this problem in case of tensor product of division rings. Let division ring D_i be vector space over field $F \subset Z(D_i)$. Let this vector space have finite basis $\bar{e}_{i \cdot s_i}, s_i \in S_i, |S_i| = m_i$. Therefore, any element f_i of division ring D_i has expansion

$$f_i = e_{i \cdot s_i} f_i^{s_i}$$

In this case we can write tensor (12.2.1) in form

$$(12.2.2) \quad a^s (f_{s \cdot 1}^{s_1} \bar{e}_{1 \cdot s_1}) \otimes \dots \otimes (f_{s \cdot n}^{s_n} \bar{e}_{n \cdot s_n})$$

where $a^s, s f_1^{s_1} \in F$. We can reduce expression (12.2.2)

$$(12.2.3) \quad a^s f_{s \cdot 1}^{s_1} \dots f_{s \cdot n}^{s_n} \bar{e}_{1 \cdot s_1} \otimes \dots \otimes \bar{e}_{n \cdot s_n}$$

Let

$$a^s f_{s \cdot 1}^{s_1} \dots f_{s \cdot n}^{s_n} = f^{s_1 \dots s_n}$$

Then equation (12.2.3) has form

$$(12.2.4) \quad f^{s_1 \dots s_n} \bar{e}_{1 \cdot s_1} \otimes \dots \otimes \bar{e}_{n \cdot s_n}$$

Expression (12.2.4) is defined unique up to selected basis. Expression $f^{s_1 \dots s_n}$ is called **standard component of tensor**.

12.3. Tensor Product of D_*^* -Vector Spaces

Let $D_1, \dots, D_n$ be division rings of characteristic 0.^{12.2} Let $\bar{V}_i$ be D_{i*}^* -vector space, $i = 1, \dots, n$. Let us consider category $\mathcal{A}$ whose objects are polylinear maps

$$\bar{f} : \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n \longrightarrow \bar{W}_1 \quad \bar{g} : \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n \longrightarrow \bar{W}_2$$

where $\bar{W}_1, \bar{W}_2$ are D_* -modules over ring $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$. We define morphism $\bar{f} \rightarrow \bar{g}$ to be additive map $\bar{h} : \bar{W}_1 \rightarrow \bar{W}_2$ making diagram

$$\begin{array}{ccc} & & \bar{W}_1 \\ & \nearrow \bar{f} & \downarrow \bar{h} \\ \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n & & \bar{W}_2 \\ & \searrow \bar{g} & \end{array}$$

commutative. Universal object $\bar{V}_1 \otimes \dots \otimes \bar{V}_n$ of category $\mathcal{A}$ is called **tensor product of D_* -vector spaces** $\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n$.

Theorem 12.3.1. *There exists tensor product of D_* -vector spaces.*

PROOF. Let F be field which for any $i, i = 1, \dots, n$, is subring of center $Z(D_i)$.

Let D be free vector space over ring F generated by product $D_1 \times \dots \times D_n$ of multiplicative semigroups of division rings $D_1, \dots, D_n$. Injection

$$i' : D_1 \times \dots \times D_n \longrightarrow D$$

is defined according to rule

$$(12.3.1) \quad i'(d_1, \dots, d_n) = (d_1, \dots, d_n)$$

and is homomorphism of multiplicative semigroup of ring $D_1 \times \dots \times D_n$ onto basis of module D . Therefore, product of vectors of basis is defined componentwise

$$(12.3.2) \quad (d_1, \dots, d_n)(c_1, \dots, c_n) = (d_1 c_1, \dots, d_n c_n)$$

According to theorem 12.1.1 the structure of ring is defined on vector space D .

Let us consider direct product $F \times D$ of field F and ring D . We will identify element (f, e) with element $f \in F$ and element $(1, d)$ with element $d \in D$.

Let $\bar{M}$ be free module over ring $F \times D$ generated by Cartesian product $\bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n$. Since $\bar{v}_1 \in \bar{V}_1, \dots, \bar{v}_n \in \bar{V}_n$, then we denote corresponding vector from $\bar{M}$ as $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n)$. Let

$$\bar{i} : \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n \longrightarrow \bar{M}$$

be injection defined according to rule

$$(12.3.3) \quad \bar{i}(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n) = (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n)$$

^{12.2}I give definition of tensor product of D_*^* -vector spaces following to definition in [1], p. 601 - 603.

Let $\overline{N} \subset \overline{M}$ be vector subspace generated by elements of the following type

$$(12.3.4) \quad (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i + \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n) - (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) - (\overline{v}_1, \dots, \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.3.5) \quad (\overline{v}_1, \dots, a\overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) - a(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.3.6) \quad (a_1, \dots, a_n)(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) - (a_1\overline{v}_1, \dots, a_n\overline{v}_n)$$

where $\overline{v}_i, \overline{w}_i \in \overline{V}_i$, $a \in F$, $a_i \in D_i$. Let

$$\overline{j} : \overline{M} \rightarrow \overline{M}/\overline{N}$$

be canonical map on factor module. Let us consider commutative diagram

$$(12.3.7) \quad \begin{array}{ccc} & & \overline{M}/\overline{N} \\ & \nearrow \overline{f} & \\ \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\overline{i}} & \overline{M} \\ & \searrow \overline{j} & \end{array}$$

Since elements (12.3.4) and (12.3.5) belong to kernel of linear map $\overline{j}$, then from equation (12.3.3) it follows

$$(12.3.8) \quad \overline{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i + \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n) = \overline{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) + \overline{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.3.9) \quad \overline{f}(\overline{v}_1, \dots, a\overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) = a\overline{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

From equations (12.3.8) and (12.3.9) it follows that map f is polylinear over field F . Since $\overline{M}$ is module with basis $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$, then according to theorem [1]-4.1, on p. 135 for any module $\overline{V}$ and any polylinear over F map

$$\overline{g} : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \longrightarrow \overline{V}$$

there exists a unique homomorphism $\overline{k} : \overline{M} \rightarrow \overline{V}$, for which following diagram is commutative

$$(12.3.10) \quad \begin{array}{ccc} \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\overline{i}} & \overline{M} \\ & \searrow \overline{g} & \downarrow \overline{k} \\ & & \overline{V} \end{array}$$

Since $\overline{g}$ is polylinear over F , then $\ker \overline{k} \subseteq \overline{N}$. According to statement on p. [1]-119 map $\overline{j}$ is universal in the category of homomorphisms of module $\overline{M}$ whose kernel contains $\overline{N}$. Therefore, we have homomorphism

$$\overline{h} : \overline{M}/\overline{N} \rightarrow \overline{V}$$

which makes the following diagram commutative

$$(12.3.11) \quad \begin{array}{ccc} & \overline{M}/\overline{N} & \\ & \downarrow \overline{h} & \\ \overline{M} & \xrightarrow{\overline{j}} & \overline{M}/\overline{N} \\ & \searrow \overline{k} & \downarrow \\ & & \overline{V} \end{array}$$

We join diagrams (12.3.7), (12.3.10), (12.3.11), and get commutative diagram

(12.3.12)

$$\begin{array}{ccccc}
 & & & \overline{M}/\overline{N} & \\
 & \nearrow \overline{f} & & \downarrow \overline{h} & \\
 \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\overline{i}} & \overline{M} & \nearrow \overline{j} & \\
 & \searrow \overline{g} & & \downarrow \overline{k} & \\
 & & & \overline{V} &
 \end{array}$$

Since $\text{Im } \overline{f}$ generates $\overline{M}/\overline{N}$, then map $\overline{h}$ is uniquely determined. $\square$

According to proof of theorem 12.3.1

$$\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n = \overline{M}/\overline{N}$$

If $\overline{v}_i \in \overline{V}_i$, we write

$$(12.3.13) \quad \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n = \overline{j}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$$

From equations (12.3.3) and (12.3.13) it follows

$$(12.3.14) \quad \overline{p}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) = \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n$$

We can write equations (12.3.8) and (12.3.9) as

$$(12.3.15) \quad \begin{aligned} & \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes (\overline{v}_i + \overline{w}_i) \otimes \dots \otimes \overline{v}_n \\ &= \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_i \otimes \dots \otimes \overline{v}_n + \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{w}_i \otimes \dots \otimes \overline{v}_n \end{aligned}$$

$$(12.3.16) \quad \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes (a\overline{v}_i) \otimes \dots \otimes \overline{v}_n = a(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_i \otimes \dots \otimes \overline{v}_n)$$

Theorem 12.3.2. *Tensor product $\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n$ is module over tensor product $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$.*

PROOF. To prove statement of theorem we prove that representation

$$(d_1 \otimes \dots \otimes d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) = (d_1, \dots, d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n)$$

of ring $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$ in module $\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n$ is defined properly. This follows from chain of equations

$$\begin{aligned} (d_1 \otimes \dots \otimes (ad_i) \otimes \dots \otimes d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) &= (d_1, \dots, ad_i, \dots, d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) \\ &= (d_1 \overline{v}_1) \otimes \dots \otimes (ad_i \overline{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \overline{v}_n) \\ &= a(d_1 \overline{v}_1) \otimes \dots \otimes (d_n \overline{v}_n) \\ &= a((d_1, \dots, d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n)) \\ &= a((d_1 \otimes \dots \otimes d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n)) \\ &= (a(d_1 \otimes \dots \otimes d_n))(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (d_1 \otimes \dots \otimes (d_i + c_i) \otimes \dots \otimes d_n)(\bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_n) \\
&= (d_1, \dots, d_i + c_i, \dots, d_n)(\bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_n) \\
&= (d_1 \bar{v}_1) \otimes \dots \otimes ((d_i + c_i) \bar{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \bar{v}_n) \\
&= (d_1 \bar{v}_1) \otimes \dots \otimes (d_i \bar{v}_i + c_i \bar{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \bar{v}_n) \\
&= (d_1 \bar{v}_1) \otimes \dots \otimes (d_i \bar{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \bar{v}_n) + (d_1 \bar{v}_1) \otimes \dots \otimes (c_i \bar{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \bar{v}_n) \\
&= (d_1 \bar{v}_1) \otimes \dots \otimes (d_i \bar{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \bar{v}_n) + (d_1 \bar{v}_1) \otimes \dots \otimes (c_i \bar{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \bar{v}_n) \\
&= (d_1, \dots, d_i, \dots, d_n)(\bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_n) + (d_1, \dots, c_i, \dots, d_n)(\bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_n) \\
&= (d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n)(\bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_n) + (d_1 \otimes \dots \otimes c_i \otimes \dots \otimes d_n)(\bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_n) \\
&= ((d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n) + (d_1 \otimes \dots \otimes c_i \otimes \dots \otimes d_n))(\bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_n)
\end{aligned}$$

□

12.4. Tensor Product of D -Vector Spaces

Let $D_1, \dots, D_n$ be division rings of characteristic 0.^{12.3} Let $\bar{V}_i$ be D_i -vector space, $i = 1, \dots, n$. Let us consider category $\mathcal{A}$ whose objects are polylinear maps

$$\bar{f} : \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n \longrightarrow \bar{W}_1 \quad \bar{g} : \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n \longrightarrow \bar{W}_2$$

where $\bar{W}_1, \bar{W}_2$ are modules over ring $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$. We define morphism $\bar{f} \rightarrow \bar{g}$ to be linear map $\bar{h} : \bar{W}_1 \rightarrow \bar{W}_2$, making diagram

$$\begin{array}{ccc}
& & \bar{W}_1 \\
& \nearrow \bar{f} & \downarrow \bar{h} \\
\bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n & & \\
& \searrow \bar{g} & \downarrow \\
& & \bar{W}_2
\end{array}$$

commutative Universal object $\bar{V}_1 \otimes \dots \otimes \bar{V}_n$ of category $\mathcal{A}$ is called **tensor product of D -vector spaces** $\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n$.

Theorem 12.4.1. *There exists tensor product of D -vector spaces.*

PROOF. Let F be field which for any $i, i = 1, \dots, n$, is subring of center $Z(D_i)$.

Let D be free vector space over ring F generated by product $D_1 \times \dots \times D_n$ of multiplicative semigroups of division rings $D_1, \dots, D_n$. Injection

$$i' : D_1 \times \dots \times D_n \longrightarrow D$$

is defined according to rule

$$(12.4.1) \quad i'(d_1, \dots, d_n) = (d_1, \dots, d_n)$$

and is homomorphism of multiplicative semigroup of ring $D_1 \times \dots \times D_n$ onto basis of module D . Therefore, product of vectors of basis is defined componentwise

$$(12.4.2) \quad (d_1, \dots, d_n)(c_1, \dots, c_n) = (d_1 c_1, \dots, d_n c_n)$$

According to theorem 12.1.1 the structure of ring is defined on vector space D .

^{12.3}I give definition of tensor product of D -vector spaces following to definition in [1], p. 601 - 603.

Let us consider direct product $F \times D$ of field F and ring D . We will identify element (f, e) with element $f \in F$ and element $(1, d)$ with element $d \in D$.

Let $\overline{M}$ be free module over ring $F \times D$ generated by Cartesian product $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$. Since $\overline{v}_1 \in \overline{V}_1, \dots, \overline{v}_n \in \overline{V}_n$, then we denote corresponding vector from $\overline{M}$ as $(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$. Let

$$\overline{i} : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \longrightarrow \overline{M}$$

be injection defined according to rule

$$(12.4.3) \quad \overline{i}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) = (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$$

Let $\overline{N} \subset \overline{M}$ be vector subspace generated by elements of the following type

$$(12.4.4) \quad (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i + \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n) - (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) - (\overline{v}_1, \dots, \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.4.5) \quad (\overline{v}_1, \dots, a\overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) - a(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.4.6) \quad (a_1, \dots, a_n)(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) - (a_1\overline{v}_1, \dots, a_n\overline{v}_n)$$

$$(12.4.7) \quad (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)(a_1, \dots, a_n) - (\overline{v}_1a_1, \dots, \overline{v}_na_n)$$

where $\overline{v}_i, \overline{w}_i \in \overline{V}_i, a \in F, a_i \in D_i$. Let

$$\overline{j} : \overline{M} \rightarrow \overline{M}/\overline{N}$$

be canonical map on factor module. Let us consider commutative diagram

$$(12.4.8) \quad \begin{array}{ccc} & & \overline{M}/\overline{N} \\ & \nearrow \overline{f} & \\ \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\overline{i}} \overline{M} & \searrow \overline{j} \end{array}$$

Since elements (12.4.4) and (12.4.5) belong to kernel of linear map $\overline{j}$, then from equation (12.4.3) it follows

$$(12.4.9) \quad \overline{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i + \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n) = \overline{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) + \overline{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.4.10) \quad \overline{f}(\overline{v}_1, \dots, a\overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) = a\overline{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

From equations (12.4.9) and (12.4.10) it follows that map f is polylinear over field F . Since $\overline{M}$ is module with basis $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$, then according to theorem [1]-4.1, on p. 135 for any module $\overline{V}$ and any polylinear over F map

$$\overline{g} : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \longrightarrow \overline{V}$$

there exists a unique homomorphism $\overline{k} : \overline{M} \rightarrow \overline{V}$, for which following diagram is commutative

$$(12.4.11) \quad \begin{array}{ccc} \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\overline{i}} \overline{M} & \\ & \searrow \overline{g} & \searrow \overline{k} \\ & & \overline{V} \end{array}$$

Since $\overline{g}$ is polylinear over F , then $\ker \overline{k} \subseteq \overline{N}$. According to statement on p. [1]-119 map $\overline{j}$ is universal in the category of homomorphisms of module $\overline{M}$ whose kernel contains $\overline{N}$. Therefore, we have homomorphism

$$\overline{h} : \overline{M}/\overline{N} \rightarrow \overline{V}$$

which makes the following diagram commutative

$$(12.4.12) \quad \begin{array}{ccc} & & \overline{M}/\overline{N} \\ & \nearrow \bar{j} & \downarrow \bar{h} \\ \overline{M} & & \overline{V} \\ & \searrow \bar{k} & \\ & & \end{array}$$

We join diagrams (12.4.8), (12.4.11), (12.4.12), and get commutative diagram

$$(12.4.13) \quad \begin{array}{ccccc} & & & & \overline{M}/\overline{N} \\ & & & \nearrow \bar{f} & \downarrow \bar{h} \\ & & \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \nearrow \bar{j} & \overline{M}/\overline{N} \\ & & \searrow \bar{g} & \searrow \bar{k} & \downarrow \bar{h} \\ & & \overline{M} & & \overline{V} \\ & & \nearrow \bar{i} & & \end{array}$$

Since $\text{Im } \bar{f}$ generates $\overline{M}/\overline{N}$, then map $\bar{h}$ is uniquely determined. $\square$

According to proof of theorem 12.4.1

$$\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n = \overline{M}/\overline{N}$$

If $\bar{v}_i \in \overline{V}_i$, we write

$$(12.4.14) \quad \bar{j}(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n) = \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_n$$

From equations (12.4.3) and (12.4.14) it follows

$$(12.4.15) \quad \bar{f}(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n) = \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_n$$

We can write equations (12.4.9) and (12.4.10) as

$$(12.4.16) \quad \begin{aligned} & \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes (\bar{v}_i + \bar{w}_i) \otimes \dots \otimes \bar{v}_n \\ &= \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_i \otimes \dots \otimes \bar{v}_n + \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{w}_i \otimes \dots \otimes \bar{v}_n \end{aligned}$$

$$(12.4.17) \quad \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes (a\bar{v}_i) \otimes \dots \otimes \bar{v}_n = a(\bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_i \otimes \dots \otimes \bar{v}_n)$$

Theorem 12.4.2. *Tensor product $\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n$ is bimodule over tensor product $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$.*

PROOF. Proof of statement of theorem is similar to proof of statement of theorem 12.3.2. $\square$

CHAPTER 13

References

- [1] Serge Lang, Algebra, Springer, 2002
- [2] S. Burris, H.P. Sankappanavar, A Course in Universal Algebra, Springer-Verlag (March, 1982),
eprint <http://www.math.uwaterloo.ca/~snburris/htdocs/ualg.html>
(The Millennium Edition)
- [3] P. K. Rashevsky, Riemann Geometry and Tensor Calculus,
Moscow, Nauka, 1967
- [4] A. G. Kurosh, Lectures on General Algebra, Chelsea Pub Co, 1965
- [5] Lev V. Sabinin, Smooth Quasigroups and Loops, Kluwer Academic Publisher, 1999
- [6] Granino A. Korn, Theresa M. Korn, Mathematical Handbook for Scientists and Engineer, McGraw-Hill Book Company, New York, San Francisco, Toronto, London, Sydney, 1968
- [7] I. Gelfand, S. Gelfand, V. Retakh, R. Wilson, Quasideterminants,
eprint [arXiv:math.QA/0208146](https://arxiv.org/abs/math.QA/0208146) (2002)
- [8] I. Gelfand, V. Retakh, Quasideterminants, I,
eprint [arXiv:q-alg/9705026](https://arxiv.org/abs/q-alg/9705026) (1997)
- [9] Carl Faith, Algebra: Rings, Modules and Categories I, Springer - Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 1973
- [10] Aleks Kleyn, Introduction into Geometry over Division Ring,
eprint [arXiv:0906.0135](https://arxiv.org/abs/0906.0135) (2010)
- [11] Aleks Kleyn, Representation of $\mathfrak{F}$ -Algebra,
eprint [arXiv:0912.3315](https://arxiv.org/abs/0912.3315) (2009)
- [12] Aleks Kleyn, The Matrix of Linear Mappings,
eprint [arXiv:1001.4852](https://arxiv.org/abs/1001.4852) (2010)
- [13] Aleks Kleyn, Linear Mappings of Free Algebra,
eprint [arXiv:1003.1544](https://arxiv.org/abs/1003.1544) (2010)
- [14] Paul M. Cohn, Universal Algebra, Springer, 1981
- [15] I. M. Gelfand, M. I. Graev, Representation of Quaternion Groups over Locally Compact and Functional Fields,
Funct. Anal. Appl. **2** (1968) 19 - 33;
Izrail Moiseevich Gelfand, Semen Grigorevich Gindikin,
Izrail M. Gelfand: Collected Papers, volume II, 435 - 449,
Springer, 1989
- [16] Sir William Rowan Hamilton, The Mathematical Papers, Vol. III, Algebra,
Cambridge at the University Press, 1967

CHAPTER 14

Index

- 1- $\ast$ - D -form [81](#)
- $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ - $\ast$ -quasideterminant [21](#)
- active $\ast T$ -representation [73](#)
- active transformation on the set of $\ast\ast D$ -bases [73](#)
- alternative representation of matrix [13](#)
- associative law for covariant $\ast T$ -representation [40](#)
- associative law for covariant $T\ast$ -representation [39](#)
- associative law for $D\ast$ -vector space [48](#)
- associative law for $\ast\ast D$ -linear maps of vector spaces [55](#)
- associative law for twin representations [83](#)
- automorphism of representation of $\mathfrak{F}$ -algebra [38](#)
- norm of quaternion [112](#)
- basis manifold of $\ast\ast D$ -vector space [73](#)
- biring [16](#)
- $\ast$ -row of matrix [14](#)
- $\ast$ -rows $\ast\ast D$ -vector space [52](#)
- c -row of matrix [14](#)
- category of $T\ast$ -representations of Ω_1 -algebra A [37](#)
- category of $T\ast$ -representations of Ω_1 -algebra from category $\mathcal{A}$ [32](#)
- center of ring D [95](#)
- component of linear map f of division ring [101](#)
- component of linear map of D -vector space [122](#)
- component of polylinear map of division ring [107](#)
- contravariant $\ast T$ -representation of group [40](#)
- contravariant $T\ast$ -representation of group [40](#)
- coordinate matrix of set of vectors in $D\ast\ast$ -rows vector space [53](#)
- coordinate matrix of set of vectors in $\ast\ast D$ -rows vector space [52](#)
- coordinate matrix of vector in $D\ast\ast$ -basis [51](#)
- coordinate $\ast\ast D$ -isomorphism [51](#)
- coordinate $\ast\ast D$ -vector space [51](#)
- coordinate representation in $\ast\ast D$ -vector space [75](#)
- coordinates of geometric object in coordinate $\ast\ast D$ -vector space [76](#)
- coordinates of geometric object in $\ast\ast D$ -vector space [76](#)
- coordinates of representation [75](#)
- coordinates of set of vectors in $D\ast\ast$ -vector space [53](#)
- coordinates of set of vectors in $\ast\ast D$ -vector space [52](#)
- coordinates of vector in $\ast\ast D$ -basis [51](#)
- covariant $\ast T$ -representation of group [40](#)
- covariant $T\ast$ -representation of group [39](#)
- $\ast\ast$ -inverse element of biring [18](#)
- $\ast\ast$ -matrix group [66](#)
- $\ast\ast$ -power [17](#)
- $\ast\ast$ -product of matrices [16](#)
- $\ast\ast D$ -vector space [50](#)
- $\ast$ -rows $D\ast\ast$ -vector space [53](#)
- D -vector space [84](#)
- $D\ast\ast$ -vector space [50](#)
- dimension of $\ast\ast D$ -vector space [70](#)
- direct product of D -vector spaces [92](#)
- direct product of division rings [89](#)
- direct product of $\ast\ast D$ -vector spaces [91](#)
- direct product of $T\ast$ -representations of group [42](#)
- distributive law for $D\ast\ast$ -vector space [48](#)
- $D\ast\ast$ -basis of $\ast$ -rows vector space [53](#)
- $D\ast\ast$ -representation of group [71](#)
- $D\ast\ast$ -vector [53](#)
- $D\ast\ast$ -vector space [49](#)
- $D\ast\ast$ -component of coordinates of vector $\overline{v}$ [85](#)
- $D\ast\ast$ -vector space [48](#)
- $D\ast\ast$ -product of vector over scalar [48](#)
- dual space of $\ast\ast D$ -vector space [82](#)
- duality principle for biring [18](#)
- duality principle for biring of matrices [19](#)
- $\ast\ast D$ -basis for $\ast$ -rows vector space [52](#)

- $\ast\ast D$ -linear span in vector space 57
- effective representation of division ring 48
- effective representation of Ω -algebra A 26
- effective $T\ast$ -representation of group 43
- endomorphism of representation of $\mathfrak{F}$ -algebra 38
- extended matrix of $D\ast$ -linear equations 63
- extended matrix of $\ast\ast D$ -linear equations 63
- free $T\ast$ -representation of group 43
- generator of linear mapping 101
- geometric object defined in $\ast\ast D$ -vector space 76
- geometric object in coordinate representation defined in $\ast\ast D$ -vector space 76
- geometric object of type A in vector space 76
- Hadamard inverse of matrix 15
- homogeneous space of group 43
- isomorphism of representations of Ω -algebra 36
- kernel of inefficiency of $T\ast$ -representation of group G 43
- kernel of linear mapping of D -vector space 124
- kernel of linear mapping of division ring 105
- Kronecker symbol 15
- left module 47
- left shift on group 41
- left vector space 48
- left-side representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra M 25
- left-side transformation 25
- linear map of D -vector spaces over field F 121
- linear mapping of division ring 99
- linear mapping of division ring generated by mapping G 101
- little group 43
- loop of automorphisms of representation 38
- mapping of rings polylinear over commutative ring 106
- matrix of $\ast\ast D$ -linear mapping 54
- morphism of representations from f into g 27
- morphism of representations of Ω_1 -algebra in Ω_2 -algebra 27
- nonsingular system of $\ast\ast D$ -linear equations 59
- nonsingular transformation 40
- orbit of $T\ast$ -representation of group 41
- partial linear mapping of variable v^i 122
- passive $\ast T$ -representation 74
- passive transformation on the set of $\ast\ast D$ -bases 74
- polylinear mapping of (n) - D -vector spaces 124
- polylinear skew symmetric map 109
- polylinear symmetric map 108
- product of geometric object and constant 77
- product of groups 89
- product of morphisms of representations of universal algebra 31
- product of objects in category 88
- quaternion algebra E over the field F 112
- $D\ast$ -basis dual to $\ast\ast D$ -basis of vector space 82
- $\binom{j}{i}$ - $\ast\ast$ -quasideterminant 21
- $\ast$ -row of matrix 14
- r -row of matrix 14
- $\ast$ -inverse element of biring 18
- $\ast$ -major minor 59
- $\ast\ast$ -matrix group 66
- $\ast\ast$ -nonsingular matrix 59
- $\ast$ -power 17
- $\ast\ast$ -product of matrices 15
- $\ast\ast$ -quasideterminant 21
- $\ast\ast$ -rank of matrix 59
- $\ast\ast$ -singular matrix 59
- $\ast\ast D$ -automorphism of vector space 70
- $\ast\ast D$ -basis for vector space 51
- $\ast\ast D$ -isomorphism of vector spaces 70
- $\ast\ast D$ -linear map of vector spaces 54
- $\ast\ast D$ -linear $T\ast$ -representation of group 71
- $\ast\ast D$ -linearly dependent vectors 51
- $\ast\ast D$ -linearly independent vectors 51
- $\ast\ast D$ -vector 52
- $\ast\ast D$ -vector space 50
- representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra M 26
- right module 47
- right shift on group 41
- right vector space 48
- right-side representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -algebra M 25
- right-side transformation 25
- ring has characteristic 0 95
- ring has characteristic p 95
- $R\ast$ -module 47
- $D\ast$ -product of $\ast\ast D$ -linear map A over scalar 80
- $(\ast S, \ast T)$ -linear map of vector spaces 54
- single transitive representation of Ω -algebra A 26
- singular linear mapping of D -vector space 124

singular linear mapping of division ring 105
 space of orbits of $T\star$ -representation 42
 $(S\star, \star T)$ -bimodule 87
 stability group 43
 standard component of polylinear map f of
 division ring 107
 standard component of tensor 131
 standard coordinates of $\star\star D$ -basis 74
 standard F -component of linear mapping f
 102
 standard F -representation of linear
 mapping of division ring 102
 standard representation of matrix 13
 standard representation of polylinear map
 of division ring 107
 $\star D$ -vector space 48
 $\star R$ -module 47
 $\star D$ -component of coordinates of vector $\bar{r}$ 85
 $\star T$ -representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -
 algebra M 25
 $\star T$ -shift 41
 $\star T$ -transformation 25
 structural constants of division ring D over
 field F 97
 sum of geometric objects 77
 sum of $\star\star D$ -linear maps 80
 symmetry group 73
 system of $D\star$ -linear equations 58
 system of $\star\star D$ -linear equations 57

 tensor product of D -vector spaces 135
 tensor product of division rings 130
 tensor product of $D\star$ -vector spaces 132
 tensor product of rings over commutative
 ring 128
 transformation coordinated with
 equivalence 32
 transformation of universal algebra 25
 transitive representation of Ω -algebra A 26
 $T\star$ -linear composition of vectors 49
 $T\star$ -matrices vector space 49
 $T\star$ -representation of Ω_1 -algebra A in Ω_2 -
 algebra M 25
 $T\star$ -shift 41
 $T\star$ -transformation 25
 twin representations of division ring 83
 twin representations of group 45

 unitarity law for $D\star$ -vector space 48

 vector space type 49

Special Symbols and Notations

${}^j \det(A, *)_i$ $(\frac{a}{b})$ -*-quasideterminant 21

${}^b A_a$ minor 14

A_T minor 14

${}^S A$ minor 14

$A[a]$ minor 14

$A[T]$ minor 14

${}^{[b]} A$ minor 14

${}^{[S]} A$ minor 14

A_a *-row (c -row) of matrix 14

$A_{s \cdot p \cdot i}^j$ component of linear map $\bar{A}$ of D -vector space 122

A^{n*} *-power of element A of biring 17

A^{-1*} *-inverse element of biring 18

$A * B$ *-product of matrices 16

${}^j \det(A, **)_i$ $(\frac{j}{i})$ -*-quasideterminant 21

$\mathfrak{A}(f)$ loop of automorphisms of representation f 38

A_i^j partial linear map of variable v^i 122

${}^b A$ *-row (r -row) of matrix 14

A^{n*} *-power of element A of biring 17

A^{-1*} *-inverse element of biring 18

$A * B$ *-product of matrices 15

$\det(a, *)$ *-quasideterminant 21

$a = \begin{pmatrix} 1a \\ \dots \\ na \end{pmatrix}$ *- D -vector 52

$\mathcal{L}(D_1; D_2)$ set of linear maps of division ring D_1 into division ring D_2 101

$\mathcal{L}(R_1, \dots, R_n; S)$ set of polylinear mappings of rings $R_1, \dots, R_n$ into module S 106

$*t$ right shift 41

t_* left shift 41

$\mathcal{B}(\bar{V}, G)$ basis manifold of *- D -vector space $\mathcal{V}$ 73

$B_1 \times \dots \times B_n$ product of objects $B_1, \dots, B_n$ in category $\mathcal{A}$ 88

B_{ij}^k structural constants of division ring D over field F 97

$D_1 \times \dots \times D_n$ direct product of division rings $D_1, \dots, D_n$ 89

D_n^m matrices vector space 49

D_n *-rows D_* -vector space 53

$D_1 \otimes \dots \otimes D_n$ tensor product of division rings 130

$R_1 \otimes \dots \otimes R_n$ tensor product of rings 128

$D*$ vector space type 49

$\bar{e} = (\bar{e}_i, i \in I)$ basis of vector space 51

$(\bar{e}_{1 \cdot i_1}, \dots, \bar{e}_{n \cdot i_n})$ basis of (n) -vector space 91

$E(F, a, b)$ quaternion algebra over the field F 112

${}^i f_j$ coordinates of basis in *-rows *- D -vector space 52

${}^i f_j$ coordinates of basis in *-rows D_* -vector space 53

$\bar{f} = \begin{pmatrix} \bar{f}_1 & \dots & \bar{f}_n \end{pmatrix}$ basis for *-rows *- D -vector space 52

$\bar{f} = \begin{pmatrix} {}^1 \bar{f} & \dots & {}^n \bar{f} \end{pmatrix}$ basis for *-rows D_* -vector space 53

$f_{k \cdot s_k \cdot p}$ component of linear map f of division ring 101

$s \cdot p f^n$ component of polylinear map of division ring 107

$f(G)v$ representation orbit of group G 41

f_G^{ij} standard F -component of linear mapping f 102

$f_t^{i_0 \dots i_n}$ standard component of polylinear map f of division ring 107

$f^{s_1 \dots s_n}$ standard component of tensor 131

GL_n^{*D} *-matrix group 66

G_x little group of x 43

vG orbit of effective covariant $*T$ -representation of group 44

Gv orbit of effective covariant $T*$ -representation of group 44

$G_1 \times \dots \times G_n$ product of groups $G_1, \dots, G_n$ 89

GL_n^{*D} $*$ -matrix group 66

G_x stability group of x 43

HA Hadamard inverse of matrix 15

H quaternion algebra over real field 112

$\ker \overline{A}$ kernel of linear mapping of D -vector space 124

$\ker f$ kernel of linear mapping of division ring 105

$\overline{e}_*^* A$ passive transformation 74

$\mathcal{L}(D_*^*; \overline{V}; \overline{W})$ $*$ - D -vector space of D_*^* -linear maps of D_*^* -vector space $\overline{V}$ into D_*^* -vector space $\overline{W}$ 79

$\mathcal{L}(D; \overline{V}; \overline{W})$ set of linear mappings of D -vector space $\overline{V}$ into D -vector space $\overline{W}$ 121

$\mathcal{L}(D; \overline{V}_1, \dots, \overline{V}_n; \overline{W}_1, \dots, \overline{W}_m)$ set of polylinear mappings 125

$\mathcal{L}(*D; \overline{V}; \overline{W})$ D_*^* -vector space of $*$ - D -linear maps of $*$ - D -vector space $\overline{V}$ into $*$ - D -vector space $\overline{W}$ 79

$\mathcal{L}(*T; S; R)$ set of $*T$ -representations of division ring S in additive group of division ring R 79

$\mathcal{L}(T*; S; R)$ set of $T*$ -representations of division ring S in additive group of division ring R 79

M^* set of $*T$ -transformations of set M 25

$*M$ set of transformations of set M 26

$*M$ set of $T*$ -transformations of set M 25

$M/*t(G)$ space of orbits of effective $*T$ -covariant representation of the group 44

$M/t_*(G)$ space of orbits of effective $T*$ -covariant representation of the group 44

$M/f(G)$ space of orbits of $T*$ -representation f of group G in set M 42

$(A(G)^{-1*} * w, \overline{e}_{\overline{V}} * G)$ geometric object in coordinate representation defined in $*$ - D -vector space 76

$(A(G)^{-1*} * w, \overline{e}_{\overline{N}} * A(G), \overline{e}_{\overline{V}} * G)$ geometric object defined in $*$ - D -vector space 76

$A_*^* \overline{e}$ active transformation 73

D^n $*$ -rows $*$ - D -vector space 52

$\text{rank}_* A$ $*$ -rank of matrix 63

r^* $D*$ -component of coordinates of vector $\overline{r}$ 85

$\text{rank}_* A$ $*$ -rank of matrix 59

$*r$ $*D$ -component of coordinates of vector $\overline{r}$ 85

$\text{span}(\overline{A}_i, i \in I)$ linear span in vector space 57

$T * A$ category of $T*$ -representations of Ω_1 -algebra A 37

$T * \mathcal{A}$ category of $T*$ -representations of Ω_1 -algebra from category $\mathcal{A}$ 32

$\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$ direct product of $*$ - D_i -vector spaces $\overline{V}_1, \dots, \overline{V}_n$ 91

$\overline{V}^*$ dual space of $*$ - D -vector space $\overline{V}$ 82

$D_*^* \overline{V}$ D_*^* -vector space 50

$D_*^* \overline{V}$ D_*^* -vector space 49

$\overline{V}_{*D}$ $*$ - D -vector space 50

$\overline{V}_{*D}$ $*$ - D -vector space 50

$\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n$ tensor product of D -vector spaces 135

$\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n$ tensor product of $D*$ -vector spaces 132

$Z(D)$ center of ring D 95

δ identical transformation 25

δ_j^i Kronecker symbol 15

$\prod_{i \in I} D_i$ direct product of division rings D_i , $i \in I$ 89

$\prod_{i=1}^n D_i$ direct product of division rings $D_1, \dots, D_n$ 89

$\prod_{i \in I} \overline{V}_i$ direct product of $*$ - D_i -vector spaces $\overline{V}_i$, $i \in I$ 91

$\prod_{i=1}^n \overline{V}_i$ direct product of $*$ - D_i -vector spaces 91

$\prod_{i \in I} G_i$ product of groups G_i , $i \in I$ 88

$\prod_{i=1}^n G_i$ product of groups $G_1, \dots, G_n$ 89

$\prod_{i \in I} B_i$ product of objects $\{B_i, i \in I\}$ in category $\mathcal{A}$ 88

$\prod_{i=1}^n B_i$ product of objects $B_1, \dots, B_n$ in category $\mathcal{A}$ 88

Лекции по линейной алгебре над телом

Александр Клейн

E-mail address: Aleks_Kleyn@MailAPS.org

URL: <http://sites.google.com/site/alekskleyn/>

URL: http://arxiv.org/a/kleyn_a_1

URL: <http://AleksKleyn.blogspot.com/>

Аннотация. В книге рассматриваются вопросы линейной алгебры над телом. Система линейных уравнений над телом имеет свойства, похожие на свойства систем линейных уравнений над полем. Тем не менее, некоммутативность произведения порождает новую картину.

Матрицы допускают две операции произведения, связанные операцией транспонирования. Бикольцо - это алгебра, определяющая на множестве две взаимосвязанные структуры кольца.

Подобно коммутативному случаю, решения системы линейных уравнений порождают правый или левое векторное пространство в зависимости от вида системы. Мы изучаем векторные пространства совместно с системами линейных уравнений потому, что существует тесная связь между их свойствами. Также как и в коммутативном случае, группа автоморфизмов векторного пространства имеет одно транзитивное представление на многообразии базисов, что даёт нам возможность определить пассивное и активное представления.

Изучение векторного пространства над телом раскрывает новые детали во взаимоотношении между пассивными и активными преобразованиями, делая картину более ясной.

Изучение парных представлений тела в абелевой группе приводит к концепции D -векторных пространств и их линейных отображений. На основе полилинейных отображений рассмотрено определение тензорного произведения колец и тензорное произведение D -векторных пространств.

Key words and phrases. алгебра, теория представлений, линейная алгебра, тело, квазидетерминант, бикольцо, система линейных уравнений, векторное пространство, многообразие базисов

Оглавление

Глава 1. Предисловие	5
1.1. Предисловие к изданию 1	5
1.2. Предисловие к изданию 2	7
1.3. Предисловие к изданию 3	8
1.4. Предисловие к изданию 5	10
1.5. Соглашения	12
Глава 2. Бикольцо матриц	15
2.1. Концепция обобщённого индекса	15
2.2. Бикольцо	17
2.3. Квазидетерминант	22
Глава 3. Представление универсальной алгебры	27
3.1. Представление универсальной алгебры	27
3.2. Морфизм представлений универсальной алгебры	29
3.3. Автоморфизм представления универсальной алгебры	40
3.4. Представление группы	41
3.5. Однотранзитивное $T\star$ -представление группы	46
Глава 4. Векторное пространство над телом	51
4.1. Векторное пространство	51
4.2. Тип векторного пространства	53
4.3. $\ast D$ -базис векторного пространства	55
4.4. $\ast D$ -линейное отображение векторных пространств	58
4.5. Система $\ast D$ -линейных уравнений	62
4.6. Ранг матрицы	64
4.7. Система $\ast D$ -линейных уравнений	68
4.8. Невырожденная матрица	70
4.9. Размерность $\ast D$ -векторного пространства	75
Глава 5. Многообразие $\ast D$ -базисов	77
5.1. $\ast D$ -линейное представление группы	77
5.2. Многообразие $\ast D$ -базисов векторного пространства	79
5.3. Геометрический объект в $\ast D$ -векторном пространстве	81
Глава 6. $\ast D$ -линейное отображение	85
6.1. $\ast D$ -линейное отображение	85
6.2. $1 - \ast D$ -форма на векторном пространстве	87
6.3. Парные представления тела	89
6.4. D -векторное пространство	91

Глава 7. Произведение представлений	93
7.1. Бимодуль	93
7.2. Прямое произведение тел	94
7.3. Прямое произведение D_* -векторных пространств	96
7.4. Морфизмы прямого произведения *D -векторных пространств	99
Глава 8. Геометрия тела	101
8.1. Центр тела	101
8.2. Геометрия тела над полем	103
Глава 9. Линейное отображение тела	105
9.1. Линейное отображение тела	105
9.2. Полилинейное отображение тела	112
Глава 10. Алгебра кватернионов	117
10.1. Линейная функция комплексного поля	117
10.2. Алгебра кватернионов	118
10.3. Линейная функция алгебры кватернионов	119
Глава 11. Линейное отображение D -векторных пространств	127
11.1. Линейное отображение D -векторных пространств	127
11.2. Полилинейное отображение D -векторного пространства	131
Глава 12. Тензорное произведение	133
12.1. Тензорное произведение колец	133
12.2. Тензорное произведение тел	136
12.3. Тензорное произведение D_* -векторных пространств	138
12.4. Тензорное произведение D -векторных пространств	141
Глава 13. Список литературы	145
Глава 14. Предметный указатель	146
Глава 15. Специальные символы и обозначения	149

Предисловие

1.1. Предисловие к изданию 1

Отправляясь в новое путешествие, не знаешь вначале, что ждёт тебя в пути. Знакомство с некоммутативной алгеброй началось с простого любопытства. В случае модуля над кольцом нельзя дать определение базиса подобно тому, как мы это делаем в случае векторного пространства над полем. Я хотел понять, как изменится картина, если вместо поля я буду рассматривать тело.

Прежде всего мне надо было научиться решать системы линейных уравнений. Я начал с системы двух уравнений с двумя неизвестными. Хотя решение было найдено легко, это решение нельзя выразить как отношение двух определителей.

Я понимал, что эта проблема интересует не только меня. Я начал искать математиков, интересующихся подобными задачами. Профессор Ретах познакомил меня со статьями [7, 8] по теории квазидетерминантов. Это было началом моего исследования в теории векторных пространств.

Глава 2 посвящена бикольцу матриц. Существует две причины, почему я рассматриваю эту алгебру.

Если в векторном пространстве задан базис, то преобразование можно описать с помощью матрицы. Произведению преобразований соответствует произведение матриц. В отличие от коммутативного случая мы не всегда можем представить это произведение в виде произведения строк первой матрицы на столбцы второй. В то же время запись элементов матрицы в виде

$$A = \begin{pmatrix} A_1^1 & \dots & A_n^1 \\ \dots & \dots & \dots \\ A_1^n & \dots & A_n^n \end{pmatrix}$$

является вопросом соглашения. Не нарушая общности, мы можем записать матрицу в виде

$$A = \begin{pmatrix} A_1^1 & \dots & A_1^n \\ \dots & \dots & \dots \\ A_n^1 & \dots & A_n^n \end{pmatrix}$$

Но тогда изменяется правило умножения матриц.

Конструкции подобные бикольцу известны в алгебре. В структуре определены операции $a \vee b$ и $a \wedge b$, которые меняются местами, если порядок на множестве меняется на противоположный. Симметрия между $*$ -произведением и * -произведением сформулирована в форме принципа двойственности. Впоследствии я распространяю принцип двойственности на теорию представлений и теорию векторных пространств. Без учёта принципа двойственности

эта книга была бы в четыре раза больше, не говоря о том, что бесконечные повторения текста сделали бы чтение текста невозможным.

Согласно каждому виду произведения мы можем расширить определение квазидетерминанта, данное в [7, 8], и определить два разных вида квазидетерминанта.

Глава 3 является обзором теории представлений и является базой для последующих глав. Мы распространим на представление алгебры соглашение, описанное в замечании 2.2.15. Теорема о существовании парных представлений в однородном пространстве завершает главу.

В главе 4 я изучаю несколько концепций линейной алгебры над телом D . Сперва я напоминаю определения векторного пространства и базиса.^{1.1} Линейная алгебра над телом более богата фактами по сравнению с линейной алгеброй над полем. В отличие от векторных пространств над полем, мы можем определить левое и правое векторное пространство над произвольным телом D . Чтобы дать более строгое определение базиса, я излагаю теорию произвольной системы линейных уравнений (раздел 4.5) для каждого типа векторного пространства. Тем не менее, не смотря на это разнообразие, утверждения линейной алгебры над телом очень похожи на утверждения из линейной алгебры над полем.

Так как я пользуюсь утверждениями этой главы в геометрии, я следую той же форме записи, что мы используем в геометрии. При записи координат вектора и элементов матрицы мы будем следовать соглашению, описанному в разделе 2.1.

Мы отождествляем вектор с набором его координат относительно некоторого базиса. Тем не менее, это различные объекты. Чтобы подчеркнуть это различие, я вернулся к традиционному обозначению вектора в форме $\vec{a}$, в тоже время мы будем пользоваться записью a^b для координат вектора $\vec{a}$.

Мы используем одну и ту же корневую букву для обозначения базиса и составляющих его векторов. Чтобы отличить вектор и базис, мы будем пользоваться обозначением $\vec{e}$ для базиса и обозначением $\vec{e}_a$ для векторов, составляющих базис $\vec{e}$.

Изучая теорию векторных пространств мы будем пользоваться соглашением, описанным в замечании 2.2.15 и в разделе 3.4.

Глава 5 посвящена теории линейных представлений.

Изучение однородного пространства группы симметрий D_*^* -векторного пространства ведёт нас к определению базиса этого D_*^* -векторного пространства и многообразия базисов. Мы вводим два типа преобразований многообразия базисов: активные и пассивные преобразования. Различие между ними состоит в том, что активное преобразование может быть выражено как преобразование исходного пространства. Как показано в [3], пассивное преобразование даёт возможность определить понятия инвариантности и геометрического объекта.

Опираясь на эту теорию, я изучаю многообразие базисов, пассивные и активные преобразования в разделе 5.2. Я рассматриваю геометрический объект в D_*^* -векторном пространстве в разделе 5.3.

^{1.1}Определения можно найти также в [9].

Мы имеем две противоположные точки зрения на геометрический объект. С одной стороны мы фиксируем координаты геометрического объекта относительно заданного базиса и указываем закон преобразования координат при замене базиса. В то же время мы рассматриваем всю совокупность координат геометрического объекта относительно различных базисов как единое целое. Это даёт нам возможность бескоординатного изучения геометрического объекта.

Глава 6 посвящена $*D$ -линейным отображениям векторных пространств над телом. Это явилось основой построения парных представлений кольца D . Несмотря на кажущуюся громоздкость, обозначения, которыми я пользуюсь в теории векторных пространств, опираются на существование парных представлений.

Линейная алгебра над телом более разнообразна по сравнению с линейной алгеброй над полем. Некоммутативность заставляет нас позаботиться о правильном порядке множителей в выражении. Это порождает не только разнообразие понятий, но также помогает лучше понять утверждения коммутативной алгебры.

Январь, 2007

1.2. Предисловие к изданию 2

Любой преступник рано или поздно совершает ошибку.

Когда детектив нашёл мою кепку на столе, он пришёл в ярость. В следующий раз был дождь, и я оставил мокрые следы на полу. Нечего говорить, опять пришлось начать сначала. И я начинал снова и снова. То тунгуский метеорит, то незапланированное затмение Солнца... Но в конце концов детектив не нашёл изъянов в дизайне.

- Крестики и нолики, - печально вздохнул детектив. - Вам не надоело кодировать эту игру? Пора уже заняться чем-то более серьёзным.

Автор неизвестен. Искусство программирования.

Научный поиск иногда напоминает программирование. Сложный и большой проект постепенно обрастает кодами. Всё кажется просто и понятно. Но вдруг появляется баг, исправление которого требует переделать почти половину кода. Впрочем, как заметил мудрец, в любой программе есть по крайней мере один баг.

Когда я начал исследование в области векторных пространств над телами, я понимал, что я ступаю на *terra incognita*. Концепция квазидетерминанта весьма облегчила мою задачу. Возможность решить систему линейных уравнений сделала эту теорию весьма похожей на теорию векторных пространств над полями. Это дало возможность построить базис и расширить концепцию геометрического объекта.

Тёмным облаком встали на горизонте двухвалентные тензоры. Казалось, некоммутативность накладывает на их структуру непреодолимые ограничения. Но именно в эту минуту я увидел свет в туннеле.

Изучение D_* -линейных отображений приводит к концепции парных представлений тела в абелевой группе. Абелева группа, в которой определено парное представление тела D , называется D -векторным пространством. Поскольку умножение на элементы тела D определено и слева, и справа, гомоморфизмы D -векторных пространств не могут сохранять эту операцию. Это приводит к концепции аддитивного отображения, которое является морфизмом D -векторных пространств.^{1.2}

D -векторное пространство является наиболее удачным претендентом для построения тензорной алгебры. Однако здесь потребовалась ещё одна важная конструкция.

Когда мы имеем дело с кольцами, мы изучаем не только модули, левые или правые, но и бимодули. Тело не является исключением. Но если добавить сюда концепцию бикольца, становится очевидным, что мне без разницы, с какой стороны умножать. Как следствие, оказывается, что бивекторное пространство - это частный случай прямого произведения D_* -векторных пространств. Мы не можем определить полилинейное отображение. Однако рассмотрение полиадитивных отображений прямого произведения D_* -векторных пространств приводит к определению тензорного произведения. Таким образом, можно построить тензора произвольной природы.

Статья эта построена таким образом, чтобы воспроизвести моё непростое и интересное путешествие в мир тензоров над телом.

Март, 2009

1.3. Предисловие к изданию 3

Алгебра кватернионов - самый простой пример тела. Поэтому я проверяю полученные мной теоремы в алгебре кватернионов, чтобы увидеть как они работают. Алгебра кватернионов похожа на поле комплексных чисел и поэтому естественно искать некоторые параллели.

В поле действительных чисел любое аддитивное отображение автоматически оказывается линейным над полем действительных чисел. Это связано с тем, что поле действительных чисел является пополнением поля рациональных чисел и является следствием теоремы 9.1.3.

Однако в случае комплексных чисел ситуация меняется. Не всякое аддитивное отображение поля комплексных чисел оказывается линейным над полем комплексных чисел. Операция сопряжения - простейший пример такого отображения. Когда я обнаружил этот крайне интересный факт, я вернулся к вопросу об аналитическом представлении аддитивного отображения.

^{1.2}Построение аддитивного отображения, выполненное при доказательстве теоремы 11.1.4, весьма поучительно методически. С того самого момента, когда я начал изучать дифференциальную геометрию, я признал факт, что всё сводится к тензорам, что компоненты тензора нумеруются с помощью индексов и эта связь неразрывна. В тот момент, когда это оказалось не так, я оказался не готов признать это. Понадобился месяц прежде, чем я смог записать выражение, которое я видел глазами, но которое я не мог записать до этого, так как пытался выразить его в тензорной или операторной форме.

Изучая аддитивные отображения, я понял, что я слишком резко расширил множество линейных отображений при переходе от поля к телу. Причиной этому было не вполне ясное понимание как преодолеть некоммутативность произведения. Однако в процессе построений становилось всё более очевидным, что любое аддитивное отображение линейно над некоторым полем. Впервые эта концепция появилась при построении тензорных произведений и отчётливо проявилась в последующем исследовании.

При построении тензорного произведения тел $D_1, \dots, D_n$ я предполагаю существование поля F , над которым аддитивное преобразование тела D_i линейно для любого i . Если все тела имеют характеристику 0, то согласно теореме 9.1.3 такое поле всегда существует. Однако здесь возникает зависимость тензорного произведения от выбранного поля F . Чтобы избавиться от этой зависимости, я предполагаю, что поле F - максимальное поле, обладающее указанным свойством.

Если $D_1 = \dots = D_n = D$, то такое поле является центром $Z(D)$ тела D . Если произведение в теле D коммутативно^{1.3}, то $Z(D) = D$. Следовательно, начав с аддитивного отображения, я пришёл к концепции линейного отображения, которая является обобщением линейного отображения над полем.

Исследование в области комплексных чисел и кватернионов проявили ещё одно интересное явление. Несмотря на то, что поле комплексных чисел является расширением поля действительных чисел, структура линейного отображения над полем комплексных чисел отличается от структуры линейного отображения над полем действительных чисел. Это различие приводит к тому, что операция сопряжения комплексных чисел является аддитивным отображением, но не является линейным отображением над полем комплексных чисел.

Аналогично, структура линейного отображения над телом кватернионов отличается от структуры линейного отображения над полем комплексных чисел. Причина различия в том, что центр алгебры кватернионов имеет более простую структуру, чем поле комплексных чисел. Это отличие приводит к тому, что операция сопряжения кватерниона удовлетворяет равенству

$$\bar{p} = -\frac{1}{2}(p + ipi + jpj + kpk)$$

Вследствие этого задача найти отображения, удовлетворяющие теореме подобной теореме Римана (теорема 10.1.1), является нетривиальной задачей для кватернионов.

Август, 2009

^{1.3}Иными словами, тело является полем.

1.4. Предисловие к изданию 5

Пассажир: ... Мы же опоздаем на станцию!

Паровозик: ... Но если мы не увидим первых ландышей, то мы опоздаем на всю весну!

...

Пассажир: ... Мы же совсем опоздаем!

Паровозик: Да. Но если мы не услышим первых соловьёв, то мы опоздаем на всё лето!

...

Паровозик: Рассвет! ... каждый рассвет единственный в жизни! ... Ехать пора. Ведь мы опоздаем.

Пассажир: Да. Но если мы не увидим рассвет, мы можем опоздать на всю жизнь!

Геннадий Цыферов, Паровозик из Ромашково.

Молодой человек по имени Женя вышел из пункта A в пункт B . Через два часа его товарищ Петя выехал из пункта B на велосипеде по направлению к пункту A . С какой скоростью ехал Петя, если они встретились через час?..

Знакомая задача из школьного задачника. Но задача не столь проста как она сформулирована. Петя проезжал мимо пруда, увидел лебедей и остановился, чтобы их сфотографировать. А Женя остановился в роще послушать соловьёв. Там они и встретились.

Очень часто хочется заглянуть в конец задачника. Вот оно решение, уже близко. Однако что-то непознанное останется за рамками готового ответа. Я уже сейчас вижу в общих чертах теорию, которую я ищу. Но я понимаю, что прежде я смогу рассказать об этом другим, мне предстоит пройти длинный путь. Кроме того, мой опыт мне подсказывает, что когда бредёшь по незнакомой местности, внезапно увидишь столь удивительный ландшафт, что невольно задержишься, чтобы познакомиться с ним получше.

Впрочем, один раз я не удержался и в статье [10] попытался проанализировать, как может выглядеть геометрия над телом. И хотя статья выглядела незавершенной, её результаты легли в основу моих последующих исследований.

В статье [13] я рассматриваю систему аддитивных уравнений в Ω -алгебре, в которой определена операция сложения. Формат записи уравнений в [13] определён форматом операций в Ω -алгебре. Этот формат отличался от формата принятому в этой книге по умолчанию. Теория аддитивных уравнений является обобщением теории $*D$ -линейных уравнений и пользуется теми же методами. Другой порядок переменной и коэффициента в уравнении затруднял сравнение результатов в обеих книгах. Однако для меня не имеет значения, рассматриваю ли я систему D^* -линейных уравнений или систему $*D$ -линейных уравнений. Это побудило меня отредактировать текст этой книги и рассматривать систему $*D$ -линейных уравнений по умолчанию.

Кроме того я понял, что множество аддитивных отображений является понятием искусственным при изучении линейной алгебры над телом. Поэтому я при переработке этого издания удалил соответствующие определения и теоремы и рассматриваю непосредственно линейное отображение над заданным полем.

Основное отличие линейных отображений над телом состоит в том, что я не могу представить линейное отображение в виде произведения элемента тела на переменную. В статьях [12, 13] я нашёл способ функционального разделения переменной и отображения. Это позволяет представить запись линейного отображения в знакомой форме. Однако в этой книге я сохранил прежнюю форму записи. Причин этому несколько.

Прежде всего, обе формы записи верны. Мы можем пользоваться любой из этих форм записи, выбирая ту, которая кажется более адекватной. Это даёт также возможность читателю сопоставлять обе формы записи. Кроме того, в [13] я рассматриваю линейное отображение алгебр параллельно с их тензорным произведением, так как эти две темы неразделимы. В этой книге я решил сохранить тот путь, который я прошёл при написании второго издания этой книги и сохранить тензорное произведение как своеобразную вершину, к которой я поднимаюсь в конце книги.

Тем не менее, путь, пройденный после последнего издания, отразился на последних главах книги. Например, поскольку тело является алгеброй над полем, я решил перейти к стандартному представлению индексов. Основные изменения коснулись моего понимания D -векторных пространств. Я остановлюсь на этом вопросе немного подробнее, поскольку эта тема осталась за пределами книги.

D -векторное пространство возникло как следствие теоремы о парных представлениях тела в абелевой группе (теоремы 6.3.2, 6.3.3). Вначале я рассматривал D -векторное пространство как объединение структур D^* -векторного пространства и *D -векторного пространства. Соответственно я рассматриваю D^* -базис и *D -базис. На этом фоне нетривиальная запись тождественного отображения в виде (6.4.3) явилась для меня полнейшей неожиданностью.

Другое интересное утверждение, которое я сохранил для последующего анализа - это теорема 6.3.4, которая утверждает существование D^* -базиса, который не является *D -базисом. Здесь мы сделаем остановку.

Согласно теории представлений Ω -алгебры, которую я рассмотрел в [11], D -векторное пространство является представлением алгебры $D \otimes D$ в абелевой группе. Следовательно, выбор базиса определяется не D^* -линейной зависимостью или *D -линейной зависимостью, а зависимостью вида

$$a_{s,0}^i \bar{e}_i a_{s,1}^i$$

Следовательно, D^* -базис, который не является *D -базисом, не является также базисом D -векторного пространства. Тем не менее не трудно убедиться, что множество преобразований базиса порождает группу. Эта структура базиса приводит к тому, что исчезает разница между правым и левым базисами. Поэтому я для D -векторного пространства пользуюсь стандартным представлением индекса.

Однако из этого следует ещё более удивительное утверждение. Координаты вектора D -векторного пространства принадлежат алгебре $D \otimes D$. Сразу появляются вопросы.

- Может ли базис D -векторного пространства быть $*D$ -базисом?
- Каково соотношение размерностей D -векторного пространства и $*D$ -векторного пространства?
- Какова структура 1-мерного D -векторного пространства?

Я планирую рассмотреть эти вопросы для свободных модулей над произвольной алгеброй. Это основная причина почему эта тема лежит вне рамок этой книги.

Однако уже сейчас можно сказать, что множество векторов, которое $*D$ -линейно зависимо, не может быть базисом D -векторного пространства. Поэтому размерность D -векторного пространства не превышает размерность соответствующего $D*$ -векторного пространства. А следовательно описание D -векторного пространства, предложенное в данной книге остаётся верным.

Что ж. Я не удержался, и заглянул в конец задачника.

Август, 2010

1.5. Соглашения

- (1) В любом выражении, где появляется индекс, я предполагаю, что этот индекс может иметь внутреннюю структуру. Например, при рассмотрении алгебры A координаты $a \in A$ относительно базиса $\bar{e}$ пронумерованы индексом i . Это означает, что a является вектором. Однако, если a является матрицей, нам необходимо два индекса, один нумерует строки, другой - столбцы. В том случае, когда мы уточняем структуру индекса, мы будем начинать индекс с символа $\cdot$ в соответствующей позиции. Например, если я рассматриваю матрицу a_j^i как элемент векторного пространства, то я могу записать элемент матрицы в виде $a_{\cdot j}^i$.
- (2) В выражении вида

$$a_{s \cdot 0} x a_{s \cdot 1}$$

предполагается сумма по индексу s .

- (3) Тело D можно рассматривать как D -векторное пространство размерности 1. Соответственно этому, мы можем изучать не только гомоморфизм тела D_1 в тело D_2 , но и линейное отображение тел. При этом подразумевается, что отображение мультипликативно над максимально возможным полем. В частности, линейное отображение тела D мультипликативно над центром $Z(D)$. Это не противоречит определению линейного отображения поля, так как для поля F справедливо $Z(F) = F$. Если поле F отлично от максимально возможного, то я это явно указываю в тексте.
- (4) Несмотря на некоммутативность произведения многие утверждения сохраняются, если заменить например правое представление на левое представление или правое векторное пространство на левое векторное пространство. Чтобы сохранить эту симметрию в формулировках теорем я пользуюсь симметричными обозначениями. Например, я рассматриваю $D*$ -векторное пространство и $*D$ -векторное пространство. Запись $D*$ -векторное пространство можно прочесть как D -star-векторное пространство либо как левое векторное пространство. Запись $D*$ -линейно зависимые векторы можно прочесть как D -star-линейно зависимые векторы либо как векторы, линейно зависимые слева.

- (5) Пусть A - свободная конечно мерная алгебра. При разложении элемента алгебры A относительно базиса $\bar{e}$ мы пользуемся одной и той же корневой буквой для обозначения этого элемента и его координат. Однако в алгебре не принято использовать векторные обозначения. В выражении a^2 не ясно - это компонента разложения элемента a относительно базиса или это операция возведения в степень. Для облегчения чтения текста мы будем индекс элемента алгебры выделять цветом. Например,

$$a = a^i \bar{e}_i$$

- (6) Если свободная конечномерная алгебра имеет единицу, то мы будем отождествлять вектор базиса $\bar{e}_0$ с единицей алгебры.
- (7) Без сомнения, у читателя моих статей могут быть вопросы, замечания, возражения. Я буду признателен любому отзыву.

Бикольцо матриц

2.1. Концепция обобщённого индекса

Изучая тензорное исчисление, мы начинаем с изучения одновалентных ковариантного и контравариантного тензоров. Несмотря на различие свойств, оба эти объекта являются элементами соответствующих векторных пространств. Если мы введём обобщённый индекс по правилу $a^i = a^i$, $b^i = b^i_-$, то мы видим, что эти тензоры ведут себя одинаково. Например, преобразование ковариантного тензора принимает форму

$$b'^i = b'^i_- = f^i_- \cdot^j_- b^j_- = f^i_j b^j$$

Это сходство идёт сколь угодно далеко, так как тензоры также порождают векторное пространство.

Эти наблюдения сходства свойств ковариантного и контравариантного тензоров приводят нас к концепции обобщённого индекса.^{2.1} Я пользуюсь символом $\cdot$ перед обобщённым индексом, когда мне необходимо описать его структуру. Я помещаю символ $'-'$ на месте индекса, позиция которого изменилась. Например, если исходное выражение было a_{ij} , я пользуюсь записью a^j_{i-} вместо записи a^j_i .

Хотя структура обобщённого индекса произвольна, мы будем предполагать, что существует взаимно однозначное отображение отрезка натуральных чисел $1, \dots, n$ на множество значений индекса. Пусть i - множество значений индекса i . Мы будем обозначать мощность этого множества символом $|i|$ и будем полагать $|i| = n$. Если нам надо перечислить элементы a_i , мы будем пользоваться обозначением $a_1, \dots, a_n$.

Представление координат вектора в форме матрицы позволяет сделать запись более компактной. Вопрос о представлении вектора как строки или столбец матрицы является вопросом соглашения. Мы можем распространить концепцию обобщённого индекса на элементы матрицы. Матрица - это двумерная таблица, строки и столбцы которой занумерованы обобщёнными индексами. Для представления матрицы мы будем пользоваться одним из следующих представлений:

Стандартное представление: в этом случае мы представляем элементы матрицы A в виде A^a_b .

Альтернативное представление: в этом случае мы представляем элементы матрицы A в виде $^a A_b$ или $_b A^a$.

^{2.1}Набор команд для работы с обобщёнными индексами, также как и другие команды, используемые в этой и последующих статьях, можно найти в файле `Commands.tex`.

Так как мы пользуемся обобщёнными индексами, мы не можем сказать, нумерует ли индекс a строки матрицы или столбцы, до тех пор, пока мы не знаем структуры индекса.

Мы могли бы пользоваться терминами $*$ -столбец и $*$ -строка, которые более близки традиционным. Однако как мы увидим ниже для нас несущественна форма представления матрицы. Для того, чтобы обозначения, предлагаемые ниже, были согласованы с традиционными, мы будем предполагать, что матрица представлена в виде

$$A = \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_n \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^mA_1 & \dots & {}^mA_n \end{pmatrix}$$

Определение 2.1.1. Я использую следующие имена и обозначения различных миноров матрицы A

A_a : $*$ -**строка** с индексом a является обобщением столбца матрицы. Верхний индекс перечисляет элементы $*$ -строки, нижний индекс перечисляет $*$ -строки.

A_T : минор, полученный из A выбором $*$ -строк с индексом из множества T

$A_{[a]}$: минор, полученный из A удалением $*$ -строки A_a

$A_{[T]}$: минор, полученный из A удалением $*$ -строк с индексом из множества T

bA : $*$ -**строка** с индексом b является обобщением строки матрицы. Нижний индекс перечисляет элементы $*$ -строки, верхний индекс перечисляет $*$ -строки.

SA : минор, полученный из A выбором $*$ -строк с индексом из множества S

${}^{[b]}A$: минор, полученный из A удалением $*$ -строки bA

${}^{[S]}A$: минор, полученный из A удалением $*$ -строк с индексом из множества S

□

Замечание 2.1.2. Мы будем комбинировать запись индексов. Так bA_a является 1×1 минором. Одновременно, это обозначение элемента матрицы. Это позволяет отождествить 1×1 матрицу и её элемент. Индекс a является номером $*$ -строки матрицы и индекс b является номером $*$ -строки матрицы. □

Каждая форма записи матрицы имеет свои преимущества. Стандартная форма более естественна, когда мы изучаем теорию матриц. Альтернативная форма записи делает выражения более ясными в теории векторных пространств. Распространив альтернативную запись индексов на произвольные тензоры, мы сможем лучше понять взаимодействие различных геометрических объектов. Опираясь на принцип двойственности (теорема 2.2.14), мы можем расширить наши выразительные возможности.

Замечание 2.1.3. Мы можем договориться, что при чтении мы произносим символ $*$ - как s - и символ $*$ - как r -, формируя тем самым названия s -**строка** и r -**строка**. В последующем мы распространим это соглашение на другие элементы линейной алгебры. Я буду пользоваться этим соглашением при составлении индекса. □

Так как транспонирование матрицы меняет местами $*$ -строки и $*$ -столбцы, то мы получаем равенство

$$(2.1.1) \quad {}_i(A^T)^j = {}^i A_j$$

Замечание 2.1.4. Как видно из равенства (2.1.1), для нас несущественно, с какой стороны мы указываем номер $*$ -строки и с какой стороны мы указываем номер $*$ -столбца. Это связано с тем, что мы можем нумеровать элементы матрицы различными способами. Если мы хотим указывать номера $*$ -строки и $*$ -столбца согласно определению 2.1.1, то равенство (2.1.1) примет вид

$${}^j(A^T)_i = {}^i A_j$$

В стандартном представлении равенство (2.1.1) примет вид

$$(A^T)_i^j = A_j^i$$

□

Мы называем матрицу^{2.2}

$$(2.1.2) \quad {}^j \mathcal{H} A = ({}^j \mathcal{H} A_i) = (({}_i^j A_{-})^{-1})$$

обращением Адамара матрицы $A = ({}_b A^a)$ ([8]-page 4).

Я пользуюсь Эйнштейновским соглашением о суммировании. Это означает, что, когда индекс присутствует в выражении дважды и множество индексов известно, у меня есть сумма по этому индексу. Я буду явно указывать множество индексов, если это необходимо. Кроме того, в этой статье я использую ту же корневую букву для матрицы и её элементов.

Мы будем изучать матрицы, элементы которых принадлежат телу D . Мы также будем иметь в виду, что вместо тела D мы можем в тексте писать поле F . Мы будем явно писать поле F в тех случаях, когда коммутативность будет порождать новые детали. Обозначим через 1 единичный элемент тела D .

Пусть I , $|I| = n$ - множество индексов. Символ Кронекера определён равенством

$$(2.1.3) \quad \delta_j^i = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad i, j \in I$$

2.2. Бикольцо

Мы будем рассматривать матрицы, элементы которых принадлежат телу D .

Произведение матриц связано с произведением гомоморфизмов векторных пространств над полем. Согласно традиции произведение матриц A и B определено как произведение $*$ -строк матрицы A и $*$ -строк матрицы B . Условность этого определения становится очевидной, если мы обратим внимание, что $*$ -строка матрицы A может быть столбцом этой матрицы. В этом случае мы

^{2.2} Запись $({}_i^j A_{-})^{-1}$ означает, что при обращении Адамара столбцы и строки меняются местами. Мы можем формально записать это выражение следующим образом

$$({}_i^j A_{-})^{-1} = \frac{1}{{}_i A_j}$$

умножаем столбцы матрицы A на строки матрицы B . Таким образом, мы можем определить два вида произведения матриц. Чтобы различать эти произведения, мы вводим новые обозначения.^{2.3}

Определение 2.2.1. $*$ -произведение матриц A и B имеет вид

$$(2.2.1) \quad \begin{cases} A_* * B &= ({}^a A_c {}^c B_b) \\ {}^a (A_* * B)_b &= {}^a A_c {}^c B_b \end{cases}$$

и может быть выражено как произведение $*$ -строки матрицы A и $*$ -строки матрицы B .^{2.4} $\square$

Определение 2.2.2. $*$ -произведение матриц A и B имеет вид

$$(2.2.2) \quad \begin{cases} A^* * B &= ({}_a A^c {}_c B^b) \\ {}_a (A^* * B)^b &= {}_a A^c {}_c B^b \end{cases}$$

и может быть выражено как произведение $*$ -строки матрицы A на $*$ -строку матрицы B .^{2.5} $\square$

Замечание 2.2.3. Мы будем пользоваться символом $*$ - или $*$ - в имени свойств каждого произведения и в обозначениях. Согласно замечанию 2.1.3 мы можем читать символы $*$ и $*$ как rc -произведение и st -произведение. Это правило мы распространим на последующую терминологию. $\square$

Замечание 2.2.4. Также как и в замечании 2.1.4, я хочу обратить внимание на то, что я меняю нумерацию элементов матрицы. Если мы хотим указывать номера $*$ -строки и $*$ -строки согласно определению 2.1.1, то равенство (2.2.2) примет вид

$$(2.2.3) \quad {}^b (A^* * B)_a = {}^c A_a {}^b B_c$$

Однако формат равенства (2.2.3) несколько необычен. $\square$

Множество $n \times n$ матриц замкнуто относительно $*$ -произведения и $*$ -произведения, а также относительно суммы, определённой согласно правилу

$$(A + B)_a^b = A_a^b + B_a^b$$

^{2.3}Для совместимости обозначений с существующими мы будем иметь в виду $*$ -произведение, когда нет явных обозначений.

^{2.4}В альтернативной форме операция состоит из двух символов $*$, которые записываются на месте индекса суммирования. В стандартной форме операция имеет вид

$$\begin{cases} A_* * B &= (A_c^a B_b^c) \\ (A_* * B)_b^a &= A_c^a B_b^c \end{cases}$$

и может быть интерпретирована как символическая запись

$$A_* * B = A_* B^*$$

где мы записываем символ $*$ на месте индекса, по которому предполагается суммирование.

^{2.5}В альтернативной форме операция состоит из двух символов $*$, которые записываются на месте индекса суммирования. В стандартной форме операция имеет вид

$$\begin{cases} A^* * B &= (A_a^c B_c^b) \\ (A^* * B)_b^a &= A_a^c B_c^b \end{cases}$$

и может быть интерпретирована как символическую запись

$$A^* * B = A^* B_*$$

где мы записываем символ $*$ на месте индекса, по которому предполагается суммирование.

Теорема 2.2.5.

$$(2.2.4) \quad (A *_* B)^T = A^{T*} *_* B^T$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Цепочка равенств

$$(2.2.5) \quad \begin{aligned} {}_a((A *_* B)^T)^b &= {}^a(A *_* B)_b \\ &= {}^a A_c {}^c B_b \\ &= {}_a(A^T)^c {}_c(B^T)^b \\ &= {}_a((A^T)^* {}_*(B^T))^b \end{aligned}$$

следует из (2.1.1), (2.2.1) и (2.2.2). Равенство (2.2.4) следует из (2.2.5). $\square$

Матрица $\delta = (\delta_a^c)$ является единицей для обоих произведений.

Определение 2.2.6. Бикольцо $\mathcal{A}$ - это множество, на котором мы определили унарную операцию, называемую транспозицией, и три бинарных операции, называемые $*$ -произведение, * -произведение и сумма, такие что

- $*$ -произведение и сумма определяют структуру кольца на $\mathcal{A}$
- * -произведение и сумма определяют структуру кольца на $\mathcal{A}$
- оба произведения имеют общую единицу δ
- произведения удовлетворяют равенству

$$(2.2.6) \quad (A *_* B)^T = A^{T*} *_* B^T$$

- транспозиция единицы есть единица

$$(2.2.7) \quad \delta^T = \delta$$

- двойная транспозиция есть исходный элемент

$$(2.2.8) \quad (A^T)^T = A$$

$\square$

Теорема 2.2.7.

$$(2.2.9) \quad (A^* {}^* B)^T = (A^T)^* {}^* (B^T)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы можем доказать (2.2.9) в случае матриц тем же образом, что мы доказали (2.2.6). Тем не менее для нас более важно показать, что (2.2.9) следует непосредственно из (2.2.6).

Применяя (2.2.8) к каждому слагаемому в левой части (2.2.9), мы получим

$$(2.2.10) \quad (A^* {}^* B)^T = ((A^T)^T)^* {}^* ((B^T)^T)^T$$

Из (2.2.10) и (2.2.6) следует, что

$$(2.2.11) \quad (A^* {}^* B)^T = ((A^T)^* {}^* B^T)^T$$

(2.2.9) следует из (2.2.11) и (2.2.8). $\square$

Определение 2.2.8. Мы определим $*$ -степень элемента A бикольца $\mathcal{A}$, пользуясь рекурсивным правилом

$$(2.2.12) \quad A^{0*} = \delta$$

$$(2.2.13) \quad A^{n*} = A^{n-1*} {}^* A$$

$\square$

Определение 2.2.9. Мы определим $*$ -**степень** элемента A бикольца $\mathcal{A}$, пользуясь рекурсивным правилом

$$(2.2.14) \quad A^{0*} = \delta$$

$$(2.2.15) \quad A^{n*} = A^{n-1*} * A$$

□

Теорема 2.2.10.

$$(2.2.16) \quad (A^T)^{n*} = (A^{n*})^T$$

$$(2.2.17) \quad (A^T)^{n*} = (A^{n*})^T$$

Доказательство. Мы проведём доказательство индукцией по n .

При $n = 0$ утверждение непосредственно следует из равенств (2.2.12), (2.2.14) и (2.2.7).

Допустим утверждение справедливо при $n = k - 1$

$$(2.2.18) \quad (A^T)^{n-1*} = (A^{n-1*})^T$$

Из (2.2.13) следует

$$(2.2.19) \quad (A^T)^{k*} = (A^T)^{k-1*} * A^T$$

Из (2.2.19) и (2.2.18) следует

$$(2.2.20) \quad (A^T)^{k*} = (A^{k-1*})^T * A^T$$

Из (2.2.20) и (2.2.9) следует

$$(2.2.21) \quad (A^T)^{k*} = (A^{k-1*} * A)^T$$

Из (2.2.19) и (2.2.15) следует (2.2.16).

Мы можем доказать (2.2.17) подобным образом.

□

Определение 2.2.11. Элемент A^{-1*} бикольца $\mathcal{A}$ - это $*$ -**обратный элемент** элемента A , если

$$(2.2.22) \quad A * A^{-1*} = \delta$$

Элемент A^{-1*} бикольца $\mathcal{A}$ - это $*$ -**обратный элемент** элемента A , если

$$(2.2.23) \quad A^* A^{-1*} = \delta$$

□

Теорема 2.2.12. Предположим, что элемент $A \in \mathcal{A}$ имеет $*$ -обратный элемент. Тогда транспонированный элемент A^T имеет $*$ -обратный элемент и эти элементы удовлетворяют равенству

$$(2.2.24) \quad (A^T)^{-1*} = (A^{-1*})^T$$

Предположим, что элемент $A \in \mathcal{A}$ имеет $*$ -обратный элемент. Тогда транспонированный элемент A^T имеет $*$ -обратный элемент и эти элементы удовлетворяют равенству

$$(2.2.25) \quad (A^T)^{-1*} = (A^{-1*})^T$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если мы возьмём транспонирование обеих частей (2.2.22) и применим (2.2.7), мы получим

$$(A_*^* A^{-1*})^T = \delta^T = \delta$$

Применяя (2.2.6), мы получим

$$(2.2.26) \quad \delta = A^{T*} (A^{-1*})^T$$

(2.2.24) следует из сравнения (2.2.23) и (2.2.26).

Мы можем доказать (2.2.25) подобным образом. $\square$

Теоремы 2.2.5, 2.2.7, 2.2.10 и 2.2.12 показывают, что существует двойственность между $*$ -произведением и $*$ -произведением. Мы можем объединить эти утверждения.

Теорема 2.2.13 (принцип двойственности для бикольца). Пусть $\mathfrak{A}$ - истинное утверждение о бикольце $\mathcal{A}$. Если мы заменим одновременно

- $A \in \mathcal{A}$ и A^T
- $*$ -произведение и $*$ -произведение

то мы снова получим истинное утверждение.

Теорема 2.2.14 (принцип двойственности для бикольца матриц). Пусть $\mathcal{A}$ является бикольцом матриц. Пусть $\mathfrak{A}$ - истинное утверждение о матрицах. Если мы заменим одновременно

- $*$ -строки и $*$ -строки всех матриц
- $*$ -произведение и $*$ -произведение

то мы снова получим истинное утверждение.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Непосредственное следствие теоремы 2.2.13. $\square$

Замечание 2.2.15. В выражении

$$A_*^* B_*^* C$$

мы выполняем операцию умножения слева направо. Однако мы можем выполнять операцию умножения справа налево. В традиционной записи это выражение примет вид

$$C^* {}_* B^* {}_* A$$

Мы сохраним правило, что показатель степени записывается справа от выражения. Если мы пользуемся стандартным представлением, то индексы также записываются справа от выражения. Если мы пользуемся альтернативным представлением, то индексы читаются в том же порядке, что и символы операции и корневые буквы. Например, если исходное выражение имеет вид

$$A^{-1*} {}_* {}_* B_a$$

то выражение, читаемое справа налево, примет вид

$$B_a {}_* {}_* A^{-1*}$$

в стандартном представлении либо примет вид

$${}_a B {}_* {}_* A^{-1*}$$

в альтернативном представлении.

Если задать порядок, в котором мы записываем индексы, то мы можем утверждать, что мы читаем выражение сверху вниз, читая сперва верхние индексы, потом нижние. Договорившись, что это стандартная форма чтения, мы можем прочесть выражение снизу вверх. При этом мы дополним правило, что символы операции также читаются в том же направлении, что и индексы. Например, выражение

$$A^a {}_* {}^* B^{-1} {}_* {}^* = C^a$$

прочтённое снизу вверх, в стандартной форме имеет вид

$$A_a {}_* {}^* B^{-1} {}_* {}^* = C_a$$

Согласно принципу двойственности, если верно одно утверждение, то верно и другое. $\square$

Теорема 2.2.16. *Если матрица A имеет ${}_*$ -обратную матрицу, то для любых матриц B и C из равенства*

$$(2.2.27) \quad B {}_* {}^* A = C {}_* {}^* A$$

следует равенство

$$(2.2.28) \quad B = C$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (2.2.28) следует из (2.2.27), если обе части равенства (2.2.27) умножить на $A^{-1} {}_* {}^*$. $\square$

2.3. Квазидетерминант

Теорема 2.3.1. *Предположим, что $n \times n$ матрица A имеет ${}_*$ -обратную матрицу.^{2.6} Тогда $k \times k$ минор ${}_*$ -обратной матрицы удовлетворяет*

$$(2.3.1) \quad \left({}^I(A^{-1} {}_* {}^*)_J \right)^{-1} {}_* {}^* = {}^J A_I - {}^J A_{[I]} {}_* {}^* \left({}^{[J]} A_{[I]} \right)^{-1} {}_* {}^* {}_* {}^{[J]} A_I$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Определение (2.2.22) ${}_*$ -обратной матрицы приводит к системе линейных уравнений

$$(2.3.2) \quad {}^{[J]} A_{[I]} {}_* {}^* {}^{[I]}(A^{-1} {}_* {}^*)_J + {}^{[J]} A_{I*} {}_* {}^I(A^{-1} {}_* {}^*)_J = 0$$

$$(2.3.3) \quad {}^J A_{[I]} {}_* {}^* {}^{[I]}(A^{-1} {}_* {}^*)_J + {}^J A_{I*} {}_* {}^I(A^{-1} {}_* {}^*)_J = \delta$$

Мы умножим (2.3.2) на $\left({}^{[J]} A_{[I]} \right)^{-1} {}_* {}^*$

$$(2.3.4) \quad {}^I(A^{-1} {}_* {}^*)_J + \left({}^{[J]} A_{[I]} \right)^{-1} {}_* {}^* {}_* {}^{[J]} A_{I*} {}_* {}^I(A^{-1} {}_* {}^*)_J = 0$$

Теперь мы можем подставить (2.3.4) в (2.3.3)

$$(2.3.5) \quad - {}^J A_{[I]} {}_* {}^* \left({}^{[J]} A_{[I]} \right)^{-1} {}_* {}^* {}_* {}^{[J]} A_{I*} {}_* {}^I(A^{-1} {}_* {}^*)_J + {}^J A_{I*} {}_* {}^I(A^{-1} {}_* {}^*)_J = \delta$$

(2.3.1) следует из (2.3.5). $\square$

^{2.6}Это утверждение и его доказательство основаны на утверждении 1.2.1 из [7] (page 8) для матриц над свободным кольцом с делением.

Следствие 2.3.2. *Предположим, что $n \times n$ матрица A имеет ${}^*{}^*$ -обратную матрицу. Тогда элементы ${}^*{}^*$ -обратной матрицы удовлетворяют равенству^{2.2}*

$$(2.3.6) \quad {}^i(A^{-1*})_j = \left({}^jA_i - {}^jA_{[i]*} \left({}^{[j]}A_{[i]} \right)^{-1*} {}^{*[j]}A_i \right)^{-1}$$

$$(2.3.7) \quad {}^j \left(\mathcal{H}A^{-1*} \right)_i = {}^jA_i - {}^jA_{[i]*} \left({}^{[j]}A_{[i]} \right)^{-1*} {}^{*[j]}A_i$$

□

Пример 2.3.3. Рассмотрим матрицу

$$\begin{pmatrix} {}^1A_1 & {}^1A_2 \\ {}^2A_1 & {}^2A_2 \end{pmatrix}$$

Согласно (2.3.6)

$$(2.3.8) \quad {}^1(A^{-1*})_1 = ({}^1A_1 - {}^1A_2({}^2A_2)^{-1} {}^2A_1)^{-1}$$

$$(2.3.9) \quad {}^2(A^{-1*})_1 = ({}^1A_2 - {}^1A_1({}^2A_1)^{-1} {}^2A_2)^{-1}$$

$$(2.3.10) \quad {}^1(A^{-1*})_2 = ({}^2A_1 - {}^2A_2({}^1A_2)^{-1} {}^1A_1)^{-1}$$

$$(2.3.11) \quad {}^2(A^{-1*})_2 = ({}^2A_2 - {}^2A_1({}^1A_1)^{-1} {}^1A_2)^{-1}$$

$$A^{-1*} = \begin{pmatrix} ({}^1A_1 - {}^1A_2({}^2A_2)^{-1} {}^2A_1)^{-1} & ({}^1A_2 - {}^1A_1({}^2A_1)^{-1} {}^2A_2)^{-1} \\ ({}^2A_1 - {}^2A_2({}^1A_2)^{-1} {}^1A_1)^{-1} & ({}^2A_2 - {}^2A_1({}^1A_1)^{-1} {}^1A_2)^{-1} \end{pmatrix}$$

□

Согласно [7], page 3 у нас нет определения детерминанта в случае тела. Тем не менее, мы можем определить квазидетерминант, который в конечном итоге даёт похожую картину. В определении, данном ниже, мы следуем определению [7]-1.2.2.

Определение 2.3.4. $\left(\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix} \right)_{-*}{}^*$ -квазидетерминант $n \times n$ матрицы A - это формальное выражение^{2.2}

$$(2.3.12) \quad {}^j \det(A, *)_i = {}^j \left(\mathcal{H}A^{-1*} \right)_i$$

Согласно замечанию 2.1.2 мы можем рассматривать $\left(\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix} \right)_{-*}{}^*$ -квазидетерминант как элемент матрицы $\det(a, *)$, которую мы будем называть ${}^*{}^*$ -квазидетерминантом. □

Теорема 2.3.5. *Выражение для элементов ${}^*{}^*$ -обратной матрицы имеет вид*

$$(2.3.13) \quad A^{-1*} = \mathcal{H} \det(A, *)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (2.3.13) следует из (2.3.12). □

Теорема 2.3.6. *Выражение для $\binom{a}{b}$ - $*$ -квазидетерминанта имеет любую из следующих форм^{2.7}*

$$(2.3.14) \quad {}^j \det(A, *)_i = {}^j A_i - {}^j A_{[i]} * \left([{}^j] A_{[i]} \right)^{-1} * {}^j A_i$$

$$(2.3.15) \quad {}^j \det(A, *)_i = {}^j A_i - {}^j A_{[i]} * \mathcal{H} \det \left([{}^j] A_{[i]}, * \right) * {}^j A_i$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение следует из (2.3.7) и (2.3.12). □

Пример 2.3.7. Рассмотрим матрицу

$$\begin{pmatrix} {}^1 A_1 & {}^1 A_2 \\ {}^2 A_1 & {}^2 A_2 \end{pmatrix}$$

Согласно (2.3.14)

$$\begin{aligned} \det(A, *) &= \begin{pmatrix} {}^1 A_1 - {}^1 A_2 ({}^2 A_2)^{-1} {}^2 A_1 & {}^1 A_2 - {}^1 A_1 ({}^2 A_1)^{-1} {}^2 A_2 \\ {}^2 A_1 - {}^2 A_2 ({}^1 A_2)^{-1} {}^1 A_1 & {}^2 A_2 - {}^2 A_1 ({}^1 A_1)^{-1} {}^1 A_2 \end{pmatrix} \\ \det(A, *) &= \begin{pmatrix} {}^1 A^1 - {}^1 A^2 ({}^2 A^2)^{-1} {}^2 A^1 & {}^2 A^1 - {}^2 A^2 ({}^1 A^2)^{-1} {}^1 A^1 \\ {}^1 A^2 - {}^1 A^1 ({}^2 A^1)^{-1} {}^2 A^2 & {}^2 A^2 - {}^2 A^1 ({}^1 A^1)^{-1} {}^1 A^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

Теорема 2.3.8.

$$(2.3.16) \quad {}_j \det(A^T, *)^i = {}^j \det(A, *)_i$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно (2.3.12) и (2.1.2)

$${}_j \det(A^T, *)^i = ({}_j \cdot ((A^T)^{-1} *)^{\cdot -})_i^{-1}$$

Пользуясь теоремой 2.2.12, мы получим

$${}_j \det(A^T, *)^i = ({}_j \cdot ((A^{-1} *)^T)^{\cdot -})_i^{-1}$$

Пользуясь (2.1.1), мы имеем

$$(2.3.17) \quad {}_j \det(A^T, *)^i = ({}_j \cdot (A^{-1} *)^{\cdot -})_i^{-1}$$

Пользуясь (2.3.17), (2.1.2), (2.3.12), мы получим (2.3.16). □

Теорема 2.3.8 расширяет принцип двойственности, теорема 2.2.14, на утверждения о квазидетерминантах и утверждает, что одно и то же выражение является $*$ -квазидетерминантом матрицы A и $*$ -квазидетерминантом матрицы A^T . Пользуясь этой теоремой, мы можем записать любое утверждение о $*$ -матрице, опираясь на подобное утверждение о $*$ -матрице.

Теорема 2.3.9 (принцип двойственности). *Пусть $\mathfrak{A}$ - истинное утверждение о бикольце матриц. Если мы одновременно заменим*

^{2.7}Мы можем дать подобное доказательство для $\binom{a}{b}$ - $*$ -квазидетерминанта. Однако мы можем записать соответствующие утверждения, опираясь на принцип двойственности. Так, если прочесть равенство (2.3.14) справа налево, то мы получим равенство

$$\begin{aligned} {}^j \det(A, *)_i &= {}^j A_i - [{}^j] A_i * \left([{}^j] A_{[i]} \right)^{-1} * {}^j A_{[i]} \\ {}^j \det(A, *)_i &= {}^j A_i - [{}^j] A_i * \mathcal{H} \det \left([{}^j] A_{[i]}, * \right) * {}^j A_{[i]} \end{aligned}$$

- $*$ -строку и $*$ -строку
- $*$ -квазидетерминант и $*$ -квазидетерминант

то мы снова получим истинное утверждение.

Теорема 2.3.10.

$$(2.3.18) \quad (mA)^{-1*} = A^{-1*} m^{-1}$$

$$(2.3.19) \quad (Am)^{-1*} = m^{-1} A^{-1*}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем равенство (2.3.18) индукцией по размеру матрицы.

Для 1×1 матрицы утверждение очевидно, так как

$$(mA)^{-1*} = ((mA)^{-1}) = (A^{-1}m^{-1}) = (A^{-1}) m^{-1} = A^{-1*} m^{-1}$$

Допустим утверждение справедливо для $(n-1) \times (n-1)$ матрицы. Тогда из равенства (2.3.1) следует

$$\begin{aligned} ({}^I((mA)^{-1*})_J)^{-1*} &= {}^J(mA)_I - {}^J(mA)_{[I]*} \left({}^{[J]}(mA)_{[I]} \right)^{-1*} {}^{*[J]}(mA)_I \\ &= m^J A_I - m^J A_{[I]*} \left({}^{[J]}A_{[I]} \right)^{-1*} m^{-1*} m^{[J]} A_I \\ &= m^J A_I - m^J A_{[I]*} \left({}^{[J]}A_{[I]} \right)^{-1*} {}^{*[J]}A_I \\ (2.3.20) \quad ({}^I((mA)^{-1*})_J)^{-1*} &= m^I (A^{-1*})_J \end{aligned}$$

Из равенства (2.3.20) следует равенство (2.3.18). Аналогично доказывается равенство (2.3.19). $\square$

Теорема 2.3.11. Пусть

$$(2.3.21) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда

$$(2.3.22) \quad A^{-1*} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2.3.23) \quad A^{-1*} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из (2.3.8) и (2.3.11) очевидно, что ${}^1(A^{-1*})_1 = 1$ и ${}^2(A^{-1*})_2 = 1$. Тем не менее выражение для ${}^2(A^{-1*})_1$ и ${}^1(A^{-1*})_2$ не может быть определено из (2.3.9) и (2.3.10) так как ${}^2A_1 = {}^1A_2 = 0$. Мы можем преобразовать эти выражения. Например

$$\begin{aligned} {}^2(A^{-1*})_1 &= ({}^1A_2 - {}^1A_1({}^2A_1)^{-1} {}^2A_2)^{-1} \\ &= ({}^1A_1(({}^1A_1)^{-1} {}^1A_2 - ({}^2A_1)^{-1} {}^2A_2))^{-1} \\ &= (({}^2A_1)^{-1} {}^1A_1({}^2A_1({}^1A_1)^{-1} {}^1A_2 - {}^2A_2))^{-1} \\ &= ({}^1A_1({}^2A_1({}^1A_1)^{-1} {}^1A_2 - {}^2A_2))^{-1} {}^2A_1 \end{aligned}$$

Мы непосредственно видим, что ${}^2(A^{-1*})_1 = 0$. Таким же образом мы можем найти, что ${}^1(A^{-1*})_2 = 0$. Это завершает доказательство (2.3.22).

Равенство (2.3.23) следует из (2.3.22), теоремы 2.3.8 и симметрии матрицы (2.3.21). $\square$

Представление универсальной алгебры

3.1. Представление универсальной алгебры

Определение 3.1.1. Пусть на множестве M определена структура Ω_2 -алгебры ([2, 14]). Мы будем называть эндоморфизм Ω_2 -алгебры

$$t : M \rightarrow M$$

преобразованием универсальной алгебры M .^{3.1} □

Мы будем обозначать δ тождественное преобразование.

Определение 3.1.2. Преобразование называется левосторонним преобразованием или $T\star$ -преобразованием, если оно действует слева

$$u' = tu$$

Мы будем обозначать $\star M$ множество $T\star$ -преобразований множества M . □

Определение 3.1.3. Преобразование называется правосторонним преобразованием или $\star T$ -преобразованием, если оно действует справа

$$u' = ut$$

Мы будем обозначать $M\star$ множество $\star T$ -преобразований множества M . □

Определение 3.1.4. Пусть на множестве $\star M$ определена структура Ω_1 -алгебры ([2]). Пусть A является Ω_1 -алгеброй. Мы будем называть гомоморфизм

$$(3.1.1) \quad f : A \rightarrow \star M$$

левосторонним или $T\star$ -представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M □

Определение 3.1.5. Пусть на множестве $M\star$ определена структура Ω_1 -алгебры ([2]). Пусть A является Ω_1 -алгеброй. Мы будем называть гомоморфизм

$$f : A \rightarrow M\star$$

правосторонним или $\star T$ -представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M □

Мы распространим на теорию представлений соглашение, описанное в замечании 2.2.15. Мы можем записать принцип двойственности в следующей форме

Теорема 3.1.6 (принцип двойственности). *Любое утверждение, справедливое для $T\star$ -представления Ω_1 -алгебры A , будет справедливо для $\star T$ -представления Ω_1 -алгебры A .*

^{3.1}Если множество операций Ω_2 -алгебры пусто, то t является отображением.

Замечание 3.1.7. Существует две формы записи преобразования Ω_2 -алгебры M . Если мы пользуемся операторной записью, то преобразование A записывается в виде Aa или aA , что соответствует $T\star$ -преобразованию или $\star T$ -преобразованию. Если мы пользуемся функциональной записью, то преобразование A записывается в виде $A(a)$ независимо от того, это $T\star$ -преобразование или $\star T$ -преобразование. Эта запись согласована с принципом двойственности.

Это замечание является основой следующего соглашения. Когда мы пользуемся функциональной записью, мы не различаем $T\star$ -преобразование и $\star T$ -преобразование. Мы будем обозначать *M множество преобразований Ω_2 -алгебры M . Пусть на множестве *M определена структура Ω_1 -алгебры. Пусть A является Ω_1 -алгеброй. Мы будем называть гомоморфизм

$$(3.1.2) \quad f : A \rightarrow {}^*M$$

представлением Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M .

Соответствие между операторной записью и функциональной записью однозначно. Мы можем выбирать любую форму записи, которая удобна для изложения конкретной темы. $\square$

Диаграмма

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f(a)} & M \\ & \uparrow f & \\ & A & \end{array}$$

означает, что мы рассматриваем представление Ω_1 -алгебры A . Отображение $f(a)$ является образом $a \in A$.

Определение 3.1.8. Мы будем называть представление Ω_1 -алгебры A **эффektivным**, если отображение (3.1.2) - изоморфизм Ω_1 -алгебры A в *M . $\square$

Замечание 3.1.9. Если $T\star$ -представление Ω_1 -алгебры эффektivно, мы можем отождествлять элемент Ω_1 -алгебры с его образом и записывать $T\star$ -преобразование, порождённое элементом $a \in A$, в форме

$$v' = av$$

Если $\star T$ -представление Ω_1 -алгебры эффektivно, мы можем отождествлять элемент Ω_1 -алгебры с его образом и записывать $\star T$ -преобразование, порождённое элементом $a \in A$, в форме

$$v' = va$$

$\square$

Определение 3.1.10. Мы будем называть представление Ω_1 -алгебры **транзитивным**, если для любых $a, b \in V$ существует такое g , что

$$a = f(g)(b)$$

Мы будем называть представление Ω_1 -алгебры **однотранзитивным**, если оно транзитивно и эффektivно. $\square$

Теорема 3.1.11. $T\star$ -представление однотранзитивно тогда и только тогда, когда для любых $a, b \in M$ существует одно и только одно $g \in A$ такое, что $a = f(g)(b)$

Доказательство. Следствие определений 3.1.8 и 3.1.10. $\square$

3.2. Морфизм представлений универсальной алгебры

Теорема 3.2.1. Пусть A и B - Ω_1 -алгебры. Представление Ω_1 -алгебры B

$$g : B \rightarrow {}^*M$$

и гомоморфизм Ω_1 -алгебры

$$(3.2.1) \quad h : A \rightarrow B$$

определяют представление f Ω_1 -алгебры A

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & {}^*M \\ & \searrow h \quad \nearrow g & \\ & B & \end{array}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отображение f является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры A в Ω_1 -алгебру *M , так как отображение g является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры B в Ω_1 -алгебру *M . $\square$

Если мы изучаем представление Ω_1 -алгебры в Ω_2 -алгебрах M и N , то нас интересуют отображения из M в N , сохраняющие структуру представления.

Определение 3.2.2. Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M и

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

представление Ω_1 -алгебры B в Ω_2 -алгебре N . Пара отображений

$$(3.2.2) \quad (r : A \rightarrow B, R : M \rightarrow N)$$

таких, что

- r - гомоморфизм Ω_1 -алгебры
- R - гомоморфизм Ω_2 -алгебры
-

$$(3.2.3) \quad R \circ f(a) = g(r(a)) \circ R$$

называется **морфизмом представлений из f в g** . Мы также будем говорить, что определён **морфизм представлений Ω_1 -алгебры в Ω_2 -алгебре**. $\square$

Для произвольного $m \in M$ равенство (3.2.3) имеет вид

$$(3.2.4) \quad R(f(a)(m)) = g(r(a))(R(m))$$

Замечание 3.2.3. Мы можем рассматривать пару отображений r, R как отображение

$$F : A \cup M \rightarrow B \cup N$$

такое, что

$$F(A) = B \quad F(M) = N$$

Поэтому в дальнейшем мы будем говорить, что дано отображение (r, R) . $\square$


Замечание 3.2.4. Рассмотрим морфизм представлений (3.2.2). Мы можем обозначать элементы множества B , пользуясь буквой по образцу $b \in B$. Но если мы хотим показать, что b является образом элемента $a \in A$, мы будем пользоваться обозначением $r(a)$. Таким образом, равенство

$$r(a) = r(a)$$

означает, что $r(a)$ (в левой части равенства) является образом $a \in A$ (в правой части равенства). Пользуясь подобными соображениями, мы будем обозначать элемент множества N в виде $R(m)$. Мы будем следовать этому соглашению, изучая соотношения между гомоморфизмами Ω_1 -алгебр и отображениями между множествами, где определены соответствующие представления.

Мы можем интерпретировать (3.2.4) двумя способами

- Пусть преобразование $f(a)$ отображает $m \in M$ в $f(a)(m)$. Тогда преобразование $g(r(a))$ отображает $R(m) \in N$ в $R(f(a)(m))$.
- Мы можем представить морфизм представлений из f в g , пользуясь диаграммой



Из (3.2.3) следует, что диаграмма (1) коммутативна. □

Теорема 3.2.5. Рассмотрим представление

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

Ω_1 -алгебры A и представление

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

Ω_1 -алгебры B . Морфизм

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

представлений из f в g удовлетворяет соотношению

$$(3.2.5) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = \omega(g(h(a_1)), \dots, g(h(a_n))) \circ H$$

для произвольной n -арной операции ω Ω_1 -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как f - гомоморфизм, мы имеем

$$(3.2.6) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = H \circ f(\omega(a_1, \dots, a_n))$$

Из (3.2.3) и (3.2.6) следует

$$(3.2.7) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = g(h(\omega(a_1, \dots, a_n))) \circ H$$

Так как h - гомоморфизм, из (3.2.7) следует

$$(3.2.8) \quad H \circ \omega(f(a_1), \dots, f(a_n)) = g(\omega(h(a_1), \dots, h(a_n))) \circ H$$

Так как g - гомоморфизм, из (3.2.8) следует (3.2.5). $\square$

Теорема 3.2.6. Пусть отображение

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

является морфизмом из представления

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

Ω_1 -алгебры A в представление

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

Ω_1 -алгебры B . Если представление f эффективно, то отображение

$${}^*H : {}^*M \rightarrow {}^*N$$

определённое равенством

$$(3.2.9) \quad {}^*H(f(a)) = g(h(a))$$

является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как представление f эффективно, то для выбранного преобразования $f(a)$ выбор элемента a определён однозначно. Следовательно, преобразование $g(h(a))$ в равенстве (3.2.9) определено корректно.

Так как f - гомоморфизм, мы имеем

$$(3.2.10) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = {}^*H(f(\omega(a_1, \dots, a_n)))$$

Из (3.2.9) и (3.2.10) следует

$$(3.2.11) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = g(h(\omega(a_1, \dots, a_n)))$$

Так как h - гомоморфизм, из (3.2.11) следует

$$(3.2.12) \quad {}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = g(\omega(h(a_1), \dots, h(a_n)))$$

Так как g - гомоморфизм,

$${}^*H(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))) = \omega(g(h(a_1)), \dots, g(h(a_n))) = \omega({}^*H(f(a_1)), \dots, {}^*H(f(a_n)))$$

следует из (3.2.12). Следовательно, отображение *H является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры. $\square$

Теорема 3.2.7. Если представление

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

Ω_1 -алгебры A однотранзитивно и представление


$$g : B \rightarrow {}^*N$$

Ω_1 -алгебры B однотранзитивно, то существует морфизм

$$h : A \longrightarrow B \quad H : M \longrightarrow N$$

представлений из f в g .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем гомоморфизм h . Выберем элемент $m \in M$ и элемент $n \in N$. Чтобы построить отображение H , рассмотрим следующую диаграмму



Из коммутативности диаграммы (1) следует

$$H(am) = h(a)H(m)$$

Для произвольного $m' \in M$ однозначно определён $a \in A$ такой, что $m' = am$. Следовательно, мы построили отображение H , которое удовлетворяет равенству (3.2.3). $\square$

Теорема 3.2.8. Если представление

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

Ω_1 -алгебры A однотранзитивно и представление

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

Ω_1 -алгебры B однотранзитивно, то для заданного гомоморфизма Ω_1 -алгебры

$$h : A \longrightarrow B$$

отображение

$$H : M \longrightarrow N$$

такое, что (h, H) является морфизмом представлений из f в g , единственно с точностью до выбора образа $n = H(m) \in N$ заданного элемента $m \in M$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из доказательства теоремы 3.2.7 следует, что выбор гомоморфизма h и элементов $m \in M$, $n \in N$ однозначно определяет отображение H . $\square$

Теорема 3.2.9. Если представление

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

Ω_1 -алгебры A однотранзитивно, то для любого эндоморфизма Ω_1 -алгебры A существует эндоморфизм

$$p : A \longrightarrow A \quad P : M \longrightarrow M$$

представления f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим следующую диаграмму

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{H} & M \\
 \downarrow a & & \downarrow p(a) \\
 M & \xrightarrow{H} & M \\
 \uparrow f & & \uparrow f \\
 A & \xrightarrow{p} & A
 \end{array}
 \quad (1)$$

Утверждение теоремы является следствием теоремы 3.2.7. $\square$

Теорема 3.2.10. Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление Ω_1 -алгебры A ,

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

представление Ω_1 -алгебры B ,

$$h : C \rightarrow {}^*L$$

представление Ω_1 -алгебры C . Пусть определены морфизмы представлений Ω_1 -алгебры

$$p : A \longrightarrow B \quad P : M \longrightarrow N$$


$$q : B \longrightarrow C \quad Q : N \longrightarrow L$$

Тогда определён морфизм представлений Ω_1 -алгебры

$$r : A \longrightarrow C \quad R : M \longrightarrow L$$

где $r = qp$, $R = QP$. Мы будем называть морфизм (r, R) представлений из f в h произведением морфизмов (p, P) и (q, Q) представлений универсальной алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы можем представить утверждение теоремы, пользуясь диаграммой



Отображение r является гомоморфизмом Ω_1 -алгебры A в Ω_1 -алгебру C . Нам надо показать, что пара отображений (r, R) удовлетворяет (3.2.3):

$$\begin{aligned}
 R(f(a)m) &= QP(f(a)m) \\
 &= Q(g(p(a))P(m)) \\
 &= h(qp(a))QP(m) \\
 &= h(r(a))R(m)
 \end{aligned}$$

□

Определение 3.2.11. Допустим $\mathcal{A}$ категория Ω_1 -алгебр. Мы определим категорию $T \star \mathcal{A}$ T -представлений универсальной алгебры из категории $\mathcal{A}$. Объектами этой категории являются T -представлениями Ω_1 -алгебры. Морфизмами этой категории являются морфизмы T -представлений Ω_1 -алгебр.

□

Теорема 3.2.12. Эндоморфизмы представления f порождают полугруппу.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из теоремы 3.2.10 следует, что произведение эндоморфизмов $(p, P), (r, R)$ представления f является эндоморфизмом (pr, PR) представления f .

□

Определение 3.2.13. Пусть на множестве M определена эквивалентность S . Преобразование f называется **согласованным с эквивалентностью S** , если из условия $m_1 \equiv m_2(\text{mod } S)$ следует $f(m_1) \equiv f(m_2)(\text{mod } S)$.

□

Теорема 3.2.14. Пусть на множестве M определена эквивалентность S . Пусть на множестве *M определена Ω_1 -алгебра. Если преобразования согласованы с эквивалентностью S , то мы можем определить структуру Ω_1 -алгебры на множестве ${}^*(M/S)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $h = \text{nat } S$. Если $m_1 \equiv m_2(\text{mod } S)$, то $h(m_1) = h(m_2)$. Поскольку $f \in {}^*M$ согласованно с эквивалентностью S , то $h(f(m_1)) = h(f(m_2))$.

$h(f(m_2))$). Это позволяет определить преобразование F согласно правилу

$$F([m]) = h(f(m))$$

Пусть ω - n -арная операция Ω_1 -алгебры. Пусть $f_1, \dots, f_n \in {}^*M$ и

$$F_1([m]) = h(f_1(m)) \quad \dots \quad F_n([m]) = h(f_n(m))$$

Мы определим операцию на множестве ${}^*(M/S)$ по правилу

$$\omega(F_1, \dots, F_n)[m] = h(\omega(f_1, \dots, f_n)m)$$

Это определение корректно, так как $\omega(f_1, \dots, f_n) \in {}^*M$ и согласованно с эквивалентностью S . $\square$

Теорема 3.2.15. Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление Ω_1 -алгебры A ,

$$g : B \rightarrow {}^*N$$


представление Ω_1 -алгебры B . Пусть

$$r : A \longrightarrow B \quad R : M \longrightarrow N$$

морфизм представлений из f в g . Положим

$$s = rr^{-1} \quad S = RR^{-1}$$

Тогда для отображений r, R существуют разложения, которые можно описать диаграммой



(1) $s = \ker r$ является конгруэнцией на A . Существует разложение гомоморфизма r

$$(3.2.13) \quad r = itj$$

$j = \text{nat } s$ - естественный гомоморфизм

$$(3.2.14) \quad j(a) = j(a)$$

t - изоморфизм

$$(3.2.15) \quad r(a) = t(j(a))$$

i - вложение

$$(3.2.16) \quad r(a) = i(r(a))$$

(2) $S = \ker R$ является эквивалентностью на M . Существует разложение отображения R

$$(3.2.17) \quad R = ITJ$$

$J = \text{nat } S$ - сюръекция

$$(3.2.18) \quad J(m) = J(m)$$

T - биекция

$$(3.2.19) \quad R(m) = T(J(m))$$

I - вложение

$$(3.2.20) \quad R(m) = I(R(m))$$

(3) F - $T\star$ -представление Ω_1 -алгебры A/s в M/S

(4) G - $T\star$ -представление Ω_1 -алгебры rA в RM

(5) (j, J) - морфизм представлений f и F

(6) (t, T) - морфизм представлений F и G

(7) (t^{-1}, T^{-1}) - морфизм представлений G и F

(8) (i, I) - морфизм представлений G и g

(9) Существует разложение морфизма представлений

$$(3.2.21) \quad (r, R) = (i, I)(t, T)(j, J)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Существование диаграмм (1) и (2) следует из теоремы П.3.7 ([14], с. 74).

Мы начнём с диаграммы (4).

Пусть $m_1 \equiv m_2 \pmod{S}$. Следовательно,

$$(3.2.22) \quad R(m_1) = R(m_2)$$

Если $a_1 \equiv a_2 \pmod{S}$, то

$$(3.2.23) \quad r(a_1) = r(a_2)$$

Следовательно, $j(a_1) = j(a_2)$. Так как (r, R) - морфизм представлений, то

$$(3.2.24) \quad R(f(a_1)(m_1)) = g(r(a_1))(R(m_1))$$

$$(3.2.25) \quad R(f(a_2)(m_2)) = g(r(a_2))(R(m_2))$$

Из (3.2.22), (3.2.23), (3.2.24), (3.2.25) следует

$$(3.2.26) \quad R(f(a_1)(m_1)) = R(f(a_2)(m_2))$$

Из (3.2.26) следует

$$(3.2.27) \quad f(a_1)(m_1) \equiv f(a_2)(m_2) \pmod{S}$$

и, следовательно,

$$(3.2.28) \quad J(f(a_1)(m_1)) = J(f(a_2)(m_2))$$

Из (3.2.28) следует, что отображение

$$(3.2.29) \quad F(j(a))(J(m)) = J(f(a)(m))$$

определено корректно и является преобразованием множества M/S .

Из равенства (3.2.27) (в случае $a_1 = a_2$) следует, что для любого a преобразование согласованно с эквивалентностью S . Из теоремы 3.2.14 следует, что на множестве $^*(M/S)$ определена структура Ω_1 -алгебры. Рассмотрим n -арную операцию ω и n преобразований

$$F(j(a_i))(J(m)) = J(f(a_i)(m)) \quad i = 1, \dots, n$$

пространства M/S . Мы положим

$$\omega(F(j(a_1)), \dots, F(j(a_n)))(J(m)) = J(\omega(f(a_1), \dots, f(a_n))(m))$$

Следовательно, отображение F является представлением Ω_1 -алгебры A/s .

Из (3.2.29) следует, что (j, J) является морфизмом представлений f и F (утверждение (5) теоремы).

Рассмотрим диаграмму (5).

Так как T - биекция, то мы можем отождествить элементы множества M/S и множества MR , причём это отождествление имеет вид

$$(3.2.30) \quad T(J(m)) = R(m)$$

Мы можем записать преобразование $F(j(a))$ множества M/S в виде

$$(3.2.31) \quad F(j(a)) : J(m) \rightarrow F(j(a))(J(m))$$

Так как T - биекция, то мы можем определить преобразование

$$(3.2.32) \quad T(J(m)) \rightarrow T(F(j(a))(J(m)))$$

множества RM . Преобразование (3.2.32) зависит от $j(a) \in A/s$. Так как t - биекция, то мы можем отождествить элементы множества A/s и множества rA , причём это отождествление имеет вид

$$(3.2.33) \quad t(j(a)) = r(a)$$

Следовательно, мы определили отображение

$$G : rA \rightarrow ^*RM$$

согласно равенству

$$(3.2.34) \quad G(t(j(a)))(T(J(m))) = T(F(j(a))(J(m)))$$

Рассмотрим n -арную операцию ω и n преобразований

$$G(r(a_i))(R(m)) = T(F(j(a_i))(J(m))) \quad i = 1, \dots, n$$

пространства RM . Мы положим

$$(3.2.35) \quad \omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m)) = T(\omega(F(j(a_1)), \dots, F(j(a_n)))(J(m)))$$

Согласно (3.2.34) операция ω корректно определена на множестве *RM . Следовательно, отображение G является представлением Ω_1 -алгебры.

Из (3.2.34) следует, что (t, T) является морфизмом представлений F и G (утверждение (6) теоремы).

Так как T - биекция, то из равенства (3.2.30) следует

$$(3.2.36) \quad J(m) = T^{-1}(R(m))$$

Мы можем записать преобразование $G(r(a))$ множества RM в виде

$$(3.2.37) \quad G(r(a)) : R(m) \rightarrow G(r(a))(R(m))$$

Так как T - биекция, то мы можем определить преобразование

$$(3.2.38) \quad T^{-1}(R(m)) \rightarrow T^{-1}(G(r(a))(R(m)))$$

множества M/S . Преобразование (3.2.38) зависит от $r(a) \in rA$. Так как t - биекция, то из равенства (3.2.33) следует

$$(3.2.39) \quad j(a) = t^{-1}(r(a))$$

Так как по построению диаграмма (5) коммутативна, то преобразование (3.2.38) совпадает с преобразованием (3.2.31). Равенство (3.2.35) можно записать в виде

$$(3.2.40) \quad T^{-1}(\omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m))) = \omega(F(j(a_1)), \dots, F(j(a_n)))(J(m))$$

Следовательно, (t^{-1}, T^{-1}) является морфизмом представлений G и F (утверждение (7) теоремы).

Диаграмма (6) является самым простым случаем в нашем доказательстве. Поскольку отображение I является вложением и диаграмма (2) коммутативна, мы можем отождествить $n \in N$ и $R(m)$, если $n \in \text{Im} R$. Аналогично, мы можем отождествить соответствующие преобразования.

$$(3.2.41) \quad g'(i(r(a)))(I(R(m))) = I(G(r(a))(R(m)))$$

$$\omega(g'(r(a_1)), \dots, g'(r(a_n)))(R(m)) = I(\omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m)))$$

Следовательно, (i, I) является морфизмом представлений G и g (утверждение (8) теоремы).

Для доказательства утверждения (9) теоремы осталось показать, что определённое в процессе доказательства представление g' совпадает с представлением g , а операции над преобразованиями совпадают с соответствующими операциями на $*N$.

$$\begin{aligned} g'(i(r(a)))(I(R(m))) &= I(G(r(a))(R(m))) && \text{согласно (3.2.41)} \\ &= I(G(t(j(a)))(T(J(m)))) && \text{согласно (3.2.15), (3.2.19)} \\ &= IT(F(j(a))(J(m))) && \text{согласно (3.2.34)} \\ &= ITJ(f(a)(m)) && \text{согласно (3.2.29)} \\ &= R(f(a)(m)) && \text{согласно (3.2.17)} \\ &= g(r(a))(R(m)) && \text{согласно (3.2.3)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega(G(r(a_1)), \dots, G(r(a_n)))(R(m)) &= T(\omega(F(j(a_1)), \dots, F(j(a_n)))(J(m))) \\ &= T(F(\omega(j(a_1), \dots, j(a_n)))(J(m))) \\ &= T(F(j(\omega(a_1, \dots, a_n)))(J(m))) \\ &= T(J(f(\omega(a_1, \dots, a_n)))(m)) \end{aligned}$$

□

Определение 3.2.16. Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление Ω_1 -алгебры A ,

$$g : B \rightarrow {}^*N$$

представление Ω_1 -алгебры B . Пусть

$$r : A \longrightarrow B \quad R : M \longrightarrow N$$

морфизм представлений из r в R такой, что f - изоморфизм Ω_1 -алгебры и g - изоморфизм Ω_2 -алгебры. Тогда отображение (r, R) называется **изоморфизмом представлений**. $\square$

Теорема 3.2.17. В разложении (3.2.21) отображение (t, T) является изоморфизмом представлений F и G .

Доказательство. Следствие определения 3.2.16 и утверждений (6) и (7) теоремы 3.2.15. $\square$

Из теоремы 3.2.15 следует, что мы можем свести задачу изучения морфизма представлений Ω_1 -алгебры к случаю, описываемому диаграммой

$$(3.2.42) \quad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{J} & M/S \\ \downarrow f(a) & & \downarrow F(j(a)) \\ M & \xrightarrow{J} & M/S \\ \uparrow f & & \uparrow F \\ A & \xrightarrow{j} & A/s \end{array}$$

Теорема 3.2.18. Диаграмма (3.2.42) может быть дополнена представлением F_1 Ω_1 -алгебры A в множестве M/S так, что диаграмма

$$(3.2.43) \quad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{J} & M/S \\ \downarrow f(a) & & \downarrow F(j(a)) \\ M & \xrightarrow{J} & M/S \\ \uparrow f & & \uparrow F \\ A & \xrightarrow{j} & A/s \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow F_1 \\ \nearrow F \end{array}$$

коммутативна. При этом множество преобразований представления F и множество преобразований представления F_1 совпадают.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для доказательства теоремы достаточно положить


$$F_1(a) = F(j(a))$$

Так как отображение j - сюръекция, то $\text{Im} F_1 = \text{Im} F$. Так как j и F - гомоморфизмы Ω_1 -алгебры, то F_1 - также гомоморфизм Ω_1 -алгебры. $\square$

Теорема 3.2.18 завершает цикл теорем, посвящённых структуре морфизма представлений Ω_1 -алгебры. Из этих теорем следует, что мы можем упростить задачу изучения морфизма представлений Ω_1 -алгебры и ограничиться морфизмом представлений вида

$$id : A \longrightarrow A \quad R : M \longrightarrow N$$

В этом случае мы можем отождествить морфизм (id, R) представлений Ω_1 -алгебры и отображение R . Мы будем пользоваться диаграммой



для представления морфизма (id, R) представлений Ω_1 -алгебры. Из диаграммы следует

$$(3.2.44) \quad R \circ f(a) = g(a) \circ R$$

Мы дадим следующее определение по аналогии с определением 3.2.11.

Определение 3.2.19. Мы определим категорию $T \star A$ T -представлений Ω_1 -алгебры A . Объектами этой категории являются T -представлениями Ω_1 -алгебры A . Морфизмами этой категории являются морфизмы (id, R) T -представлений Ω_1 -алгебры A . $\square$

3.3. Автоморфизм представления универсальной алгебры

Определение 3.3.1. Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M . Морфизм представлений Ω_1 -алгебры

$$(r : A \rightarrow A, R : M \rightarrow M)$$

такой, что r - эндоморфизм Ω_1 -алгебры и R - эндоморфизм Ω_2 -алгебры называется **эндоморфизмом представления** f . $\square$

Определение 3.3.2. Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M . Морфизм представлений Ω_1 -алгебры

$$(r : A \rightarrow A, R : M \rightarrow M)$$

такой, что r - автоморфизм Ω_1 -алгебры и R - автоморфизм Ω_2 -алгебры называется **автоморфизмом представления** f . $\square$

Теорема 3.3.3. Пусть

$$f : A \rightarrow {}^*M$$

представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M . Множество автоморфизмов представления f порождает лупу $\mathfrak{A}(f)$.^{3.2}

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $(r, R), (p, P)$ - автоморфизмы представления f . Согласно определению 3.3.2 отображения r, p являются автоморфизмами Ω_1 -алгебры A и отображения R, P являются автоморфизмами Ω_2 -алгебры M . Согласно теореме П.3.2 ([14], с. 60) отображение rp является автоморфизмом Ω_1 -алгебры A и отображение RP является автоморфизмом Ω_2 -алгебры M . Из теоремы 3.2.10 и определения 3.3.2 следует, что произведение автоморфизмов (rp, RP) представления f является автоморфизмом представления f .

Пусть (r, R) - автоморфизм представления f . Согласно определению 3.3.2 отображение r является автоморфизмом Ω_1 -алгебры A и отображение R является автоморфизмом Ω_2 -алгебры M . Следовательно, отображение r^{-1} является автоморфизмом Ω_1 -алгебры A и отображение R^{-1} является автоморфизмом Ω_2 -алгебры M . Для автоморфизма (r, R) справедливо равенство (3.2.4). Положим $a' = r(a)$, $m' = R(m)$. Так как r и R - автоморфизмы, то $a = r^{-1}(a')$, $m = R^{-1}(m')$ и равенство (3.2.4) можно записать в виде

$$(3.3.1) \quad R(f(r^{-1}(a'))(R^{-1}(m'))) = g(a')(m')$$

аа Так как отображение R является автоморфизмом Ω_2 -алгебры M , то из равенства (3.3.1) следует

$$(3.3.2) \quad f(r^{-1}(a'))(R^{-1}(m')) = R^{-1}(g(a')(m'))$$

Равенство (3.3.2) соответствует равенству (3.2.4) для отображения (r^{-1}, R^{-1}) . Следовательно, отображение (r^{-1}, R^{-1}) является автоморфизмом представления f . $\square$

Замечание 3.3.4. Очевидно, что множество автоморфизмов Ω_1 -алгебры A также порождает лупу. Конечно, заманчиво предположить, что множество автоморфизмов порождает группу. Так как произведение автоморфизмов f и g является автоморфизмом fg , то определены автоморфизмы $(fg)h$ и $f(gh)$. Но из этого утверждения не следует, что

$$(fg)h = f(gh)$$

$\square$

3.4. Представление группы

Группа - одна из немногих алгебр, которая позволяет рассматривать произведение преобразований множества M таким образом, что если преобразования принадлежат представлению, то их произведение также принадлежит представлению. В случае представления групп гомоморфизм (3.1.1) может быть определён либо как

$$f(ab) = f(a) \circ f(b)$$

^{3.2}Определение лупы приведено в [5], с. 24, [4], с. 39.

либо как

$$f(ab) = f(b) \circ f(a)$$

При этом следует помнить, что порядок отображений при суперпозиции зависит от порядка отображений на диаграмме и с какой стороны отображения действуют на элементы множества.

Определение 3.4.1. Пусть *M - группа и δ - единица группы *M . Пусть G - группа. Мы будем называть гомоморфизм групп

$$(3.4.1) \quad f : G \rightarrow {}^*M$$

ковариантным $T\star$ -представлением группы G в множестве M , если отображение f удовлетворяет условиям

$$(3.4.2) \quad f(ab)u = f(a)(f(b)u)$$

□

Замечание 3.4.2. Поскольку отображение (3.4.1) - гомоморфизм, то

$$(3.4.3) \quad f(ab)u = (f(a)f(b))u$$

Мы здесь пользуемся соглашением

$$f(a)f(b) = f(a) \circ f(b)$$

Таким образом, концепция ковариантного представления состоит в том, что в каком порядке мы перемножаем элементы группы, в том же порядке перемножаются соответствующие преобразования представления. Из равенств (3.4.2) и (3.4.3) следует

$$(3.4.4) \quad (f(a)f(b))u = f(a)(f(b)u)$$

Равенство (3.4.4) совместно с ассоциативностью произведения преобразований представляет собой **закон ассоциативности для ковариантного $T\star$ -представления**. Это позволяет записывать равенство (3.4.4) без использования скобок

$$f(ab)u = f(a)f(b)u$$

□

Определение 3.4.3. Пусть *M - группа и δ - единица группы *M . Пусть G - группа. Мы будем называть антигомоморфизм групп

$$f : G \rightarrow {}^*M$$

контравариантным $T\star$ -представлением группы G в множестве M , если отображение f удовлетворяет условиям

$$(3.4.5) \quad f(ba)u = f(a)(f(b)u)$$

□

Определение 3.4.4. Пусть M^* - группа и δ - единица группы M^* . Пусть G - группа. Мы будем называть гомоморфизм групп

$$(3.4.6) \quad f : G \rightarrow M^*$$

ковариантным $\star T$ -представлением группы G в множестве M , если отображение f удовлетворяет условиям

$$(3.4.7) \quad uf(ab) = (uf(a))f(b)$$

□

Замечание 3.4.5. Поскольку отображение (3.4.6) - гомоморфизм, то

$$(3.4.8) \quad uf(ab) = u(f(a)f(b))$$

Из равенств (3.4.7) и (3.4.8) следует

$$(3.4.9) \quad u(f(a)f(b)) = (uf(a))f(b)$$

Равенство (3.4.9) совместно с ассоциативностью произведения преобразований представляет собой **закон ассоциативности для ковариантного $\star T$ -представления**. Это позволяет записывать равенство (3.4.9) без использования скобок

$$uf(ab) = uf(a)f(b)$$

□

Определение 3.4.6. Пусть $M^\star$ - группа и δ - единица группы $^\star M$. Пусть G - группа. Мы будем называть отображение

$$f : G \rightarrow M^\star$$

контравариантным $\star T$ -представлением группы G в множестве M , если отображение f удовлетворяет условиям

$$(3.4.10) \quad uf(ba) = (uf(a))f(b)$$

□

Определение 3.4.7. Мы будем называть преобразование

$$t : M \rightarrow M$$

невырожденным преобразованием, если существует обратное отображение. □

Теорема 3.4.8. Для любого $g \in G$ преобразование $f(g)$ является невырожденным и удовлетворяет равенству

$$(3.4.11) \quad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. На основании (3.4.5) и

$$f(e) = \delta$$

мы можем записать

$$u = \delta(u) = f(gg^{-1})(u) = f(g)(f(g^{-1})(u))$$

Это завершает доказательство. □

Теорема 3.4.9. Групповая операция определяет два различных представления на группе:

- **Левый** или $T\star$ -сдвиг $t_\star$,

$$(3.4.12) \quad \begin{aligned} b' &= t_\star(a)b = ab \\ b' &= t_\star(a)(b) = ab \end{aligned}$$

является ковариантным $T\star$ -представлением

$$(3.4.13) \quad t_\star(ab) = t_\star(a) \circ t_\star(b)$$

- **Правый или $\star T$ -сдвиг $\star t$,**

$$(3.4.14) \quad \begin{aligned} b' &= b \star t(a) = ba \\ b' &= \star t(a)(b) = ba \end{aligned}$$

является ковариантным $\star T$ -представлением

$$(3.4.15) \quad \star t(ab) = \star t(a) \circ \star t(b)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. $T\star$ -сдвиг не является представлением группы в группе, так как преобразование $t_\star$ не является гомоморфизмом группы. $T\star$ -сдвиг является представлением группы в множестве, являющимся носителем этой группы. Аналогичное замечание верно для $\star T$ -сдвига.

Равенство (3.4.13) следует из ассоциативности произведения

$$t_\star(ab)c = (ab)c = a(bc) = t_\star(a)(t_\star(b)c) = (t_\star(a) \circ t_\star(b))c$$

Аналогично доказывается равенство (3.4.15). □

Теорема 3.4.10. Пусть $T\star$ -представление

$$u' = f(a)u$$

является контравариантным $T\star$ -представлением. Тогда $T\star$ -представление

$$u' = h(a)u = f(a^{-1})u$$

является ковариантным $T\star$ -представлением.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение следует из цепочки равенств

$$h(ab) = f((ab)^{-1}) = f(b^{-1}a^{-1}) = f(a^{-1})f(b^{-1}) = h(a)h(b)$$

□

Замечание 3.4.11. Если предположить, что выбор с какой стороны писать оператор представления произволен, то может создаться впечатление, что мы можем ограничиться рассмотрением либо $T\star$ -представлений, либо ковариантных представлений. Раздел 5.2 служит хорошей иллюстрацией, что разные формы представления существенны. В тех случаях, когда необходимо указать порядок сомножителей, мы будем пользоваться операторной формой записи. Теоремы 3.5.12, 3.5.15 являются примерами, когда функциональная запись имеет преимущество. □

Определение 3.4.12. Пусть f - $T\star$ -представление группы G в множестве M . Для любого $v \in M$ мы определим **орбиту $T\star$ -представления группы G** как множество

$$f(G)v = \{w = f(g)v : g \in G\}$$

□

Так как $f(e) = \delta$, то $v \in f(G)v$.

Теорема 3.4.13. Если

$$(3.4.16) \quad v \in f(G)u$$

то

$$f(G)u = f(G)v$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из (3.4.16) следует существование $a \in G$ такого, что

$$(3.4.17) \quad v = f(a)u$$

Если $w \in f(G)v$, то существует $b \in G$ такой, что

$$(3.4.18) \quad w = f(b)v$$

Подставив (3.4.17) в (3.4.18), мы получим

$$(3.4.19) \quad w = f(b)(f(a)u)$$

На основании (3.4.2) из (3.4.19) следует, что $w \in f(G)u$. Таким образом,

$$f(G)v \subseteq f(G)u$$

На основании (3.4.11) из (3.4.17) следует, что

$$(3.4.20) \quad u = f(a)^{-1}v = f(a^{-1})v$$

Равенство (3.4.20) означает, что $u \in f(G)v$ и, следовательно,

$$f(G)u \subseteq f(G)v$$

Это завершает доказательство. $\square$

Таким образом, $T\star$ -представление f группы G в множестве M порождает отношение эквивалентности S и орбита $f(G)u$ является классом эквивалентности. Мы будем пользоваться обозначением $M/f(G)$ для фактор множества M/S и мы будем называть это множество **пространством орбит $T\star$ -представления f** .

Теорема 3.4.14. *Если определены $T\star$ -представление f_1 группы G в множестве M_1 и $T\star$ -представление f_2 группы G в множестве M_2 , то мы можем определить **прямое произведение $T\star$ -представлений f_1 и f_2 группы***

$$\begin{aligned} f &= f_1 \times f_2 : G \rightarrow M_1 \otimes M_2 \\ f(g) &= (f_1(g), f_2(g)) \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Чтобы показать, что f является представлением, достаточно показать, что f удовлетворяет определению 3.4.1.

$$f(e) = (f_1(e), f_2(e)) = (\delta_1, \delta_2) = \delta$$

$$\begin{aligned} f(ab)u &= (f_1(ab)u_1, f_2(ab)u_2) \\ &= (f_1(a)(f_1(b)u_1), f_2(a)(f_2(b)u_2)) \\ &= f(a)(f_1(b)u_1, f_2(b)u_2) \\ &= f(a)(f(b)u) \end{aligned}$$

$\square$

3.5. Однотранзитивное $T\star$ -представление группы

Определение 3.5.1. Мы будем называть **ядром неэффективности** $T\star$ -представления группы G множество

$$K_f = \{g \in G : f(g) = \delta\}$$

□

Теорема 3.5.2. Ядро неэффективности $T\star$ -представления группы G - это подгруппа группы G .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим $f(a_1) = \delta$ и $f(a_2) = \delta$. Тогда

$$\begin{aligned} f(a_1 a_2)u &= f(a_1)(f(a_2)u) = u \\ f(a^{-1}) &= f^{-1}(a) = \delta \end{aligned}$$

□

Теорема 3.5.3. $T\star$ -представление группы G эффективно тогда и только тогда, когда ядро неэффективности $K_f = \{e\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение является следствием определений 3.1.8 и 3.5.1 и теоремы 3.5.2. □

Если действие не эффективно, мы можем перейти к эффективному заменив группой $G_1 = G/K_f$, пользуясь факторизацией по ядру неэффективности. Это означает, что мы можем изучать только эффективное действие.

Определение 3.5.4. Рассмотрим $T\star$ -представление f группы G в множестве M . **Малая группа** или **группа стабилизации** элемента $x \in M$ - это множество

$$G_x = \{g \in G : f(g)x = x\}$$

Мы будем называть $T\star$ -представление f группы G **свободным**, если для любого $x \in M$ группа стабилизации $G_x = \{e\}$. □

Теорема 3.5.5. Если определено свободное $T\star$ -представление f группы G на множестве A , то определено взаимно однозначное соответствие между орбитами представления, а также между орбитой представления и группой G .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим для точки $a \in A$ существуют $g_1, g_2 \in G$

$$(3.5.1) \quad f(g_1)a = f(g_2)a$$

Умножим обе части равенства (3.5.1) на $f(g_1^{-1})$

$$a = f(g_1^{-1})f(g_2)a$$

Поскольку представление свободное, $g_1 = g_2$. Теорема доказана, так как мы установили взаимно однозначное соответствие между орбитой и группой G . □

Определение 3.5.6. Мы будем называть пространство V **однородным пространством группы G** , если мы имеем однотранзитивное $T\star$ -представление группы G на V . □

Теорема 3.5.7. Если мы определим однотранзитивное ковариантное представление f группы G на многообразии A , то мы можем однозначно определить координаты на A , пользуясь координатами на группе G .

Если f - ковариантное $T\star$ -представление, то $f(a)$ эквивалентно $T\star$ -сдвигу $t_\star(a)$ на группе G . Если f - ковариантное $\star T$ -представление, то $f(a)$ эквивалентно $\star T$ -сдвигу $\star t(a)$ на группе G .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы выберем точку $v \in A$ и определим координаты точки $w \in A$ как координаты $a \in G$ такого, что $w = f(a)v$. Координаты, определённые таким образом, однозначны с точностью до выбора начальной точки $v \in A$, так как действие эффективно.

Если f - ковариантное $T\star$ -представление, мы будем пользоваться записью

$$f(a)v = av$$

Так как запись

$$f(a)(f(b)v) = a(bv) = (ab)v = f(ab)v$$

совместима с групповой структурой, мы видим, что ковариантное $T\star$ -представление f эквивалентно $T\star$ -сдвигу.

Если f - ковариантное $\star T$ -представление, мы будем пользоваться записью

$$vf(a) = va$$

Так как запись

$$(vf(b))f(a) = (vb)a = v(ba) = vf(ba)$$

совместима с групповой структурой, мы видим, что ковариантное $\star T$ -представление f эквивалентно $\star T$ -сдвигу. $\square$

Замечание 3.5.8. Мы будем записывать $T\star$ -ковариантное эффективное представление группы G в форме

$$v' = t_\star(a)v = av$$

Орбита этого представления имеет вид

$$Gv = t_\star(G)v$$

Мы будем пользоваться обозначением $M/t_\star(G)$ для пространства орбит $T\star$ -ковариантного эффективного представления группы. $\square$

Замечание 3.5.9. Мы будем записывать $\star T$ -ковариантное эффективное представление группы G в форме

$$v' = v \star t(a) = va$$

Орбита этого представления имеет вид

$$vG = v \star t(G)$$

Мы будем пользоваться обозначением $M/\star t(G)$ для пространства орбит $\star T$ -ковариантного эффективного представления группы. $\square$

Теорема 3.5.10. Свободное $T\star$ -представление эффективно. Свободное $T\star$ -представление f группы G в множестве M однотранзитивно на орбите.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие определения 3.5.4. $\square$

Теорема 3.5.11. $T\star$ - и $\star T$ -сдвиги на группе G перестановочны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Это следствие ассоциативности группы G

$$(t_*(a) \circ {}_*(t(b))c = a(cb) = (ac)b = ({}_*(t(b)) \circ t_*(a))c$$

□

Теорема 3.5.11 может быть сформулирована следующим образом.

Теорема 3.5.12. Пусть G - группа. Для любого $a \in G$ отображение $(id, t_*(a))$ является автоморфизмом представления ${}_*(t)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 3.5.11

$$(3.5.2) \quad t_*(a) \circ {}_*(t(b)) = {}_*(t(b)) \circ t_*(a)$$

Равенство (3.5.2) совпадает с равенством (3.2.3) из определения 3.2.2 при условии $r = id$, $R = t_*(a)$. □

Теорема 3.5.13. Если мы определили однотранзитивное ковариантное T_* -представление f группы G на многообразии M , то мы можем однозначно определить однотранзитивное ковариантное ${}_*(T)$ -представление h группы G на многообразии M такое, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{h(a)} & M \\ \downarrow f(b) & & \downarrow f(b) \\ M & \xrightarrow{h(a)} & M \end{array}$$

коммутативна для любых $a, b \in G$.^{3.3}

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы будем пользоваться групповыми координатами для точек $v \in M$. Тогда согласно теореме 3.5.7 мы можем записать T_* -сдвиг $t_*(a)$ вместо преобразования $f(a)$.

Пусть точки $v_0, v \in M$. Тогда мы можем найти одно и только одно $a \in G$ такое, что

$$v = v_0 a = v_0 {}_*(t(a))$$

Мы предположим

$$h(a) = {}_*(t(a))$$

Существует $b \in G$ такое, что

$$w_0 = f(b)v_0 = t_*(b)v_0 \quad w = f(b)v = t_*(b)v$$

Согласно теореме 3.5.11 диаграмма

$$(3.5.3) \quad \begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a) = {}_*(t(a))} & v \\ \downarrow f(b) = t_*(b) & & \downarrow f(b) = t_*(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a) = {}_*(t(a))} & w \end{array}$$

коммутативна.

Изменяя b мы получим, что w_0 - это произвольная точка, принадлежащая M .

^{3.3}Это утверждение можно также найти в [3].

Мы видим из диаграммы, что, если $v_0 = v$ then $w_0 = w$ и следовательно $h(e) = \delta$. С другой стороны, если $v_0 \neq v$, то $w_0 \neq w$ потому, что $T\star$ -представление f однотранзитивно. Следовательно $\star T$ -представление h эффективно.

Таким же образом мы можем показать, что для данного w_0 мы можем найти a такое, что $w = h(a)w_0$. Следовательно $\star T$ -представление h однотранзитивно.

В общем случае, произведение преобразований $T\star$ -представления f не коммутативно и следовательно $\star T$ -представление h отлично от $T\star$ -представления f . Таким же образом мы можем создать $T\star$ -представление f , пользуясь $\star T$ -представлением h . $\square$

Мы будем называть представления f и h **парными представлениями группы G** .

Замечание 3.5.14. Очевидно, что преобразования $t_\star(a)$ и $\star t(a)$ отличаются, если группа G неабелева. Тем не менее, они являются отображениями на. Теорема 3.5.13 утверждает, что, если оба представления $\star T$ - и $T\star$ -сдвига существуют на многообразии M , то мы можем определить два перестановочных представления на многообразии M . Только $T\star$ - или $\star T$ -сдвиг не может представлять оба типа представления. Чтобы понять почему это так, мы можем изменить диаграмму (3.5.3) и предположить $h(a)v_0 = t_\star(a)v_0 = v$ вместо $h(a)v_0 = v_0\star t(a) = v$ и проанализировать, какое выражение $h(a)$ имеет в точке w_0 . Диаграмма

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=t_\star(a)} & v \\ \downarrow f(b)=t_\star(b) & & \downarrow f(b)=t_\star(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

эквивалентна диаграмме

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=t_\star(a)} & v \\ \uparrow f^{-1}(b)=t_\star(b^{-1}) & & \downarrow f(b)=t_\star(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

и мы имеем $w = bv = bav_0 = bab^{-1}w_0$. Следовательно

$$h(a)w_0 = (bab^{-1})w_0$$

Мы видим, что представление h зависит от его аргумента. $\square$

Теорема 3.5.15. Пусть f и h - парные представления группы G . Для любого $a \in G$ отображение $(id, h(a))$ является автоморфизмом представления f .

Доказательство. Следствие теорем 3.5.12 и 3.5.13. $\square$

Замечание 3.5.16. Существует ли автоморфизм представления $t_\star$, отличный от автоморфизма $(id, \star t(a))$? Если мы положим

$$r(g) = cgc^{-1}$$

$$R(a)(m) = mac^{-1}$$

то нетрудно убедиться, что отображение $(r, R(a))$ является автоморфизмом представления $t_\star$. $\square$

Векторное пространство над телом

4.1. Векторное пространство

Чтобы определить $T\star$ -представление

$$f : R \rightarrow {}^*\overline{M}$$

кольца R на множестве $\overline{M}$ мы должны определить структуру кольца на множестве ${}^*\overline{M}$.^{4.1}

Теорема 4.1.1. *$T\star$ -представление f кольца R на множестве $\overline{M}$ определено тогда и только тогда, когда определены $T\star$ -представления мультипликативной и аддитивной групп кольца R и эти $T\star$ -представления удовлетворяют соотношению*

$$f(a(b+c)) = f(a)f(b) + f(a)f(c)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема следует из определения 3.1.4. $\square$

Определение 4.1.2. $\overline{M}$ - $R\star$ -модуль над кольцом R , если $\overline{M}$ - абелева группа и определено $T\star$ -представление кольца R . $\square$

Согласно нашим обозначениям $R\star$ -модуль - это **левый модуль** и *R -модуль - это **правый модуль**.

Поле является частным случаем кольца. Поэтому векторное пространство над полем имеет больше свойств чем модуль над кольцом. Очень трудно, если вообще возможно, распространить определения, работающие в векторном пространстве, на модуль над произвольным кольцом. Определение базиса и

^{4.1}Можно ли определить операцию сложения на множестве ${}^*\overline{M}$, если эта операция не определена на множестве $\overline{M}$. Ответ на этот вопрос положительный.

Допустим $\overline{M} = B \cup C$ и $F : B \rightarrow C$ - взаимно однозначное отображение. Мы определим множество ${}^*\overline{M}$ $T\star$ -преобразований множества $\overline{M}$ согласно следующему правилу. Пусть $V \subseteq B$. $T\star$ -отображение F_V имеет вид

$$F_V x = \begin{cases} x & x \in B \setminus V \\ Fx & x \in V \\ x & x \in C \setminus F(V) \\ F^{-1}x & x \in F(V) \end{cases}$$

Мы определим сложение $T\star$ -преобразований по правилу

$$\begin{aligned} F_V + F_W &= F_{V \triangle W} \\ V \triangle W &= (V \cup W) \setminus (V \cap W) \end{aligned}$$

Очевидно, что

$$\begin{aligned} F_\emptyset + F_V &= F_V \\ F_V + F_V &= F_\emptyset \end{aligned}$$

Следовательно, отображение $F_\emptyset$ является нулём относительно сложения, а множество ${}^*\overline{M}$ является абелевой группой.

размерности векторного пространства тесно связаны с возможностью найти решение линейного уравнения в кольце. Свойства линейного уравнения в теле близки к свойствам линейного уравнения в поле. Поэтому мы надеемся что свойства векторного пространства над телом близки к свойствам векторного пространства над полем.

Теорема 4.1.3. *$T\star$ -представление тела D эффективно, если эффективно $T\star$ -представление мультипликативной группы тела D .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть

$$(4.1.1) \quad f : D \rightarrow {}^*M$$

$T\star$ -представление тела D . Если элементы a, b мультипликативной группы порождают одно и то $T\star$ -преобразование, то

$$(4.1.2) \quad f(a)m = f(b)m$$

для любого $m \in M$. Выполняя преобразование $f(a^{-1})$ над обеими частями равенства (4.1.2), мы получим

$$m = f(a^{-1})(f(b)m) = f(a^{-1}b)m$$

□

Согласно замечанию 3.1.9, если представление тела эффективно, мы отождествляем элемент тела и соответствующее ему $T\star$ -преобразование.

Определение 4.1.4. $\bar{V}$ - $D\star$ -векторное пространство над телом D , если $\bar{V}$ - абелева группа и определено эффективное $T\star$ -представление тела D . □

Теорема 4.1.5. *Элементы $D\star$ -векторного пространства $\bar{V}$ удовлетворяют соотношениям*

- закону ассоциативности

$$(4.1.3) \quad (ab)\bar{m} = a(b\bar{m})$$

- закону дистрибутивности

$$(4.1.4) \quad a(\bar{m} + \bar{n}) = a\bar{m} + a\bar{n}$$

$$(4.1.5) \quad (a + b)\bar{m} = a\bar{m} + b\bar{m}$$

- закону унитарности

$$(4.1.6) \quad 1\bar{m} = \bar{m}$$

для любых $a, b \in D$, $\bar{m}, \bar{n} \in \bar{V}$. Мы будем называть $T\star$ -представление $D\star$ -произведением вектора на скаляр.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (4.1.4) следует из утверждения, что $T\star$ -преобразование a является автоморфизмом абелевой группы. Равенство (4.1.5) следует из утверждения, что $T\star$ -представление является гомоморфизмом аддитивной группы тела D . Равенства (4.1.3) и (4.1.6) следуют из утверждения, что $T\star$ -представление является ковариантным $T\star$ -представлением мультипликативной группы тела D . □

Согласно нашим обозначениям $D\star$ -векторное пространство - это **левое векторное пространство** и $\star D$ -векторное пространство - это **правое векторное пространство**.

Определение 4.1.6. Пусть $\overline{V}$ - $D\star$ -векторное пространство над телом D . Множество векторов $\overline{N}$ - **подпространство $D\star$ -векторного пространства $\overline{V}$** , если

$$\begin{aligned}\overline{a} + \overline{b} &\in \overline{N} \\ k\overline{a} &\in \overline{N} \\ \overline{a}, \overline{b} &\in \overline{N} \quad k \in D\end{aligned}$$

□

Пример 4.1.7. Определим на множестве D_n^m $m \times n$ матриц над телом D операцию сложения

$$a + b = (a_i^j) + (b_i^j) = (a_i^j + b_i^j)$$

и умножения на скаляр

$$da = d(a_i^j) = (da_i^j)$$

$a = 0$ тогда и только тогда, когда $a_i^j = 0$ для любых i, j . Непосредственная проверка показывает, что D_n^m является $D\star$ -векторным пространством, если произведение действует слева. В противном случае D_n^m - $\star D$ -векторное пространство. Мы будем называть векторное пространство D_n^m **$D\star$ -векторным пространством матриц**. □

4.2. Тип векторного пространства

Произведение вектора на скаляр асимметрично, так как произведение определено для объектов разных множеств. Однако различие между $D\star$ - и $\star D$ -векторным пространством появляется только тогда, когда мы переходим к координатному представлению. Говоря, векторное пространство является $D\star$ - или $\star D$ -, мы указываем, с какой стороны, слева или справа, мы умножаем координаты вектора на элементы тела.

Определение 4.2.1. Допустим u, v - векторы $D\star$ -векторного пространства $\overline{V}$. Мы будем говорить, что вектор w является **$D\star$ -линейной комбинацией векторов u и v** , если мы можем записать $w = au + bv$, где a и b - скаляры. □

Мы можем распространить понятие линейной комбинации на любое конечное семейство векторов. Пользуясь обобщённым индексом для нумерации векторов, мы можем представить семейство векторов в виде одномерной матрицы. Мы пользуемся соглашением, что в заданном векторном пространстве мы представляем любое семейство векторов либо в виде $\star$ -строки, либо $\star$ -строки. Это представление определяет характер записи линейной комбинации. Рассматривая это представление в $D\star$ - или $\star D$ -векторном пространстве, мы получаем четыре разных модели векторного пространства.

Чтобы иметь возможность, не меняя записи указать, является векторное пространство $D\star$ - или $\star D$ -векторным пространством, мы вводим новое обозначение. Символ $D\star$ называется **типом векторного пространства** и означает, что мы изучаем $D\star$ -векторное пространство над телом D . Операция умножения в типе векторного пространства указывает на матричную операцию, используемую в линейной комбинации.

Пример 4.2.2. Представим множество векторов ${}^i\bar{a}$, $i \in I$, D_*^* -векторного пространства $\bar{V}$ в виде $*$ -строки

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} {}^1\bar{a} \\ \dots \\ {}^n\bar{a} \end{pmatrix}$$

и множество скаляров c_i , $i \in I$, в виде $*$ -строки

$$c = \begin{pmatrix} c_1 & \dots & c_n \end{pmatrix}$$

Тогда мы можем записать линейную комбинацию векторов ${}^i\bar{a}$ в виде

$$c_i {}^i\bar{a} = c_* {}^*\bar{a}$$

Мы пользуемся записью $D_* {}^*\bar{V}$, когда мы хотим сказать, что $\bar{V}$ - D_*^* -векторное пространство. $\square$

Пример 4.2.3. Представим множество векторов ${}_i\bar{a}$, $i \in I$, D_*^* -векторного пространства $\bar{V}$ в виде $*$ -строки

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} {}_1\bar{a} & \dots & {}_n\bar{a} \end{pmatrix}$$

и множество скаляров c^i , $i \in I$, в виде $*$ -строки

$$c = \begin{pmatrix} c^1 \\ \dots \\ c^n \end{pmatrix}$$

Тогда мы можем записать линейную комбинацию векторов ${}_i\bar{a}$ в виде

$$c^i {}_i\bar{a} = c^* {}_*\bar{a}$$

Мы пользуемся записью $D_* {}^*\bar{V}$, когда мы хотим сказать, что $\bar{V}$ - D_*^* -векторное пространство. $\square$

Пример 4.2.4. Представим множество векторов $\bar{a}^i$, $i \in I$, *D -векторного пространства $\bar{V}$ в виде $*$ -строки

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} \bar{a}^1 \\ \dots \\ \bar{a}^n \end{pmatrix}$$

и множество скаляров ${}_ic$, $i \in I$, в виде $*$ -строки

$$c = \begin{pmatrix} {}_1c & \dots & {}_nc \end{pmatrix}$$

Тогда мы можем записать линейную комбинацию векторов $\bar{a}^i$ в виде

$$\bar{a}^i {}_ic = \bar{a}^* {}_*c$$

Мы пользуемся записью $\bar{V} {}^*D$, когда мы хотим сказать, что $\bar{V}$ - *D -векторное пространство. $\square$

Пример 4.2.5. Представим множество векторов $\bar{A}_i, i \in I$, *D -векторного пространства $\bar{V}$ в виде * -строки

$$\bar{a} = \left(\bar{a}_1 \quad \dots \quad \bar{a}_n \right)$$

и множество скаляров ${}_i c, i \in I$, в виде * -строки

$$c = \begin{pmatrix} {}^1 c \\ \dots \\ {}^n c \end{pmatrix}$$

Тогда мы можем записать линейную комбинацию векторов $\bar{a}_i$ в виде

$$\bar{a}_i {}^i c = \bar{a}_* {}^* c$$

Мы пользуемся записью $\bar{V}_* {}^* D$, когда мы хотим сказать, что $\bar{V}$ - *D -векторное пространство. $\square$

Замечание 4.2.6. Мы распространим на векторное пространство и его тип соглашения, описанное в замечании 2.2.15. Например, в выражении

$$A_* {}^* B_* {}^* v \lambda$$

мы выполняем операцию умножения слева направо. Это соответствует *D -векторному пространству. Однако мы можем выполнять операцию умножения справа налево. В традиционной записи это выражение примет вид

$$\lambda v {}^* B {}^* A$$

и будет соответствовать D^* -векторному пространству. Аналогично, читая выражение снизу вверх мы получим выражение

$$A {}^* B {}^* v \lambda$$

соответствующего *D -векторному пространству. $\square$

4.3. *D -базис векторного пространства

Определение 4.3.1. Векторы $\bar{A}_i, i \in I$, *D -векторного пространства $\bar{V}$ *D -линейно независимы, если $c = 0$ следует из уравнения

$$\bar{A}_* {}^* c = 0$$

В противном случае, векторы $\bar{A}_i$ *D -линейно зависимы. $\square$

Определение 4.3.2. Множество векторов $\bar{e} = (\bar{e}_i, i \in I)$ - *D -базис векторного пространства, если векторы $\bar{e}_i$ *D -линейно независимы и добавление любого вектора к этой системе делает эту систему *D -линейно зависимой. $\square$

Теорема 4.3.3. Если $\bar{e}$ - *D -базис векторного пространства $\bar{V}$, то любой вектор $\bar{v} \in \bar{V}$ имеет одно и только одно разложение

$$(4.3.1) \quad \bar{v} = \bar{e}_* {}^* v$$

относительно этого *D -базиса.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как система векторов $\bar{e}_i$ является максимальным множеством *D -линейно независимых векторов, система векторов $\bar{v}, \bar{e}_i$ - D_* -линейно зависима и в уравнении

$$(4.3.2) \quad \bar{v}b + \bar{e}_*{}^*c = 0$$

по крайней мере b отлично от 0. Тогда равенство

$$(4.3.3) \quad \bar{v} = \bar{e}_*{}^*(-cb^{-1})$$

следует из (4.3.2). (4.3.1) следует из (4.3.3).

Допустим мы имеем другое разложение

$$(4.3.4) \quad \bar{v} = \bar{e}_*{}^*v'$$

Вычтя (4.3.1) из (4.3.4), мы получим

$$0 = \bar{e}_*{}^*(v' - v)$$

Так как векторы $\bar{e}_i$ *D -линейно независимы, мы имеем

$$v' - v = 0$$

□

Определение 4.3.4. Мы будем называть матрицу v разложения (4.3.1) **координатной матрицей вектора $\bar{v}$ в *D -базисе $\bar{e}$** и её элементы **координатами вектора $\bar{v}$ в *D -базисе $\bar{e}$** . □

Теорема 4.3.5. *Множество координат a вектора $\bar{a}$ в *D -базисе $\bar{e}$ порождают *D -векторное пространство D^n , изоморфное *D -векторному пространству $\bar{V}$. Это *D -векторное пространство называется **координатным *D -векторным пространством**, а изоморфизм **координатным *D -изоморфизмом**.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим векторы $\bar{a}$ и $\bar{b} \in \bar{V}$ имеют разложение

$$\bar{a} = \bar{e}_*{}^*a$$

$$\bar{b} = \bar{e}_*{}^*b$$

в базисе $\bar{e}$. Тогда

$$\bar{a} + \bar{b} = \bar{e}_*{}^*a + \bar{e}_*{}^*b = \bar{e}_*{}^*(a + b)$$

$$\bar{a}m = (\bar{e}_*{}^*a)m = \bar{e}_*{}^*(ma)$$

для любого $m \in D$. Таким образом, операции в векторном пространстве определены по координатно

$${}^i(a + b) = {}^i a + {}^i b$$

$${}^i(am) = {}^i am$$

Это доказывает теорему. □

Пример 4.3.6. Пусть $\bar{e} = (\bar{e}_i, i \in I, |I| = n)$ - *D -базис векторного пространства D^n . Координатная матрица

$$a = \begin{pmatrix} {}^1a \\ \dots \\ {}^n a \end{pmatrix} = ({}^i a, i \in I)$$

вектора $\bar{a}$ в *D -базисе $\bar{e}$ называется *D -вектором.^{4.2} Мы будем называть векторное пространство D^n *D -векторным пространством * -строк.

Пусть * -строка

$$(4.3.5) \quad \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc} \bar{A}_1 & \dots & \bar{A}_m \end{array} \right) = (\bar{A}_j, j \in J)$$

задаёт множество векторов. Векторы $\bar{A}_j$ имеют разложение

$$\bar{A}_j = \bar{e}_* {}^*A_j$$

Если мы подставим координатные матрицы вектора $\bar{A}_j$ в матрицу (4.3.5), мы получим матрицу

$$A = \left(\left(\begin{array}{c} {}^1A_1 \\ \dots \\ {}^nA_1 \end{array} \right) \dots \left(\begin{array}{c} {}^1A_m \\ \dots \\ {}^nA_m \end{array} \right) \right) = \left(\begin{array}{ccc} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_m \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^nA_1 & \dots & {}^nA_m \end{array} \right) = ({}^iA_j)$$

Мы будем называть матрицу A **координатной матрицей множества векторов** $(\bar{A}_j, j \in J)$ в базисе $\bar{e}$ и её элементы **координатами множества векторов** $(\bar{A}_j, j \in J)$ в базисе $\bar{e}$.

Мы будем представлять *D -базис $\bar{f}$ векторного пространства * -строк D^n в форме * -строки

$$\bar{f} = \left(\begin{array}{ccc} \bar{f}_1 & \dots & \bar{f}_n \end{array} \right) = (\bar{f}_j, j \in I)$$

Мы будем говорить, что координатная матрица f множества векторов $(\bar{f}_j, j \in I)$ определяет координаты if_j базиса $\bar{f}$ относительно базиса $\bar{e}$. $\square$

Пример 4.3.7. Пусть $\bar{e} = ({}^je, j \in J, |J| = m)$ - $D_*{}^*$ -базис векторного пространства D_n . координатная матрица

$$a = \left(\begin{array}{ccc} a_1 & \dots & a_m \end{array} \right) = (a_j, j \in J)$$

вектора $\bar{a}$ в $D_*{}^*$ -базисе $\bar{e}$ называется $D_*{}^*$ -вектором.^{4.3} Мы будем называть векторное пространство D_n $D_*{}^*$ -векторным пространством * -строк.

Пусть * -строка

$$(4.3.6) \quad \bar{A} = \left(\begin{array}{c} {}^1\bar{A} \\ \dots \\ {}^n\bar{A} \end{array} \right) = ({}^i\bar{A}, i \in I)$$

задаёт множество векторов. Векторы ${}^i\bar{A}$ имеют разложение

$${}^i\bar{A} = {}^iA_* {}^*e$$

^{4.2} *D -вектор является аналогом вектор-столбца. Мы можем называть его также D_* -вектор * -строкой

^{4.3} $D_*{}^*$ -вектор является аналогом вектор-строки. Мы можем называть его также D_* -вектор * -строкой

Если мы подставим координатные матрицы вектора ${}^i\bar{A}$ в матрицу (4.3.6), мы получим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_m \end{pmatrix} \\ \vdots \\ \begin{pmatrix} {}^nA_1 & \dots & {}^nA_m \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_m \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ {}^nA_1 & \dots & {}^nA_m \end{pmatrix} = ({}^iA_j)$$

Мы будем называть матрицу A **координатной матрицей множества векторов** $({}^i\bar{A}, i \in M)$ в базисе $\bar{e}$ и её элементы **координатами множества векторов** $({}^i\bar{A}, i \in M)$ в базисе $\bar{e}$.

Мы будем представлять D_*^* -базис $\bar{f}$ векторного пространства $*$ -строк D_n в форме $*$ -строки

$$\bar{f} = \begin{pmatrix} {}^1\bar{f} & \dots & {}^n\bar{f} \end{pmatrix} = ({}^i\bar{f}, i \in J)$$

Мы будем говорить, что координатная матрица f множества векторов $({}^i\bar{f}, i \in J)$ определяет координаты if_j базиса $\bar{f}$ относительно базиса $\bar{e}$. $\square$

Так как мы линейную комбинацию выражаем с помощью матриц, мы можем распространить принцип двойственности на теорию векторных пространств. Мы можем записать принцип двойственности в одной из следующих форм

Теорема 4.3.8 (принцип двойственности). Пусть $\mathfrak{A}$ - истинное утверждение о векторных пространствах. Если мы заменим одновременно

- D_*^* -вектор и D_*^* -вектор
- $*$ - D -вектор и $*$ - D -вектор
- $*$ -произведение и $*$ -произведение

то мы снова получим истинное утверждение.

Теорема 4.3.9 (принцип двойственности). Пусть $\mathfrak{A}$ - истинное утверждение о векторных пространствах. Если мы одновременно заменим

- D_*^* -вектор и $*$ - D -вектор или D_*^* -вектор и $*$ - D -вектор
- $*$ -квазидетерминант и $*$ -квазидетерминант

то мы снова получим истинное утверждение.

4.4. $*$ - D -линейное отображение векторных пространств

Определение 4.4.1. Пусть $\bar{V}$ - $*$ - S -векторное пространство. Пусть $\bar{U}$ - $*$ - T -векторное пространство. Мы будем называть морфизм

$$f : S \longrightarrow T \quad \bar{A} : \bar{V} \longrightarrow \bar{U}$$

T -представлений тела в абелевой группе $(*_S, *_T)$ -линейным отображением векторных пространств. $\square$

Согласно теореме 3.2.15 при изучении $(*_S, *_T)$ -линейного отображения мы можем ограничиться случаем $S = T$.

Определение 4.4.2. Пусть $\bar{V}$ и $\bar{W}$ - $*$ - D -векторные пространства. Мы будем называть отображение

$$(4.4.1) \quad \bar{A} : \bar{V} \rightarrow \bar{W}$$

*D -линейным отображением векторных пространств, если^{4.4}

$$(4.4.2) \quad \overline{A}(\overline{m}_* {}^*a) = \overline{A}(\overline{m})_* {}^*a$$

для любых ${}^i a \in D, \overline{m}_i \in \overline{V}$. □

Теорема 4.4.3. Пусть

$$\overline{\overline{f}} = (\overline{f}_i, i \in I)$$

*D -базис в векторном пространстве $\overline{V}$ и

$$\overline{\overline{e}} = (\overline{e}_j, j \in J)$$

*D -базис в векторном пространстве $\overline{U}$. Тогда *D -линейное отображение (4.4.1) векторных пространств имеет представление

$$(4.4.3) \quad b = A_* {}^*a$$

относительно заданных базисов. Здесь

- a - координатная матрица вектора $\overline{a}$ относительно *D -базиса $\overline{\overline{f}}$
- b - координатная матрица вектора

$$\overline{b} = \overline{A}(\overline{a})$$

относительно *D -базиса $\overline{\overline{e}}$

- A - координатная матрица множества векторов $(\overline{A}(\overline{f}_i))$ в *D -базисе $\overline{\overline{e}}$, которую мы будем называть матрицей *D -линейного отображения относительно базисов $\overline{\overline{f}}$ и $\overline{\overline{e}}$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вектор $\overline{a} \in \overline{V}$ имеет разложение

$$\overline{a} = \overline{f}_* {}^*a$$

относительно *D -базиса $\overline{\overline{f}}$. Вектор $\overline{b} = \overline{f}(\overline{a}) \in \overline{U}$ имеет разложение

$$(4.4.4) \quad \overline{b} = \overline{e}_* {}^*b$$

относительно *D -базиса $\overline{\overline{e}}$.

Так как $\overline{A}$ - *D -линейное отображение, то на основании (4.4.2) следует, что

$$(4.4.5) \quad \overline{b} = \overline{A}(\overline{a}) = \overline{A}(\overline{f}_* {}^*a) = \overline{A}(\overline{f})_* {}^*a$$

$\overline{A}(\overline{f}_i)$ также вектор векторного пространства $\overline{U}$ и имеет разложение

$$(4.4.6) \quad \overline{A}(\overline{f}_i) = \overline{e}_* {}^*A_i = \overline{e}_j {}^j A_i$$

относительно базиса $\overline{\overline{e}}$. Комбинируя (4.4.5) и (4.4.6), мы получаем

$$(4.4.7) \quad \overline{b} = \overline{e}_* {}^*A_* {}^*a$$

(4.4.3) следует из сравнения (4.4.4) и (4.4.7) и теоремы 4.3.3. □

На основании теоремы 4.4.3 мы идентифицируем *D -линейное отображение (4.4.1) векторных пространств и матрицу его представления (4.4.3).

^{4.4}Выражение $\overline{A}(\overline{m})_* {}^*a$ означает выражение $\overline{A}(\overline{m}_i) {}^i a$

Теорема 4.4.4. Пусть

$$\overline{\overline{f}} = (\overline{f}_i, i \in I)$$

*D -базис в векторном пространстве $\overline{V}$,

$$\overline{\overline{e}} = (\overline{e}_j, j \in J)$$

*D -базис в векторном пространстве $\overline{U}$, и

$$\overline{\overline{g}} = (\overline{g}_l, l \in L)$$

*D -базис в векторном пространстве $\overline{W}$. Предположим, что мы имеем коммутативную диаграмму отображений

$$\begin{array}{ccc} \overline{V} & \xrightarrow{\overline{C}} & \overline{W} \\ & \searrow \overline{A} \quad \nearrow \overline{B} & \\ & \overline{U} & \end{array}$$

где *D -линейное отображение $\overline{A}$ имеет представление

$$(4.4.8) \quad b = A_*^* a$$

относительно заданных базисов и *D -линейное отображение $\overline{B}$ имеет представление

$$(4.4.9) \quad c = B_*^* b$$

относительно заданных базисов. Тогда отображение $\overline{C}$ является *D -линейным и имеет представление

$$(4.4.10) \quad c = B_*^* A_*^* a$$

относительно заданных базисов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отображение $\overline{C}$ является *D -линейным, так как

$$\begin{aligned} \overline{C}_*^* (\overline{f}_*^* a) &= (\overline{A}_*^* \overline{B}_*^*)_*^* (\overline{f}_*^* a) \\ &= \overline{B}_*^* (\overline{A}_*^* (\overline{f}_*^* a)) \\ &= \overline{B}_*^* (\overline{e}_*^* (A_*^* a)) \\ &= \overline{g}_*^* (B_*^* (A_*^* a)) \\ &= \overline{g}_*^* ((B_*^* A)_*^* a) \\ &= \overline{g}_*^* (C_*^* a) \end{aligned}$$

Равенство (4.4.10) следует из подстановки (4.4.8) в (4.4.9). $\square$

Записывая *D -линейное отображение в форме * -произведения, мы можем переписать (4.4.2) в виде

$$(4.4.11) \quad \overline{A}_*^* (\overline{a}k) = (\overline{A}_*^* \overline{a})k$$

Утверждение теоремы 4.4.4 мы можем записать в виде

$$(4.4.12) \quad \overline{B}_*^* (\overline{A}_*^* \overline{a}) = (\overline{B}_*^* \overline{a})_*^* \overline{a}$$

Равенства (4.4.11) и (4.4.12) представляют собой закон ассоциативности для *D -линейных отображений векторных пространств. Это позволяет нам писать подобные выражения не пользуясь скобками.

Равенство (4.4.3) является координатной записью *D -линейного отображения. На основе теоремы 4.4.3 бескоординатная запись также может быть представлена с помощью * -произведения

$$(4.4.13) \quad \bar{b} = \bar{A}_* {}^* \bar{a} = \bar{A}_* {}^* \bar{f}_* {}^* a = \bar{e}_* {}^* A_* {}^* a$$

Если подставить равенство (4.4.13) в теорему 4.4.4, то мы получим цепочку равенств

$$\begin{aligned} \bar{c} &= \bar{B}_* {}^* \bar{b} = \bar{B}_* {}^* \bar{e}_* {}^* b = \bar{g}_* {}^* B_* {}^* b \\ \bar{c} &= \bar{B}_* {}^* \bar{A}_* {}^* \bar{a} = \bar{B}_* {}^* \bar{A}_* {}^* \bar{f}_* {}^* a = \bar{g}_* {}^* B_* {}^* A_* {}^* a \end{aligned}$$

Замечание 4.4.5. На примере *D -линейных отображений легко видеть насколько теорема 3.2.15 облегчает наши рассуждения при изучении морфизма T -представлений Ω -алгебры. Договоримся в рамках этого замечания теорию *D -линейных отображений называть сокращённой теорией, а теорию, излагаемую в этом замечании, называть расширенной теорией.

Пусть $\bar{V}$ - *S -векторное пространство. Пусть $\bar{U}$ - *T -векторное пространство. Пусть

$$r : S \longrightarrow T \quad \bar{A} : \bar{V} \longrightarrow \bar{U}$$

$({}^*S, {}^*T)$ -линейное отображение векторных пространств. Пусть

$$\bar{\bar{f}} = (\bar{f}_i, i \in I)$$

*S -базис в векторном пространстве $\bar{V}$ и

$$\bar{\bar{e}} = (\bar{e}_j, j \in J)$$

*T -базис в векторном пространстве $\bar{U}$.

Из определений 4.4.1 и 3.2.2 следует

$$(4.4.14) \quad \bar{b} = \bar{A}(\bar{a}) = \bar{A}(\bar{f}_* {}^* a) = \bar{A}(\bar{f})_* {}^* r(a)$$

$\bar{A}(\bar{f}_i)$ также вектор векторного пространства $\bar{U}$ и имеет разложение

$$(4.4.15) \quad \bar{A}(\bar{f}_i) = \bar{e}_* {}^* A_i = \bar{e}_j {}^* A_i$$

относительно базиса $\bar{\bar{e}}$. Комбинируя (4.4.14) и (4.4.15), мы получаем

$$(4.4.16) \quad \bar{b} = \bar{e}_* {}^* A_* {}^* r(a)$$

Пусть $\bar{W}$ - *D -векторное пространство. Пусть

$$p : T \longrightarrow D \quad \bar{B} : \bar{U} \longrightarrow \bar{W}$$

$({}^*T, {}^*D)$ -линейное отображение векторных пространств. Пусть

$$\bar{\bar{g}} = (\bar{g}_l, l \in L)$$

*D -базис в векторном пространстве $\bar{W}$. Тогда, согласно (4.4.16), произведение $({}^*S, {}^*T)$ -линейного отображения $(r, \bar{A})$ и $({}^*T, {}^*D)$ -линейного отображения $(p, \bar{B})$ имеет вид

$$(4.4.17) \quad \bar{c} = \bar{h}_* {}^* B_* {}^* p(A)_* {}^* pr(a)$$

Сопоставление равенств (4.4.10) и (4.4.17) показывает насколько расширенная теория линейных отображений сложнее сокращённой теории.

При необходимости мы можем пользоваться расширенной теорией, но мы не получим новых результатов по сравнению со случаем сокращённой теории.

В то же время обилие деталей делает картину менее ясной и требует постоянного внимания. $\square$

4.5. Система *D -линейных уравнений

Определение 4.5.1. Пусть $\bar{V}$ - *D -векторное пространство и $\{\bar{A}_i \in \bar{V}, i \in I\}$ - множество векторов. *D -линейная оболочка в векторном пространстве - это множество $\text{span}(\bar{A}_i, i \in I)$ векторов, *D -линейно зависящих от векторов $\bar{A}_i$. $\square$

Теорема 4.5.2. Пусть $\text{span}(\bar{A}_i, i \in I)$ - *D -линейная оболочка в векторном пространстве $\bar{V}$. Тогда $\text{span}(\bar{A}_i, i \in I)$ - подпространство векторного пространства $\bar{V}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что

$$\bar{b} \in \text{span}(\bar{A}_i, i \in I)$$

$$\bar{c} \in \text{span}(\bar{A}_i, i \in I)$$

Согласно определению 4.5.1

$$\bar{b} = \bar{A}_* {}^* b$$

$$\bar{c} = \bar{A}_* {}^* c$$

Тогда

$$\bar{b} + \bar{c} = \bar{A}_* {}^* b + \bar{A}_* {}^* c = \bar{A}_* {}^* (b + c) \in \text{span}(\bar{A}_i, i \in I)$$

$$\bar{b}k = (\bar{A}_* {}^* b)k = \bar{A}_* {}^* (bk) \in \text{span}(\bar{A}_i, i \in I)$$

Это доказывает утверждение. $\square$

Пример 4.5.3. Пусть $\bar{V}$ - *D -векторное пространство и * -строка

$$\bar{\bar{A}} = \left(\bar{A}_1 \quad \dots \quad \bar{A}_n \right) = (\bar{A}_i, i \in I)$$

задаёт множество векторов. Чтобы ответить на вопрос, или вектор $\bar{b} \in \text{span}(\bar{A}_i, i \in I)$, мы запишем линейное уравнение

$$(4.5.1) \quad \bar{b} = \bar{A}_* {}^* x$$

где

$$x = \begin{pmatrix} {}^1x \\ \dots \\ {}^nx \end{pmatrix}$$

* -строка неизвестных коэффициентов разложения. $\bar{b} \in \text{span}(\bar{A}_i, i \in I)$, если уравнение (4.5.1) имеет решение. Предположим, что $\bar{\bar{f}} = (\bar{f}_j, j \in J)$ - *D -базис. Тогда векторы $\bar{b}, \bar{A}_i$ имеют разложение

$$(4.5.2) \quad \bar{b} = b_* {}^* \bar{f}$$

$$(4.5.3) \quad \bar{A}_i = \bar{f}_* {}^* A_i$$

Если мы подставим (4.5.2) и (4.5.3) в (4.5.1), мы получим

$$(4.5.4) \quad \bar{f}_* {}^* b = \bar{f}_* {}^* A_* {}^* x$$

Применяя теорему 4.3.3 к (4.5.4), мы получим **систему *D -линейных уравнений**

$$(4.5.5) \quad A_* {}^*x = b$$

Мы можем записать систему *D -линейных уравнений (4.5.5) в одной из следующих форм

$$(4.5.6) \quad \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_n \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^mA_1 & \dots & {}^mA_n \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} {}^1x \\ \dots \\ {}^nx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1b \\ \dots \\ {}^mb \end{pmatrix}$$

$${}^jA_i {}^ix = {}^jb$$

$$\begin{array}{ccccccc} {}^1A_1 & {}^1x & + \dots & + {}^1A_n & {}^nx & = & {}^1b \\ \dots & \dots & & \dots & \dots & & \dots \\ {}^1A_m & {}^1x & + \dots & + {}^mA_n & {}^nx & = & {}^mb \end{array}$$

□

Пример 4.5.4. Пусть $\overline{V}$ - $D_* {}^*$ -векторное пространство и * -строка

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} {}^1\overline{A} \\ \dots \\ {}^m\overline{A} \end{pmatrix} = ({}^j\overline{A}, j \in J)$$

задаёт множество векторов. Чтобы ответить на вопрос, или вектор $\overline{b} \in \text{span}({}^j\overline{A}, j \in J)$, мы запишем линейное уравнение

$$(4.5.7) \quad \overline{b} = x_* {}^* \overline{A}$$

где

$$x = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_m \end{pmatrix}$$

* -строка неизвестных коэффициентов разложения. $\overline{b} \in \text{span}({}^j\overline{A}, j \in J)$, если уравнение (4.5.7) имеет решение. Предположим, что $\overline{f} = ({}^i\overline{f}, i \in I)$ - $D_* {}^*$ -базис. Тогда векторы $\overline{b}, {}^j\overline{A}$ имеют разложение

$$(4.5.8) \quad \overline{b} = b_* {}^* \overline{f}$$

$$(4.5.9) \quad {}^j\overline{A} = {}^jA_* {}^* \overline{f}$$

Если мы подставим (4.5.8) и (4.5.9) в (4.5.7), мы получим

$$(4.5.10) \quad b_* {}^* \overline{f} = x_* {}^* A_* {}^* \overline{f}$$

Применяя теорему 4.3.3 к (4.5.10), мы получим **систему $D_* {}^*$ -линейных уравнений**^{4.5}

$$(4.5.11) \quad x_* {}^* A = b$$

^{4.5}Читая систему *D -линейных уравнений (4.5.5) снизу вверх и слева направо, мы получим систему $D_* {}^*$ -линейных уравнений (4.5.11).

Мы можем записать систему D_{**} -линейных уравнений (4.5.11) в одной из следующих форм

$$(4.5.12) \quad \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_m \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} {}^1A_1 & \dots & {}^1A_n \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^mA_1 & \dots & {}^mA_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & \dots & b_n \end{pmatrix}$$

$$x_j {}^jA_i = b_i$$

$$\begin{array}{ccc} x_1 {}^1A_1 & \dots & x_1 {}^1A_n \\ + & \dots & + \\ \dots & \dots & \dots \\ + & \dots & + \\ x_m {}^mA_1 & \dots & x_m {}^mA_n \\ = & \dots & = \\ b_1 & \dots & b_n \end{array}$$

□

Определение 4.5.5. Если $n \times n$ матрица A имеет $**$ -обратную матрицу, мы будем называть такую матрицу $**$ -**невырожденной матрицей**. В противном случае, мы будем называть такую матрицу $**$ -**вырожденной матрицей**. □

Определение 4.5.6. Предположим, что A - $**$ -невырожденная матрица. Мы будем называть соответствующую систему $**D$ -линейных уравнений

$$(4.5.13) \quad A_*^* x = b$$

невырожденной системой D -линейных уравнений.** □

Теорема 4.5.7. Решение невырожденной системы $**D$ -линейных уравнений (4.5.13) определено однозначно и может быть записано в любой из следующих форм^{4.6}

$$(4.5.14) \quad x = A^{-1*} {}^*b$$

$$(4.5.15) \quad x = \overline{H} \det(A, {}^*{}_*) {}^*b$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Умножая обе части равенства (4.5.13) слева на A^{-1*} , мы получим (4.5.14). Пользуясь определением (2.3.12), мы получим (4.5.15). Решение системы единственно в силу теоремы (2.2.16). □

4.6. Ранг матрицы

Определение 4.6.1. Мы будем называть матрицу^{4.7} SA_T минором порядка k . □

^{4.6}Мы можем найти решение системы (4.5.13) в теореме [7]-1.6.1. Я повторяю это утверждение, так как я слегка изменил обозначения.

^{4.7}Мы делаем следующие предположения в этом разделе

- $i \in M$, $|M| = m$, $j \in N$, $|N| = n$.
- $A = ({}^iA_j)$ - произвольная матрица.
- $k, s \in S \supseteq M$, $l, t \in T \supseteq N$, $k = |S| = |T|$.
- $p \in M \setminus S$, $r \in N \setminus T$.

Определение 4.6.2. Если минор ${}^S A_T$ - $*$ -невырожденная матрица, то мы будем говорить, что $*$ -ранг матрицы A не меньше, чем k . $*$ -**ранг матрицы** A

$$\text{rank}_* A$$

- это максимальное значение k . Мы будем называть соответствующий минор $*$ -**главным минором**. $\square$

Теорема 4.6.3. Пусть матрица A - $*$ -вырожденная матрица и минор ${}^S A_T$ - главный минор, тогда

$$(4.6.1) \quad {}^p \det \left({}^{S \cup \{p\}} A_{T \cup \{r\}}, * \right)_r = 0$$

Доказательство. Чтобы понять, почему минор ${}^{S \cup \{p\}} A_{T \cup \{r\}}$ не имеет $*$ -обратной матрицы,^{4.8} мы предположим, что он имеет $*$ -обратную матрицу и запишем соответствующую систему (2.3.2), (2.3.3), полагая $i = r$, $j = p$ и попробуем решить эту систему. Положив

$$(4.6.2) \quad B = {}^{S \cup \{p\}} A_{T \cup \{r\}}$$

мы получим систему

$$(4.6.3) \quad {}^S B_T {}^* T B^{-1*}{}_p + {}^S B_r {}^r B^{-1*}{}_p = 0$$

$$(4.6.4) \quad {}^p B_T {}^* T B^{-1*}{}_p + {}^p B_r {}^r B^{-1*}{}_p = 1$$

Мы умножим (4.6.3) на $({}^S B_T)^{-1*}$

$$(4.6.5) \quad {}^T B^{-1*}{}_p + ({}^S B_T)^{-1*} {}^* S B_r {}^r B^{-1*}{}_p = 0$$

Теперь мы можем подставить (4.6.5) в (4.6.4)

$$(4.6.6) \quad - {}^p B_T {}^* ({}^S B_T)^{-1*} {}^* S B_r {}^r B^{-1*}{}_p + {}^p B_r {}^r B^{-1*}{}_p = 1$$

Из (4.6.6) следует

$$(4.6.7) \quad ({}^p B_r - {}^p B_T {}^* ({}^S B_T)^{-1*} {}^* S B_r) {}^r B^{-1*}{}_p = 1$$

Выражение в скобках является квазидетерминантом ${}^p \det (B, *)_r$. Подставляя это выражение в (4.6.7), мы получим

$$(4.6.8) \quad {}^p \det (B, *)_r {}^r B^{-1*}{}_p = 1$$

Тем самым мы доказали, что квазидетерминант ${}^p \det (B, *)_r$ определён и условие его обращения в 0 необходимое и достаточное условие вырожденности матрицы B . Теорема доказана в силу соглашения (4.6.2). $\square$

Теорема 4.6.4. Предположим, что A - матрица,

$$\text{rank}_* A = k < m$$

^{4.8}Естественно ожидать связь между $*$ -вырожденностью матрицы и её $*$ -квазидетерминантом, подобную связи, известной в коммутативном случае. Однако $*$ -квазидетерминант определён не всегда. Например, если $*$ -обратная матрица имеет слишком много элементов, равных 0. Как следует из этой теоремы, не определён $*$ -квазидетерминант также в случае, когда $*$ -ранг матрицы меньше $n - 1$.

и ${}^S A_T$ - $*$ -главный минор. Тогда $*$ -строка ${}^P A$ является D_*^* -линейной комбинацией $*$ -строк ${}^S A$.

$$(4.6.9) \quad {}^{M \setminus S} A = R_*^* {}^S A$$

$$(4.6.10) \quad {}^P A = {}^P R_*^* {}^S A$$

$$(4.6.11) \quad {}^P A_b = {}^P R_s^s A_b$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если число $*$ -строк - k , то, полагая, что $*$ -строка ${}^P A$ - D_*^* -линейная комбинация (4.6.10) $*$ -строк ${}^S A$ с коэффициентами ${}^P R_s$, мы получим систему (4.6.11). Согласно теореме 4.5.7 эта система имеет единственное решение^{4.9} и оно нетривиально потому, что все $*$ -квазидетерминанты отличны от 0.

Остаётся доказать утверждение в случае, когда число $*$ -строк больше чем k . Пусть нам даны $*$ -строка ${}^P A$ и $*$ -строка A_r . Согласно предположению минор ${}^{S \cup \{p\}} A_{T \cup \{r\}}$ - $*$ -вырожденная матрица и его $*$ -квазидетерминант

$$(4.6.12) \quad {}^P \det \left({}^{S \cup \{p\}} A_{T \cup \{r\}}, * \right)_r = 0$$

Согласно (2.3.14) равенство (4.6.12) имеет вид

$${}^P A_r - {}^P A_T^* ({}^S A_T)^{-1*} {}^S A_r = 0$$

Матрица

$$(4.6.13) \quad {}^P R = {}^P A_T^* ({}^S A_T)^{-1*}$$

не зависят от r . Следовательно, для любых $r \in N \setminus T$

$$(4.6.14) \quad {}^P A_r = {}^P R_*^* {}^S A_r$$

Из равенства

$$(({}^S A_T)^{-1*})_*^S A_l = {}^T \delta_l$$

следует, что

$$(4.6.15) \quad {}^P A_l = {}^P A_T^* {}^T \delta_l = {}^P A_T^* ({}^S A_T)^{-1*} {}^S A_l$$

Подставляя (4.6.13) в (4.6.15), мы получим

$$(4.6.16) \quad {}^P A_l = {}^P R_*^* {}^S A_l$$

(4.6.14) и (4.6.16) завершают доказательство. $\square$

Следствие 4.6.5. Предположим, что A - матрица, $\text{rank}_* A = k < m$. Тогда $*$ -строки матрицы D_*^* -линейно зависимы.

$$(4.6.17) \quad \lambda_*^* A = 0$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что $*$ -строка ${}^P A$ - D_*^* -линейная комбинация (4.6.10). Мы положим $\lambda_p = -1$, $\lambda_s = {}^P R_s$ и остальные $\lambda_c = 0$. $\square$

Теорема 4.6.6. Пусть $({}^i \bar{A}, i \in M, |M| = m)$ семейство D_*^* -линейно независимых векторов. Тогда $*$ -ранг их координатной матрицы равен m .

^{4.9}Мы положим, что неизвестные переменные здесь - это $x_s = {}^P R_s$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно конструкции, изложенной в примере 4.3.7, координатная матрица семейства векторов $({}^i\bar{A})$ относительно базиса $\bar{e}$ состоит из $*$ -строк, являющихся координатными матрицами векторов ${}^i\bar{A}$ относительно базиса $\bar{e}$. Поэтому $*$ -ранг этой матрицы не может превышать m .

Допустим $*$ -ранг координатной матрицы меньше m . Согласно следствию 4.6.5 $*$ -строки матрицы D_* -линейно зависимы. Если мы умножим обе части равенства (4.6.17) на $*$ -строку $\bar{e}$ и положим $c = \lambda_* A$, то мы получим, что D_* -линейная комбинация

$$c_* \bar{e} = 0$$

векторов базиса равна 0. Это противоречит утверждению, что векторы $\bar{e}$ образуют базис. Утверждение теоремы доказано. $\square$

Теорема 4.6.7. *Предположим, что A - матрица,*

$$\text{rank}_* A = k < n$$

и ${}^S A_T$ - $$ -главный минор. Тогда $*$ -строка A_r является $*$ - D -линейной комбинацией $*$ -строк A_t*

$$(4.6.18) \quad A_{N \setminus T} = A_T {}^* R$$

$$(4.6.19) \quad A_r = A_T {}^* R_r$$

$$(4.6.20) \quad {}^a A_r = {}^a A_t {}^t R_r$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если число $*$ -строк - k , то, полагая, что $*$ -строка A_r - $*$ - D -линейная комбинация (4.6.19) $*$ -строк A_t с коэффициентами ${}^t R_r$, мы получим систему (4.6.20). Согласно теореме 4.5.7 эта система имеет единственное решение^{4.10} и оно нетривиально потому, что все $*$ -квазидетерминанты отличны от 0.

Остаётся доказать утверждение в случае, когда число $*$ -строк больше, чем k . Пусть нам даны $*$ -строка A_r и $*$ -строка ${}^p A$. Согласно предположению минор ${}^{S \cup \{p\}} A_{T \cup \{r\}}$ - $*$ -вырожденная матрица и его $*$ -квазидетерминант

$$(4.6.21) \quad {}^p \det \left({}^{S \cup \{p\}} A_{T \cup \{r\}}, {}^* \right)_r = 0$$

Согласно (2.3.14) (4.6.21) имеет вид

$${}^p A_r - {}^p A_T {}^* (({}^S A_T)^{-1} {}^*) {}^* {}^S A_r = 0$$

Матрица

$$(4.6.22) \quad R_r = (({}^S A_T)^{-1} {}^*) {}^* {}^S A_r$$

не зависит от p , Следовательно, для любых $p \in M \setminus S$

$$(4.6.23) \quad {}^p A_r = {}^p A_T {}^* R_r$$

Из равенства

$${}^k A_T {}^* (({}^S A_T)^{-1} {}^*) {}^s = {}^k \delta_s$$

следует, что

$$(4.6.24) \quad {}^k A_r = {}^k \delta_s {}^* {}^S A_r = {}^k A_T {}^* (({}^S A_T)^{-1} {}^*) {}^s {}^* {}^S A_r$$

Подставляя (4.6.22) в (4.6.24), мы получим

$$(4.6.25) \quad {}^k A_r = {}^k A_T {}^* R_r$$

^{4.10}Мы положим, что неизвестные переменные здесь - это ${}^t x = {}^t R_r$.

(4.6.23) и (4.6.25) завершают доказательство. $\square$

Следствие 4.6.8. *Предположим, что A - матрица, $\text{rank}_* A = k < m$. Тогда $*$ -строки матрицы $*$ D -линейно зависимы.*

$$A_*^* \lambda = 0$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что $*$ -строка A_r - правая линейная комбинация (4.6.19). Мы положим ${}^r \lambda = -1$, ${}^t \lambda = {}^t R_r$ и остальные ${}^c \lambda = 0$. $\square$

Опираясь на теорему 2.3.9, мы можем записать подобные утверждения для $*$ -ранга матрицы.

Теорема 4.6.9. *Предположим, что A - матрица,*

$$\text{rank}_* A = k < m$$

и ${}_T A^S$ - $$ -главный минор. Тогда $*$ -строка A^P является $*$ D -линейной композицией $*$ -строк A^S*

$$(4.6.26) \quad A^{M \setminus S} = A^{S*} {}_R$$

$$(4.6.27) \quad A^P = A^{S*} {}_R^P$$

$$(4.6.28) \quad {}_b A^P = {}_b A^S {}_s R^P$$

Следствие 4.6.10. *Предположим, что A - матрица, $\text{rank}_* A = k < m$. Тогда $*$ -строки матрицы $*$ D -линейно зависимы.*

$$A_*^* \lambda = 0$$

Теорема 4.6.11. *Предположим, что A - матрица,*

$$\text{rank}_* A = k < n$$

и ${}_T A^S$ - $$ -главный минор. Тогда $*$ -строка ${}_r A$ является D^*_{*} -линейной композицией $*$ -строк ${}_t A$*

$$(4.6.29) \quad {}_{N \setminus T} A = R^* {}_T A$$

$$(4.6.30) \quad {}_r A = {}_r R^* {}_T A$$

$$(4.6.31) \quad {}_r A^a = {}_r R^t {}_t A^a$$

Следствие 4.6.12. *Предположим, что A - матрица, $\text{rank}_* a = k < m$. Тогда $*$ -строки матрицы D^*_{*} -линейно зависимы.*

$$\lambda^* {}_A = 0$$

4.7. Система $*$ D -линейных уравнений

Определение 4.7.1. Предположим, что ^{4.7} A - матрица системы D^*_{*} -линейных уравнений (4.5.12). Мы будем называть матрицу

$$(4.7.1) \quad \begin{pmatrix} {}^j A_i \\ b_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1 A_1 & \dots & {}^1 A_n \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^m A_1 & \dots & {}^m A_n \\ b_1 & \dots & b_n \end{pmatrix}$$

расширенной матрицей этой системы. $\square$

Определение 4.7.2. Предположим, что ^{4.7} A - матрица системы *D -линейных уравнений (4.5.6). Мы будем называть матрицу

$$(4.7.2) \quad \begin{pmatrix} {}^j A_i & {}^j b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1 A_1 & \dots & {}^1 A_n & {}^1 b \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ {}^m A_1 & \dots & {}^m A_n & {}^m b \end{pmatrix}$$

расширенной матрицей этой системы. $\square$

Теорема 4.7.3. Система *D -линейных уравнений (4.5.6) имеет решение тогда и только тогда, когда

$$(4.7.3) \quad \text{rank}_*({}^j A_i) = \text{rank}_* \begin{pmatrix} {}^j A_i & {}^j b \end{pmatrix}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть ${}^S A_T$ - * -главный минор матрицы A .

Пусть система *D -линейных уравнений (4.5.6) имеет решение ${}^i x = {}^i d$. Тогда

$$(4.7.4) \quad A_* {}^* d = b$$

Уравнение (4.7.4) может быть записано в форме

$$(4.7.5) \quad A_T {}^* {}^T d + A_{N \setminus T} {}^* {}^{N \setminus T} d = b$$

Подставляя (4.6.18) в (4.7.5), мы получим

$$(4.7.6) \quad A_T {}^* {}^T d + A_T {}^* R_* {}^* {}^{N \setminus T} d = b$$

Из (4.7.6) следует, что * -строка b является *D -линейной комбинацией * -строк A_T

$$A_T {}^* ({}^T d + R_* {}^* {}^{N \setminus T} d) = b$$

Это эквивалентно уравнению (4.7.3).

Нам осталось доказать, что существование решения *D -системы линейных уравнений (4.5.6) следует из (4.7.3). Истинность (4.7.3) означает, что ${}^S A_T$ - так же * -главный минор расширенной матрицы. Из теоремы 4.6.7 следует, что * -строка b является *D -линейной композицией * -строк A_T

$$b = A_T {}^* {}^T R$$

Полагая ${}^T R = 0$, мы получим

$$b = A_* {}^* R$$

Следовательно, мы нашли, по крайней мере, одно решение системы *D -линейных уравнений (4.5.6). $\square$

Теорема 4.7.4. Предположим, что (4.5.6) - система *D -линейных уравнений, удовлетворяющих (4.7.3). Если $\text{rank}_* A = k \leq t$, то решение системы зависит от произвольных значений $t - k$ переменных, не включённых в * -главный минор.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть ${}^S A_T$ - * -главный минор матрицы a . Предположим, что

$$(4.7.7) \quad {}^P A_* {}^* x = {}^P b$$

уравнение с номером p . Применяя теорему 4.6.4 к расширенной матрице (4.7.1), мы получим

$$(4.7.8) \quad {}^p A = {}^p R_* {}^* S A$$

$$(4.7.9) \quad {}^p b = {}^p R_* {}^* S b$$

Подставляя (4.7.8) и (4.7.9) в (4.7.7), мы получим

$$(4.7.10) \quad {}^p R_* {}^* S A_* {}^* x = {}^p R_* {}^* S b$$

(4.7.10) означает, что мы можем исключить уравнение (4.7.7) из системы (4.5.6) и новая система эквивалентна старой. Следовательно, число уравнений может быть уменьшено до k .

В этом случае у нас есть два варианта. Если число переменных также равно k , то согласно теореме 4.5.7 система имеет единственное решение (4.5.15). Если число переменных $m > k$, то мы можем передвинуть $m - k$ переменных, которые не включены в $*$ -главный минор в правой части. Присваивая произвольные значения этим переменным, мы определяем значение правой части и для этого значения мы получим единственное решение согласно теореме 4.5.7. $\square$

Следствие 4.7.5. Система $*$ - D -линейных уравнений (4.5.6) имеет единственное решение тогда и только тогда, когда её матрица невырожденная. $\square$

Теорема 4.7.6. Решения однородной системы $*$ - D -линейных уравнений

$$(4.7.11) \quad A_* {}^* x = 0$$

порождают $*$ - D -векторное пространство.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\overline{X}$ - множество решений системы $*$ - D -линейных уравнений (4.7.11). Предположим, что $x = ({}^a x) \in \overline{X}$ и $y = ({}^a y) \in \overline{X}$. Тогда

$$x^a {}_a a^b = 0$$

$$y^a {}_a a^b = 0$$

Следовательно,

$${}^i A_j ({}^j x + {}^j y) = {}^i A_j {}^j x + {}^i A_j {}^j y = 0$$

$$x + y = ({}^j x + {}^j y) \in \overline{X}$$

Таким же образом мы видим

$${}^i A_j ({}^j x b) = ({}^i A_j {}^j x) b = 0$$

$$x b = ({}^j x b) \in \overline{X}$$

Согласно определению 4.1.4 $\overline{X}$ является $*$ - D -векторным пространством. $\square$

4.8. Невырожденная матрица

Предположим, что нам дана $n \times n$ матрица A . Следствия 4.6.5 и 4.6.8 говорят нам, что если $\text{rank}_* A < n$, то $*$ -строки D_* -линейно зависимы и $*$ -строки $*$ - D -линейно зависимы.^{4.11}

Теорема 4.8.1. Пусть A - $n \times n$ матрица и $*$ -строка A_r - $*$ - D -линейная комбинация других $*$ -строк. Тогда $\text{rank}_* A < n$.

^{4.11}Это утверждение похоже на утверждение [8]-1.2.5.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение, что $*$ -строка A_r является $*$ - D -линейной комбинацией других $*$ -строк, означает, что система $*$ - D -линейных уравнений

$$A_r = A_{[r]} * \lambda$$

имеет, по крайней мере, одно решение. Согласно теореме 4.7.3

$$\text{rank}_* A = \text{rank}_* A_{[r]}$$

Так как число $*$ -строк меньше, чем n , то $\text{rank}_* A_{[r]} < n$. $\square$

Теорема 4.8.2. Пусть A - $n \times n$ матрица и $*$ -строка ${}^p A$ - D_*^* -линейная комбинация других $*$ -строк. Тогда $\text{rank}_* A < n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство утверждения похоже на доказательство теоремы 4.8.1 $\square$

Теорема 4.8.3. Предположим, что A и B - $n \times n$ матрицы и

$$(4.8.1) \quad C = A_*^* B$$

C - $*$ -вырожденная матрица тогда и только тогда, когда либо матрица A , либо матрица B - $*$ -вырожденная матрица.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что матрица B - $*$ -вырожденная. Согласно теореме 4.6.7 $*$ -строки матрицы B_*^* D -линейно зависимы. Следовательно,

$$(4.8.2) \quad 0 = B_*^* \lambda$$

где $\lambda \neq 0$. Из (4.8.1) и (4.8.2) следует, что

$$C_*^* \lambda = A_*^* B_*^* \lambda = 0$$

Согласно теореме 4.8.1 матрица C является $*$ -вырожденной.

Предположим, что матрица B - не $*$ -вырожденная, но матрица A - $*$ -вырожденная. Согласно теореме 4.6.4 $*$ -строки матрицы A_*^* D -линейно зависимы. Следовательно,

$$(4.8.3) \quad 0 = A_*^* \mu$$

где $\mu \neq 0$. Согласно теореме 4.5.7 система

$$B_*^* \lambda = \mu$$

имеет единственное решение, где $\lambda \neq 0$. Следовательно,

$$C_*^* \lambda = A_*^* B_*^* \lambda = A_*^* \mu = 0$$

Согласно теореме 4.8.1 матрица C является $*$ -вырожденной.

Предположим, что матрица C - $*$ -вырожденная матрица. Согласно теореме 4.6.4 $*$ -строки матрицы C_*^* D -линейно зависимы. Следовательно,

$$(4.8.4) \quad 0 = C_*^* \lambda$$

где $\lambda \neq 0$. Из (4.8.1) и (4.8.4) следует, что

$$0 = A_*^* B_*^* \lambda$$

Если

$$0 = B_*^* \lambda$$

выполнено, то матрица B - $*$ -вырожденная. Предположим, что матрица B не $*$ -вырожденная. Положим

$$\mu = B_*^* \lambda$$

где $\mu \neq 0$. Тогда

$$(4.8.5) \quad 0 = A_*^* \mu$$

Из (4.8.5) следует, что матрица A - $*$ -вырожденная. $\square$

Опираясь на теорему 2.3.9, мы можем записать подобные утверждения для D^* -линейной комбинации $*$ -строк или $*$ - D -линейной комбинации $*$ -строк и $*$ -квазидетерминанта.

Теорема 4.8.4. Пусть A - $n \times n$ матрица и $*$ -строка ${}_r A$ - $*$ - D -линейная комбинация других $*$ -строк. Тогда $\text{rank}_* A < n$.

Теорема 4.8.5. Пусть A - $n \times n$ матрица и $*$ -строка A^p - D^* -линейная комбинация других $*$ -строк. Тогда $\text{rank}_* A < n$.

Теорема 4.8.6. Предположим, что A и B - $n \times n$ матрицы и $C = A_*^* B$. C - $*$ -вырожденная матрица тогда и только тогда, когда либо матрица A , либо матрица B - $*$ -вырожденная матрица.

Определение 4.8.7. $*$ -матричная группа $GL_n^{*,D}$ - это группа $*$ -невырожденных матриц, где мы определяем $*$ -произведение матриц (2.2.1) и $*$ -обратную матрицу A^{-1*} . $\square$

Определение 4.8.8. $*$ -матричная группа $GL_n^{*,D}$ - это группа $*$ -невырожденных матриц где мы определяем $*$ -произведение матриц (2.2.2) и $*$ -обратную матрицу A^{-1*} . $\square$

Теорема 4.8.9.

$$GL_n^{*,D} \neq GL_n^{*D}$$

Замечание 4.8.10. Из теоремы (2.3.11) следует, что существуют матрицы, которые $*$ -невырожденны и $*$ -невырожденны. Теорема 4.8.9 означает, что множества $*$ -невырожденных матриц и $*$ -невырожденных матриц не совпадают. Например, существует такая $*$ -невырожденная матрица, которая $*$ -вырожденная матрица. $\square$

Доказательство. Это утверждение достаточно доказать для $n = 2$. Предположим, что каждая $*$ -вырожденная матрица

$$(4.8.6) \quad A = \begin{pmatrix} {}^1A_1 & {}^2A_1 \\ {}^1A_2 & {}^2A_2 \end{pmatrix}$$

является $*$ -вырожденной матрицей. Из теоремы 4.6.7 и теоремы 4.6.7 следует, что $*$ -вырожденная матрица удовлетворяет условию

$$(4.8.7) \quad {}^1A_2 = b {}^1A_1$$

$$(4.8.8) \quad {}^2A_2 = b {}^2A_1$$

$$(4.8.9) \quad {}^2A_1 = {}^1A_1 c$$

$$(4.8.10) \quad {}^2A_2 = {}^1A_2 c$$

Если мы подставим (4.8.9) в (4.8.8), мы получим

$${}^2A_2 = b {}^1A_1 c$$

b и c - произвольные элементы тела D и ${}_*\text{-}$ вырожденная матрица (4.8.6) имеет вид ($d = {}^1A_1$)

$$(4.8.11) \quad A = \begin{pmatrix} d & dc \\ bd & bdc \end{pmatrix}$$

Подобным образом мы можем показать, что ${}^*\text{-}$ вырожденная матрица имеет вид

$$(4.8.12) \quad A = \begin{pmatrix} d & c'd \\ db' & c'db' \end{pmatrix}$$

Из предположения следует, что (4.8.12) и (4.8.11) представляют одну и ту же матрицу. Сравнивая (4.8.12) и (4.8.11), мы получим, что для любых $d, c \in D$ существует такое $c' \in D$, которое не зависит от d и удовлетворяет уравнению

$$dc = c'd$$

Это противоречит утверждению, что D - тело. $\square$

Пример 4.8.11. В случае тела кватернионов мы положим $b = 1 + k$, $c = j$, $d = k$. Тогда мы имеем

$$A = \begin{pmatrix} k & kj \\ (1+k)k & (1+k)kj \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & -i \\ k-1 & -i-j \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} {}^2\det(A, {}_*)_2 &= {}^2A_2 - {}^2A_1({}^1A_1)^{-1} {}^1A_2 \\ &= -i - j - (k-1)(k)^{-1}(-i) = -i - j - (k-1)(-k)(-i) \\ &= -i - j - kki + ki = -i - j + i + j \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}_1\det(A, {}_*)^1 &= {}_1A^1 - {}_1A^2({}_2A^2)^{-1} {}_2A^1 \\ &= k - (k-1)(-i-j)^{-1}(-i) = k - (k-1)\frac{1}{2}(i+j)(-i) \\ &= k + \frac{1}{2}((k-1)i + (k-1)j)i = k + \frac{1}{2}(ki - i + kj - j)i \\ &= k + \frac{1}{2}(j - i - i - j)i = k - ii \\ &= k + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}_1\det(A, {}_*)^2 &= {}_1A^2 - {}_1A^1({}_2A^1)^{-1} {}_2A^2 \\ &= k - 1 - k(-i)^{-1}(-i-j) = k - 1 + ki(i+j) \\ &= k - 1 + j(i+j) = k - 1 + ji + jj \\ &= k - 1 - k - 1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
{}_2 \det (A, {}^* {}^*)^1 &= {}_2 A^1 - {}_2 A^2 ({}_1 A^2)^{-1} {}_1 A^1 \\
&= (-i) - (-i - j)(k - 1)^{-1} k = -i + (i + j) \frac{1}{2} (-k - 1) k \\
&= -i - \frac{1}{2} (i + j)(k + 1) k = -i - \frac{1}{2} (ik + i + jk + j) k \\
&= -i - \frac{1}{2} (-j + i + i + j) k = -i - ik \\
&= -i + j \\
{}_2 \det (A, {}^* {}^*)^2 &= {}_2 A^2 - {}_2 A^1 ({}_1 A^1)^{-1} {}_1 A^2 \\
&= -i - j - (-i)(k)^{-1} (k - 1) = -i - j + i(-k)(k - 1) \\
&= -i - j + j(k - 1) = -i - j + jk - j = -i - j + i - j \\
&= -2j
\end{aligned}$$

Система ${}^* {}^* D$ -линейных уравнений

$$(4.8.13) \quad \begin{pmatrix} k & -i \\ k - 1 & -i - j \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} {}^1 x \\ {}^2 x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1 b \\ {}^2 b \end{pmatrix}$$

имеет ${}^* {}^*$ -вырожденную матрицу. Мы можем записать систему ${}^* {}^* D$ -линейных уравнений (4.8.13) в виде

$$\begin{cases} k {}^1 x - i {}^2 x = {}^1 b \\ (k - 1) {}^1 x - (i + j) {}^2 x = {}^2 b \end{cases}$$

Система ${}^* {}^* D$ -линейных уравнений

$$(4.8.14) \quad \begin{pmatrix} k & -i \\ k - 1 & -i - j \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} {}^1 x & {}^2 x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1 b & {}^2 b \end{pmatrix}$$

имеет ${}^* {}^*$ -невырожденную матрицу. Мы можем записать систему ${}^* {}^* D$ -линейных уравнений (4.8.14) в виде

$$\begin{cases} k {}^1 x - i {}^1 x \\ + (k - 1) {}^2 x - (i + j) {}^2 x \\ = {}^1 b = {}^2 b \end{cases} \quad \begin{cases} k {}^1 x + (k - 1) {}^2 x = {}^1 b \\ -i {}^1 x - (i + j) {}^2 x = {}^2 b \end{cases}$$

Система $D {}^* {}^*$ -линейных уравнений

$$(4.8.15) \quad \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} k & -i \\ k - 1 & -i - j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \end{pmatrix}$$

имеет ${}^* {}^*$ -вырожденную матрицу. Мы можем записать систему $D {}^* {}^*$ -линейных уравнений (4.8.15) в виде

$$\begin{cases} x_1 k & -x_1 i \\ + x_2 (k - 1) & -x_2 (i + j) \\ = b_1 & = b_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 k + x_2 (k - 1) = b_1 \\ -x_1 i - x_2 (i + j) = b_2 \end{cases}$$

Система $D {}^* {}^*$ -линейных уравнений

$$(4.8.16) \quad \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} k & -i \\ k - 1 & -i - j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1 b \\ {}^2 b \end{pmatrix}$$

имеет * -невырожденную матрицу. Мы можем записать систему D^* -линейных уравнений (4.8.16) в виде

$$\begin{cases} k^1x - i^2x = {}^1b \\ (k-1)^1x - (i+j)^2x = {}^2b \end{cases}$$

□

4.9. Размерность *D -векторного пространства

Теорема 4.9.1. Пусть $\bar{V}$ - *D -векторное пространство. Предположим, что $\bar{V}$ имеет *D -базисы $\bar{e} = (\bar{e}_i, i \in I)$ и $\bar{g} = (\bar{g}_j, j \in J)$. Если $|I|$ и $|J|$ - конечные числа, то $|I| = |J|$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что $|I| = m$ и $|J| = n$. Предположим, что

$$(4.9.1) \quad m < n$$

Так как $\bar{e}$ - *D -базис, любой вектор $\bar{g}_j, j \in J$ имеет разложение

$$\bar{g}_j = \bar{e}_* {}^*A_j$$

Так как $\bar{g}$ - *D -базис

$$(4.9.2) \quad \lambda = 0$$

следует из

$$\bar{g}_* {}^*\lambda = \bar{e}_* {}^*A_* {}^*\lambda = 0$$

Так как $\bar{e}$ - *D -базис, мы получим

$$(4.9.3) \quad A_* {}^*\lambda = 0$$

Согласно (4.9.1) $\text{rank}_* A \leq m$ и система (4.9.3) имеет больше переменных, чем уравнений. Согласно теореме 4.7.4 $\lambda \neq 0$. Это противоречит утверждению (4.9.2). Следовательно, утверждение $m < n$ неверно.

Таким же образом мы можем доказать, что утверждение $n < m$ неверно. Это завершает доказательство теоремы. □

Определение 4.9.2. Мы будем называть **размерностью *D -векторного пространства** число векторов в базисе □

Теорема 4.9.3. Координатная матрица *D -базиса $\bar{g}$ относительно *D -базиса $\bar{e}$ векторного пространства $\bar{V}$ является * -невырожденной матрицей.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно лемме 4.6.6 *D -ранг координатной матрицы базиса $\bar{g}$ относительно базиса $\bar{e}$ равен размерности векторного пространства, откуда следует утверждение теоремы. □

Определение 4.9.4. Мы будем называть взаимно однозначное отображение $\bar{A} : \bar{V} \rightarrow \bar{W}$ ***D -изоморфизмом векторных пространств**, если это отображение - *D -линейное отображение векторных пространств. □

Определение 4.9.5. *D -автоморфизм векторного пространства $\bar{V}$ - это *D -изоморфизм $\bar{A} : \bar{V} \rightarrow \bar{V}$. □

Теорема 4.9.6. *Предположим, что $\bar{f}$ - *D -базис в векторном пространстве $\bar{V}$. Тогда любой *D -автоморфизм $\bar{A}$ векторного пространства $\bar{V}$ имеет вид*

$$(4.9.4) \quad v' = A_* {}^*v$$

где A - ${}^*{}^*$ -невырожденная матрица.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (4.9.4) следует из теоремы 4.4.3. Так как $\bar{A}$ - изоморфизм, то для каждого вектора $\bar{v}'$ существует единственный вектор $\bar{v}$ такой, что $\bar{v}' = \bar{v}_* {}^*\bar{A}$. Следовательно, система *D -линейных уравнений (4.9.4) имеет единственное решение. Согласно следствию 4.7.5 матрица A невырождена. $\square$

Теорема 4.9.7. *Автоморфизмы *D -векторного пространства порождают группу $GL_n {}^*D$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если даны два автоморфизма $\bar{A}$ и $\bar{B}$, то мы можем записать

$$\begin{aligned} v' &= A_* {}^*v \\ v'' &= B_* {}^*v' = B_* {}^*A_* {}^*v \end{aligned}$$

Следовательно, результирующий автоморфизм имеет матрицу $A_* {}^*B$. $\square$

Многообразие *D -базисов

5.1. *D -линейное представление группы

Пусть $\bar{V}$ - *D -векторное пространство над телом D . Мы доказали в теореме 4.9.6, что любой *D -автоморфизм векторного пространства $\bar{V}$ можно отождествить с некоторой матрицей. Мы доказали в теореме 4.9.7, что *D -автоморфизмы векторного пространства порождают группу. Поэтому, когда мы изучаем представления в *D -векторном пространстве, нас интересуют *D -линейные отображения векторного пространства.

Определение 5.1.1. Пусть $\bar{V}$ - *D -векторное пространство над телом D .^{5.1} Мы будем называть представление f группы G в *D -векторном пространстве $\bar{V}$ *D -линейным T^* -представлением или D^* -представлением, если $f(a)$ - *D -автоморфизм векторного пространства $\bar{V}$ для любого $a \in G$. $\square$

Теорема 5.1.2. *D -автоморфизмы векторного пространства порождают *D -линейное ковариантное эффективное T^* -представление группы GL_n^{*D} .

Доказательство. Если даны два автоморфизма $\bar{A}$ и $\bar{B}$, то мы можем записать

$$\begin{aligned} v' &= A_*^* v \\ v'' &= B_*^* v' = B_*^* A_*^* v \end{aligned}$$

Следовательно, результирующий автоморфизм имеет матрицу $B_*^* A$.

Нам осталось показать, что ядро неэффективности состоит только из единичного элемента. Тожественное преобразование удовлетворяет равенству

$${}^i v = {}^i A_j {}^j v$$

Выбирая значения координат в форме ${}^i v = {}^i \delta_k$, где k задано, мы получим

$$(5.1.1) \quad {}^i \delta_k = {}^i A_j {}^j \delta_k$$

Из (5.1.1) следует

$${}^i \delta_k = {}^i A_k$$

Поскольку k произвольно, мы приходим к заключению $A = \delta$. $\square$

Теорема 5.1.3. Пусть A_1 - матрица *D -линейного отображения (4.4.1) относительно базисов $\bar{f}$ и $\bar{e}$ и A_2 - матрица того же *D -линейного отображения относительно базисов $\bar{g}$ и $\bar{h}$. Если базис $\bar{f}$ имеет координатную матрицу B относительно базиса $\bar{g}$ *D -векторного пространства $\bar{V}$

$$\bar{f} = \bar{g}_*^* B$$

^{5.1}Изучая представление группы в *D -векторном пространстве, мы будем следовать соглашению, описанному в замечании 2.2.15.

и $\bar{e}$ имеет координатную матрицу C относительно базиса $\bar{h}$ *D -векторного пространства $\bar{W}$

$$(5.1.2) \quad \bar{e} = \bar{h}_* {}^* C$$

то матрицы A_1 и A_2 связаны соотношением

$$(5.1.3) \quad A_1 = C^{-1} {}^* {}^* A_2 {}^* B$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вектор $\bar{a} \in \bar{V}$ имеет разложение

$$\bar{a} = \bar{f}_* {}^* a = \bar{g}_* {}^* B {}^* a$$

относительно базисов $\bar{f}$ и $\bar{g}$. Так как A - *D -линейное отображение, то мы можем записать его в форме

$$(5.1.4) \quad \bar{b} = \bar{e}_* {}^* A_1 {}^* a$$

относительно базисов $\bar{f}$ и $\bar{e}$ и

$$(5.1.5) \quad \bar{b} = \bar{h}_* {}^* B {}^* A_2 {}^* a$$

относительно базисов $\bar{g}$ и $\bar{h}$. В силу теоремы 4.9.3 матрица C имеет * -обратную и из равенства (5.1.2) следует

$$(5.1.6) \quad \bar{h} = \bar{e}_* {}^* C^{-1} {}^*$$

Подставив (5.1.6) в равенство (5.1.5), получим

$$(5.1.7) \quad \bar{b} = \bar{e}_* {}^* C^{-1} {}^* {}^* A_2 {}^* B {}^* a$$

В силу теоремы 4.3.3 сравнение равенств (5.1.4) и (5.1.7) даёт

$$(5.1.8) \quad A_1 {}^* a = C^{-1} {}^* {}^* A_2 {}^* B {}^* a$$

Так как вектор a - произвольный вектор, из теоремы 5.1.2 и равенства (5.1.8) следует утверждение теоремы. $\square$

Теорема 5.1.4. Пусть $\bar{A}$ - автоморфизм *D -векторного пространства. Пусть A_1 - матрица этого автоморфизма, заданная относительно базиса $\bar{f}$, и A_2 - матрица того же автоморфизма, заданная относительно базиса $\bar{g}$. Если базис $\bar{f}$ имеет координатную матрицу B относительно базиса $\bar{g}$

$$\bar{f} = \bar{g}_* {}^* B$$

то матрицы A_1 и A_2 связаны соотношением

$$A_1 = B^{-1} {}^* {}^* A_2 {}^* B$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение следует из теоремы 5.1.3, так как в данном случае $C = B$. $\square$

5.2. Многообразие *D -базисов векторного пространства

Теорема 5.2.1. *D -автоморфизм $\overline{A}$, действуя на каждый вектор *D -базиса в векторном пространстве, отображает *D -базис в другой *D -базис.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\overline{e}$ - *D -базис в векторном пространстве $\overline{V}$. Согласно теореме 4.9.6, вектор $\overline{e}_a$ отображается в вектор $\overline{e}'_a$

$$(5.2.1) \quad \overline{e}'_a = A_* {}^* \overline{e}_a$$

Если векторы $\overline{e}'_a$ *D -линейно зависимы, то в *D -линейной комбинации

$$(5.2.2) \quad \overline{e}'_* {}^* \lambda = 0$$

$\lambda \neq 0$. Из равенств (5.2.1) и (5.2.2) следует, что

$$A^{-1} {}^* {}^* \overline{e}'_* {}^* \lambda = \overline{e}_* {}^* \lambda = 0$$

и $\lambda \neq 0$. Это противоречит утверждению, что векторы $\overline{e}_a$ *D -линейно независимы. Следовательно, векторы $\overline{e}'_a$ *D -линейно независимы и порождают базис. $\square$

Таким образом, мы можем распространить *D -линейное ковариантное T -представление группы $GL_n {}^*D$ на множество *D -базисов. Мы будем называть преобразование этого T -представления **активным преобразованием** потому, что *D -линейное отображение векторного пространства породило это преобразование ([6]). Активное преобразование не является *D -линейным преобразованием, так как на множестве *D -базисов не определена *D -линейная операция. Соответственно определению мы будем записывать действие активного преобразования $A \in GL_n {}^*D$ на *D -базис $\overline{e}$ в форме $A_* {}^* \overline{e}$. Мы будем называть гомоморфизм группы G в группу $GL_n {}^*D$ активных преобразований **активным T -представлением**.

Теорема 5.2.2. Активное T -представление группы $GL_n {}^*D$ на множестве *D -базисов одностранзитивно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Чтобы доказать теорему, достаточно показать, что для любых двух *D -базисов определено по крайней мере одно преобразование T -представления и это преобразование единственно. *D -гомоморфизм $\overline{A}$, действуя на *D -базис $\overline{e}$ имеет вид

$$g_i = A_* {}^* e_i$$

где g_i - координатная матрица вектора $\overline{g}_i$ и e_i - координатная матрица вектора $\overline{e}_i$ относительно *D -базиса $\overline{h}$. Следовательно, координатная матрица образа *D -базиса равна произведению координатной матрицы исходного *D -базиса и матрицы *D -автоморфизма

$$g = A_* {}^* e$$

В силу теоремы 4.9.3, матрицы g и e невырождены. Следовательно, матрица

$$A = g_* {}^* e^{-1} {}^*$$

является матрицей *D -автоморфизма, отображающего *D -базис $\overline{e}$ в *D -базис $\overline{g}$.

Допустим элементы g_1, g_2 группы G и *D -базис $\overline{e}$ таковы, что

$$(5.2.3) \quad g_{1*} {}^* \overline{e} = g_{2*} {}^* \overline{e}$$

В силу теорем 4.9.3 и 2.2.16 справедливо равенство $g_1 = g_2$. Отсюда следует утверждение теоремы. $\square$

Если на векторном пространстве $\overline{V}$ определена дополнительная структура, не всякое $\ast D$ -линейное отображение сохраняет свойства заданной структуры. В этом случае нас интересует подгруппа G группы $GL_n^{\ast D}$, $\ast D$ -линейные отображения которой сохраняют свойства заданной структуры. Мы обычно будем называть группу G **группой симметрии**. Не нарушая общности, мы будем отождествлять элемент g группы G с соответствующим преобразованием представления и записывать его действие на вектор $\overline{v} \in \overline{V}$ в виде $g \ast v$.

Не всякие два базиса могут быть связаны преобразованием группы симметрии потому, что не всякое невырожденное линейное преобразование принадлежит представлению группы G . Таким образом, множество базисов можно представить как объединение орбит группы G .

Определение 5.2.3. Мы будем называть орбиту $G \ast \overline{e}$ выбранного базиса $\overline{e}$ многообразием базисов $\mathcal{B}(\overline{V}, G)$ $\ast D$ -векторного пространства $\overline{V}$. $\square$

Теорема 5.2.4. *Активное $T\ast$ -представление группы G на многообразии базисов однотранзитивно.*

Доказательство. Это следствие теоремы 5.2.2 и определения 5.2.3. $\square$

Из теоремы 5.2.4 следует, что многообразие базисов $\mathcal{B}(\overline{V}, G)$ является однородным пространством группы G . Согласно теореме 3.5.13, на многообразии базисов существует $\ast T$ -представление, перестановочное с активным. Как мы видим из замечания 3.5.14 преобразование $\ast T$ -представления отличается от активного преобразования и не может быть сведено к преобразованию пространства $\overline{V}$. Чтобы подчеркнуть различие, это преобразование называется **пассивным преобразованием** многообразия базисов $\mathcal{B}(\overline{V}, G)$, а $\ast T$ -представление называется **пассивным $\ast T$ -представлением**. Согласно определению мы будем записывать пассивное преобразование базиса $\overline{e}$, порождённое элементом $A \in G$, в форме $\overline{e} \ast A$.

Замечание 5.2.5. Я привёл примеры пассивных и активных представлений в таблице 5.2.1. $\square$

Таблица 5.2.1. Активное и пассивное представления

векторное пространство	группа представления	активное представление	пассивное представление
$\ast D$ -векторное пространство	$GL_n^{\ast D}$	$T\ast$ -	$\ast T$ -
$\ast D$ -векторное пространство	$GL_n^{\ast D}$	$T\ast$ -	$\ast T$ -
$D\ast$ -векторное пространство	$GL_n^{\ast D}$	$\ast T$ -	$T\ast$ -
$D\ast$ -векторное пространство	$GL_n^{\ast D}$	$\ast T$ -	$T\ast$ -

Согласно теореме 3.5.7 мы можем определить на $\mathcal{B}(\overline{V}, G)$ две формы координат, определённые на группе G . Так как мы определили два представления группы G на $\mathcal{B}(\overline{V}, G)$, то мы для определения координат пользуемся пассивным $\ast T$ -представлением. Наш выбор основан на следующей теореме.

Теорема 5.2.6. Координатная матрица *D -базиса $\bar{g}$ относительно *D -базиса $\bar{e}$ векторного пространства $\bar{V}$ совпадает с матрицей пассивного преобразования, отображающего *D -базис $\bar{e}$ в *D -базис $\bar{g}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно конструкции, изложенной в примере 4.3.6, координатная матрица *D -базиса $\bar{g}$ относительно *D -базиса $\bar{e}$ состоит из $*$ -строк, являющихся координатными матрицами векторов $\bar{g}_i$ относительно *D -базиса $\bar{e}$. Следовательно,

$$(5.2.4) \quad \bar{g}_i = \bar{e}_* {}^* g_i$$

В тоже время пассивное преобразование $\bar{A}$, связывающее два *D -базиса, имеет вид

$$(5.2.5) \quad \bar{g}_i = \bar{e}_* {}^* A_i$$

В силу теоремы 4.3.3,

$$g_i = A_i$$

для любого i . Это доказывает теорему. $\square$

Координаты представления называются **стандартными координатами *D -базиса**. Эта точка зрения позволяет определить два типа координат для элемента g группы G . Мы можем либо пользоваться координатами, определёнными на группе, либо определить координаты как элементы матрицы соответствующего преобразования. Первая форма координат более эффективна, когда мы изучаем свойства группы G . Вторая форма координат содержит избыточную информацию, но бывает более удобна, когда мы изучаем представление группы G . Мы будем называть вторую форму координат **координатами представления**.

5.3. Геометрический объект в *D -векторном пространстве

Активное преобразование изменяет *D -базисы и векторы согласовано и координаты вектора относительно *D -базиса не меняются. Пассивное преобразование меняет только *D -базис, и это ведёт к изменению координат вектора относительно *D -базиса.

Допустим пассивное преобразование $\bar{A} \in G$ отображает *D -базис $\bar{e} \in \mathcal{B}(\bar{V}, G)$ в *D -базис $\bar{e}' \in \mathcal{B}(\bar{V}, G)$

$$(5.3.1) \quad \bar{e}' = \bar{e}_* {}^* A$$

Допустим вектор $\bar{v} \in \bar{V}$ имеет разложение

$$(5.3.2) \quad \bar{v} = \bar{e}_* {}^* v$$

относительно *D -базиса $\bar{e}$ и имеет разложение

$$(5.3.3) \quad \bar{v} = \bar{e}'_* {}^* v'$$

относительно *D -базиса $\bar{e}'$. Из (5.3.1) и (5.3.3) следует, что

$$(5.3.4) \quad \bar{v} = \bar{e}_* {}^* A {}^* v'$$

Сравнивая (5.3.2) и (5.3.4) получаем, что

$$(5.3.5) \quad v = A {}^* v'$$

Так как A - * -невыврожденная матрица, то из (5.3.5) следует

$$(5.3.6) \quad v' = A^{-1} {}^* {}^* v$$

Преобразование координат (5.3.6) не зависит от вектора $\bar{V}$ или базиса $\bar{e}$, а определено исключительно координатами вектора $\bar{V}$ относительно базиса $\bar{e}$.

Теорема 5.3.1. Преобразования координат (5.3.6) порождают контравариантное эффективное *D -линейное $T\star$ -представление группы G , называемое координатным представлением в *D -векторном пространстве.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим мы имеем два последовательных пассивных преобразования $\bar{A}$ и $\bar{B}$. Преобразование координат (5.3.6) соответствует пассивному преобразованию $\bar{A}$. Преобразование координат

$$(5.3.7) \quad v'' = B^{-1*} {}^* {}^* v'$$

соответствует пассивному преобразованию $\bar{B}$. Произведение преобразований координат (5.3.6) и (5.3.7) имеет вид

$$(5.3.8) \quad v'' = B^{-1*} {}^* {}^* A^{-1*} {}^* {}^* v = (A {}^* {}^* B)^{-1*} {}^* {}^* v$$

и является координатным преобразованием, соответствующим пассивному преобразованию $\bar{A} {}^* {}^* \bar{B}$. Это доказывает, что преобразования координат порождают контравариантное *D -линейное $T\star$ -представление группы G .

Если координатное преобразование не изменяет векторы δ_k , то ему соответствует единица группы G , так как пассивное представление однотранзитивно. Следовательно, координатное представление эффективно. $\square$

Предположим, что *D -линейное отображение группы G в группу пассивных преобразований *D -векторного пространства $\bar{N}$ согласовано с группой симметрий векторного *D -пространства $\bar{V}$.^{5.2} Это означает, что пассивному преобразованию $\bar{A}$ *D -векторного пространства $\bar{V}$ соответствует пассивное преобразование $\bar{A}(\bar{a})$ *D -векторного пространства $\bar{N}$.

$$(5.3.9) \quad \bar{e}'_{\bar{N}} = \bar{e}'_{\bar{N}*} {}^* \bar{A}(\bar{a})$$

Тогда координатное преобразование в $\bar{N}$ принимает вид

$$(5.3.10) \quad w' = A(a^{-1*} {}^* {}^* w) = A(a)^{-1*} {}^* {}^* w$$

Определение 5.3.2. Мы будем называть орбиту

$$(A(G)^{-1*} {}^* {}^* w, \bar{e}'_{\bar{V}*} {}^* G)$$

геометрическим объектом в координатном представлении, определённом в *D -векторном пространстве $\bar{V}$. Для любого *D -базиса $\bar{e}'_{\bar{V}} = \bar{e}'_{\bar{V}*} {}^* \bar{A}$ соответствующая точка (5.3.10) орбиты определяет координаты геометрического объекта в координатном *D -векторном пространстве относительно *D -базиса $\bar{e}'_{\bar{V}}$. $\square$

Определение 5.3.3. Мы будем называть орбиту

$$(A(G)^{-1*} {}^* {}^* w, \bar{e}'_{\bar{N}*} {}^* A(G), \bar{e}'_{\bar{V}*} {}^* G)$$

геометрическим объектом, определённым в *D -векторном пространстве $\bar{V}$. Для любого *D -базиса $\bar{e}'_{\bar{V}} = a {}^* {}^* \bar{e}'_{\bar{V}}$ соответствующая точка (5.3.10)

^{5.2}Мы пользуемся одним и тем же символом типа векторного пространства для векторных пространств $\bar{N}$ и $\bar{V}$. Тем не менее они могут иметь различный тип.

орбиты определяет **координаты геометрического объекта в *D -векторном пространстве** относительно *D -базиса $\bar{e}'_V$ и соответствующий вектор

$$\bar{w} = \bar{e}'_N {}^*w'$$

называется **представителем геометрического объекта в D_* -векторном пространстве** в *D -базисе $\bar{e}'_V$. $\square$

Так как геометрический объект - это орбита представления, то согласно теореме 3.4.13 определение геометрического объекта корректно.

Мы будем также говорить, что $\bar{w}$ - это **геометрический объект типа A**

Определение 5.3.2 строит геометрический объект в координатном пространстве. Определение 5.3.3 предполагает, что мы выбрали *D -базис в векторном пространстве $\bar{W}$. Это позволяет использовать представитель геометрического объекта вместо его координат.

Вопрос как велико разнообразие геометрических объектов хорошо изучен в случае векторных пространств. Однако он не столь очевиден в случае *D -векторных пространств. Как видно из таблицы 5.2.1 D_* -векторное пространство и *D -векторное пространство имеют общую группу симметрии GL_n^{*D} . Это позволяет, рассматривая пассивное представление в *D -векторное пространство, изучать геометрический объект в D_* -векторном пространстве. Можем ли мы одновременно изучать геометрический объект в *D -пространстве? На первый взгляд, в силу теоремы 4.8.9 ответ отрицательный. Однако, равенство 2.2.6 устанавливает искомый *D -линейное отображение между GL_n^{*D} и GL_n^{*D} .

Теорема 5.3.4 (принцип инвариантности). *Представитель геометрического объекта не зависит от выбора *D -базиса $\bar{e}'_V$.*

Доказательство. Чтобы определить представителя геометрического объекта, мы должны выбрать *D -базис $\bar{e}'_V$, *D -базис $\bar{e}'_W$ и координаты геометрического объекта w^α . Соответствующий представитель геометрического объекта имеет вид

$$\bar{w} = \bar{e}'_W {}^*w$$

*D -базис $\bar{e}'_V$ связан с *D -базисом $\bar{e}'_V$ пассивным преобразованием

$$\bar{e}'_V = \bar{e}'_V {}^*A$$

Согласно построению это порождает пассивное преобразование (5.3.9) и координатное преобразование (5.3.10). Соответствующий представитель геометрического объекта имеет вид

$$\bar{w}' = e'_{W*} {}^*\bar{w}' = \bar{e}'_W {}^*A(a) {}^*A(a)^{-1} {}^*w = \bar{e}'_W {}^*w = \bar{w}$$

Следовательно, представитель геометрического объекта инвариантен относительно выбора базиса. $\square$

Определение 5.3.5. Пусть

$$\bar{w}_1 = \bar{e}'_W {}^*w_1$$

$$\bar{w}_2 = \bar{e}'_W {}^*w_2$$

геометрические объекты одного и того же типа, определённые в *D -векторном пространстве $\bar{V}$. Геометрический объект

$$\bar{w} = \bar{e}'_W {}^*(w_1 + w_2)$$

называется **суммой**

$$\overline{w} = \overline{w}_1 + \overline{w}_2$$

геометрических объектов $\overline{w}_1$ и $\overline{w}_2$. $\square$

Определение 5.3.6. Пусть

$$\overline{w}_1 = \overline{e}_{\overline{W}*} w_1$$

геометрический объект, определённый в *D -векторном пространстве $\overline{V}$. Геометрический объект

$$\overline{w}_2 = \overline{e}_{\overline{W}*}(kw_1)$$

называется **произведением**

$$\overline{w}_2 = k\overline{w}_1$$

геометрического объекта $\overline{w}_1$ и константы $k \in D$. $\square$

Теорема 5.3.7. *Геометрические объекты типа A , определённые в *D -векторном пространстве $\overline{V}$, образуют *D -векторное пространство.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы следует из непосредственной проверки свойств векторного пространства. $\square$

*D -линейное отображение

6.1. *D -линейное отображение

В этом разделе мы положим, что $\overline{V}$, $\overline{W}$ - это *D -векторные пространства.

Определение 6.1.1. Обозначим $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ множество *D -линейных отображений

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

*D -векторного пространства $\overline{V}$ в *D -векторное пространство $\overline{W}$. Обозначим $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ множество *D -линейных отображений

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

*D -векторного пространства $\overline{V}$ в *D -векторное пространство $\overline{W}$. $\square$

Мы можем рассматривать тело D как одномерное *D -векторное пространство. Соответственно мы можем рассматривать множества $\mathcal{L}({}^*D; D; \overline{W})$ и $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; D)$.

Определение 6.1.2. Обозначим $\mathcal{L}({}^*T; S; R)$ множество *T -представлений тела S в аддитивной группе тела R . Обозначим $\mathcal{L}(T; S; R)$ множество T -представлений тела S в аддитивной группе тела R . $\square$

Теорема 6.1.3. Предположим, что $\overline{V}$, $\overline{W}$ - *D -векторные пространства. Тогда множество $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ является абелевой группой относительно закона композиции

$$(6.1.1) \quad (\overline{A} + \overline{B})_* {}^*\overline{x} = \overline{A}_* {}^*\overline{x} + \overline{B}_* {}^*\overline{x}$$

Доказательство. Нам надо показать, что отображение

$$\overline{A} + \overline{B} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

определённое равенством (6.1.1), - это *D -линейное отображение *D -векторных пространств. Согласно определению 4.4.2

$$\begin{aligned} \overline{A}_* {}^*(\overline{x}_* {}^*a) &= (\overline{A}_* {}^*\overline{x})_* {}^*a \\ \overline{B}_* {}^*(\overline{x}_* {}^*a) &= (\overline{B}_* {}^*\overline{x})_* {}^*a \end{aligned}$$

Мы видим, что

$$\begin{aligned} (\overline{A} + \overline{B})_* {}^*(a\overline{x}_* {}^*) &= \overline{A}_* {}^*(a_* {}^*\overline{x}) + \overline{B}_* {}^*(\overline{x}_* {}^*a) \\ &= (\overline{x}_* {}^*\overline{A})_* {}^*a + (\overline{x}_* {}^*\overline{B})_* {}^*a \\ &= (\overline{A}_* {}^*\overline{x} + \overline{B}_* {}^*\overline{x})_* {}^*a \\ &= ((\overline{A} + \overline{B})_* {}^*\overline{x})_* {}^*a \end{aligned}$$

Нам надо показать так же, что эта операция коммутативна.

$$\begin{aligned} (\overline{A} + \overline{B})_*^* \overline{x} &= \overline{A}_*^* \overline{x} + \overline{B}_*^* \overline{x} \\ &= \overline{B}_*^* \overline{x} + \overline{A}_*^* \overline{x} \\ &= (\overline{B} + \overline{A})_*^* \overline{x} \end{aligned}$$

□

Определение 6.1.4. *D -Линейное отображение $\overline{A} + \overline{B}$ называется **суммой *D -линейных отображений $\overline{A}$ и $\overline{B}$** . □

Теорема 6.1.5. Пусть $\overline{f} = (\overline{f}_i, i \in I)$ - *D -базис в векторном пространстве $\overline{V}$ и $\overline{e} = (\overline{e}_j, j \in J)$ - *D -базис в векторном пространстве $\overline{W}$. Пусть $A = ({}^j A_i), i \in I, j \in J$, - произвольная матрица. Тогда отображение

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

определённое равенством

$$b = A_*^* a$$

относительно выбранных *D -базисов, является *D -линейным отображением векторных пространств.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема 6.1.5 является обратным утверждением теореме 4.4.3. Предположим $\overline{A}_*^* \overline{v} = \overline{e}_*^* A_*^* v$. Тогда

$$\begin{aligned} \overline{A}_*^* (\overline{v}_*^* a) &= \overline{e}_*^* A_*^* v_*^* a \\ &= (\overline{A}_*^* \overline{v})_*^* a \end{aligned}$$

□

Теорема 6.1.6. Пусть $\overline{f} = (\overline{f}_i, i \in I)$ - *D -базис в векторном пространстве $\overline{V}$ и $\overline{e} = (\overline{e}_j, j \in J)$ - *D -базис в векторном пространстве $\overline{W}$. Предположим *D -линейное отображение $\overline{A}$ имеет матрицу $A = ({}^j A_i), i \in I, j \in J$, относительно выбранных *D -базисов. Пусть $t \in D$. Тогда матрица

$${}^j (tA)_i = t {}^j A_i$$

определяет *D -линейное отображение

$$t\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

которое мы будем называть $D\star$ -произведением *D -линейного отображения $\overline{A}$ на скаляр.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы является следствием теоремы 6.1.5. □

Теорема 6.1.7. Множество $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ является D_*^* -векторным пространством.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема 6.1.3 утверждает, что $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ - абелева группа. Из теоремы 6.1.6 следует, что элемент тела D порождает $T\star$ -преобразование на абелевой группе $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$. Из теорем 6.1.5, 4.1.1 и 4.1.3 следует, что множество $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ является $D\star$ -векторным пространством.

Выписывая элементы базиса $D\star$ -векторного пространства $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ в виде * -строки или * -столбца, мы представим $D\star$ -векторное пространство $\mathcal{L}({}^*D; \overline{V}; \overline{W})$ как D_*^* - или D_*^* -векторное пространство. При этом надо иметь

в виду, что выбор между $D_\star^*$ - и $D^*_\star$ -линейной зависимостью в $D\star$ -векторном пространстве $\mathcal{L}(\star^*D; \bar{V}; \bar{W})$ не зависит от типа векторных пространств $\bar{V}$ и $\bar{W}$.

Для того, чтобы выбрать тип векторного пространства $\mathcal{L}(\star^*D; \bar{V}; \bar{W})$ мы обратим внимание на следующее обстоятельство. Допустим $\bar{V}$ и $\bar{W}$ - $\star^*D$ -векторные пространства. Допустим $\mathcal{L}(\star^*D; \bar{V}; \bar{W})$ - $D_\star^*$ -векторное пространство. Тогда действие $\star$ -строки $\star^*D$ -линейных отображений ${}^j\bar{A}$ на $\star$ -строку векторов $\bar{f}_i$ можно представить в виде матрицы

$$\begin{pmatrix} {}^1\bar{A} \\ \dots \\ {}^m\bar{A} \end{pmatrix} \star \begin{pmatrix} \bar{f}_1 & \dots & \bar{f}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^1\bar{A}_\star^* \bar{f}_1 & \dots & {}^1\bar{A}_\star^* \bar{f}_n \\ \dots & \dots & \dots \\ {}^m\bar{A}_\star^* \bar{f}_1 & \dots & {}^m\bar{A}_\star^* \bar{f}_n \end{pmatrix}$$

Эта запись согласуется с матричной записью действия $D_\star^*$ -линейной комбинации $a_\star^* \bar{A}$ $\star^*D$ -линейных отображений $\bar{A}$. $\square$

Мы можем также определить $\star D$ -произведение $\star^*D$ -линейного отображения $\bar{A}$ на скаляр. Однако, вообще говоря, это $\star T$ -представление тела D в $D\star$ -векторном пространстве $\mathcal{L}(\star^*D; \bar{V}; \bar{W})$ не может быть перенесено в $\star^*D$ -векторное пространство $\bar{W}$. Действительно, в случае $\star D$ -произведения мы имеем

$$(\bar{A}m)_\star^* \bar{v} = (\bar{A}m)_\star^* \bar{f}_\star^* v = \bar{e}_\star^* (Am)_\star^* v$$

Поскольку произведение в теле не коммутативно, мы не можем выразить полученное выражение как произведение $\bar{A}_\star^* \bar{v}$ на скаляр m .

Следствием теоремы 6.1.7 является неоднозначность записи

$$m_\star^* A_\star^* v$$

Мы можем предположить, что смысл этой записи ясен из контекста. Однако желательно неоднозначность избежать. Мы будем пользоваться для этой цели скобками. Выражение

$$w = [m_\star^* A]_\star^* v$$

означает, что $D_\star^*$ -линейная комбинация $\star^*D$ -линейных отображений iA отображает вектор $\bar{v}$ в вектор $\bar{w}$. Выражение

$$w = B_\star^* A_\star^* v$$

означает, что $\star^*$ -произведение $\star^*D$ -линейных отображений A и B отображает вектор $\bar{v}$ в вектор $\bar{w}$.

6.2. 1- $\star$ - D -форма на векторном пространстве

Определение 6.2.1. 1- $\star$ - D -форма на векторном пространстве $\bar{V}$ - это $\star^*D$ -линейное отображение

$$(6.2.1) \quad \bar{b} : \bar{V} \rightarrow D$$

$\square$

Мы можем значение 1- $\star$ - D -формы $\bar{b}$, определённое для вектора $\bar{a}$, записывать в виде

$$\bar{b}(\bar{a}) = \langle \bar{b}, \bar{a} \rangle$$

Теорема 6.2.2. Множество $\mathcal{L}(\star^*D; \bar{V}; D)$ является $D\star$ -векторным пространством.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. *D -векторное пространство размерности 1 эквивалентно телу D $\square$

Теорема 6.2.3. Пусть $\bar{e}$ - *D -базис в векторном пространстве $\bar{V}$. $1-{}^*D$ -форма $\bar{b}$ имеет представление

$$(6.2.2) \quad \langle \bar{b}, \bar{a} \rangle = b_* {}^*a$$

относительно выбранного *D -базиса, где вектор $\bar{a}$ имеет разложение

$$(6.2.3) \quad \bar{a} = \bar{e}_* {}^*a$$

и

$$(6.2.4) \quad b_i = \langle \bar{b}, \bar{e}_i \rangle$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как $\bar{b}$ - $1-{}^*D$ -форма, из (6.2.3) следует, что

$$(6.2.5) \quad \langle \bar{b}, \bar{a} \rangle = \langle \bar{b}, \bar{e}_* {}^*a \rangle = \langle \bar{b}, \bar{e}_i \rangle {}^i a$$

(6.2.2) следует из (6.2.5) и (6.2.4). $\square$

Теорема 6.2.4. Пусть $\bar{e}$ - *D -базис в векторном пространстве $\bar{V}$. $1-{}^*D$ -форма (6.2.1) однозначно определена значениями (6.2.4), в которые $1-{}^*D$ -форма $\bar{b}$ отображает вектора базиса.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение является следствием теорем 6.2.3 и 4.3.3. $\square$

Теорема 6.2.5. Пусть $\bar{e}$ - *D -базис в векторном пространстве $\bar{V}$. Множество $1-{}^*D$ -форм ${}^i \bar{d}$ таких, что

$$(6.2.6) \quad \langle {}^j \bar{d}, \bar{e}_i \rangle = {}^j \delta_i$$

является $D_* {}^*D$ -базисом $\bar{d}$ векторного пространства $\mathcal{L}({}_* {}^*D; \bar{V}; D)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. $1-{}^*D$ -форма ${}^j \bar{d}$ существует для данного j согласно теореме 6.2.4, если положить $b_i = {}^j \delta_i$. Если предположить, что существует $1-{}^*D$ -форма

$$\bar{b} = b_* {}^* \bar{d} = \bar{0}$$

то

$$b_j \langle {}^j \bar{d}, \bar{e}_i \rangle = 0$$

Согласно равенству (6.2.6)

$$b_i = b_j {}^j \delta_i = 0$$

Следовательно, $1-{}^*D$ -формы ${}^j \bar{d}$ линейно независимы. $\square$

Определение 6.2.6. Пусть $\bar{V}$ - *D -векторное пространство. $D_* {}^*D$ -векторное пространство

$$\bar{V}^* = \mathcal{L}({}_* {}^*D; \bar{V}; D)$$

называется **дуальным пространством к *D -векторному пространству $\bar{V}$** . Пусть $\bar{e}$ - *D -базис в векторном пространстве $\bar{V}$. $D_* {}^*D$ -базис $\bar{d}$ векторного пространства $\bar{V}^*$, удовлетворяющий равенству (6.2.6), называется **$D_* {}^*D$ -базисом, дуальным *D -базису $\bar{e}$** . $\square$

Теорема 6.2.7. Пусть $\bar{A}$ - пассивное преобразование многообразия базисов $\mathcal{B}(\bar{V}, GL_n^{*D})$. Допустим $*D$ -базис

$$(6.2.7) \quad \bar{e}' = \bar{e}_*^* A$$

является образом $*D$ -базиса $\bar{e}$. Пусть $\bar{B}$ - пассивное преобразование многообразия базисов $\mathcal{B}(\bar{V}^*, GL_n^{*D})$ такое, что D_*^* -базис

$$(6.2.8) \quad \bar{d}' = B_*^* \bar{d}$$

дуален $*D$ -базису. Тогда

$$(6.2.9) \quad B = A^{-1*}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из равенств (6.2.6), (6.2.7), (6.2.8) следует

$$(6.2.10) \quad \begin{aligned} {}^j \delta_i &= \langle {}^j \bar{d}', \bar{e}'_i \rangle \\ &= {}^j B_l \langle {}^l \bar{d}, \bar{e}_k \rangle = {}^k A_i \\ &= {}^j B_l {}^l \delta_k = {}^k A_i \\ &= {}^j B_k = {}^k A_i \end{aligned}$$

Равенство (6.2.9) следует из равенства (6.2.10). $\square$

6.3. Парные представления тела

Теорема 6.3.1. В любом $*D$ -векторном пространстве можно определить структуру $D*$ -векторного пространства, определив $D*$ -произведение вектора на скаляр равенством

$$m\bar{v} = m\bar{d}_*^* \bar{v}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Непосредственная проверка доказывает, что отображение

$$f : D \rightarrow \bar{V}^*$$

определённое равенством

$$f(m) = m\bar{d}$$

определяет $T*$ -представление кольца D . $\square$

Мы можем иначе сформулировать теорему 6.3.1.

Теорема 6.3.2. Если мы определили эффективное $*T$ -представление f тела D на абелевой группе $\bar{V}$, то мы можем однозначно определить эффективное $T*$ -представление h тела D на абелевой группе $\bar{V}$ такое, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} \bar{V} & \xrightarrow{h(a)} & \bar{V} \\ \downarrow f(b) & & \downarrow f(b) \\ \bar{V} & \xrightarrow{h(a)} & \bar{V} \end{array}$$

коммутативна для любых $a, b \in D$. $\square$

Мы будем называть представления f и h **парными представлениями** тела D .

Теорема 6.3.3. В векторном пространстве $\bar{V}$ над телом D мы можем определить $D\star$ -произведение и $\star D$ -произведение вектора на скаляр. Согласно теореме 6.3.2 эти операции удовлетворяют равенству

$$(6.3.1) \quad (a\bar{m})b = a(\bar{m}b)$$

Равенство (6.3.1) представляет закон ассоциативности для парных представлений. Это позволяет нам писать подобные выражения не пользуясь скобками.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В разделе 6.1 дано определение $D\star$ -произведения *D -линейного отображения $\bar{A}$ на скаляр. Согласно теореме 6.3.1 $T\star$ -представление тела D в $D\star$ -векторном пространстве $\mathcal{L}({}^*D; \bar{V}; \bar{W})$ может быть перенесено в *D -векторном пространстве $\bar{W}$ согласно правилу

$$[m\bar{A}]_*{}^*\bar{v} = [m\delta]_*{}^*(\bar{A}_*{}^*\bar{v}) = m(\bar{A}_*{}^*\bar{v})$$

□

Аналогия с векторными пространствами над полем заходит столь далеко, что мы можем предположить существование концепции базиса, который годится для $D\star$ -произведения и $\star D$ -произведения вектора на скаляр.

Теорема 6.3.4. В векторном пространстве строк $D_*{}^*$ -многообразие базисов и *D -многообразие базисов отличны

$$\mathcal{B}(\bar{V}, D_*{}^*) \neq \mathcal{B}(\bar{V}, {}^*D)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. При доказательстве этой теоремы мы будем пользоваться стандартным представлением матрицы. Не нарушая общности, мы проведём доказательство в координатном векторном пространстве D^n .

Пусть $\bar{e} = (\bar{e}_i = (\delta_i^j), i, j \in i, |i| = n)$ - множество векторов векторного пространства D^n . Очевидно, $\bar{e}$ является одновременно $D_*{}^*$ -базисом и *D -базисом. Для произвольного множества векторов $(\bar{f}_i, i \in i, |i| = n)$ $D_*{}^*$ -координатная матрица

$$(6.3.2) \quad f = \begin{pmatrix} f_1^1 & \dots & f_1^n \\ \dots & \dots & \dots \\ f_n^1 & \dots & f_n^n \end{pmatrix}$$

относительно базиса $\bar{e}$ совпадает с *D -координатной матрицей относительно базиса $\bar{e}$.

Если множество векторов $(\bar{f}_i, i \in i, |i| = n)$ - *D -базис, то согласно 4.9.3 матрица (6.3.2) - * -невырожденная матрица.

Если множество векторов $(\bar{f}_i, i \in i, |i| = n)$ - $D_*{}^*$ -базис, то согласно теореме 4.9.3 матрица (6.3.2) - * -невырожденная матрица.

Следовательно, если множество векторов $(\bar{f}_i, i \in i, |i| = n)$ порождают $D_*{}^*$ -базис и *D -базис, их координатная матрица (6.3.2) является * -невырожденной и * -невырожденной матрицей. Утверждение следует из теоремы 4.8.9. □

Из теоремы 6.3.4 следует, что в векторном пространстве $\bar{V}$ существует $D_*{}^*$ -базис $\bar{e}$, который не является *D -базисом.

6.4. D -векторное пространство

При изучении многих задач мы вполне можем ограничиться рассмотрением $D\star$ -векторного пространства либо $\star D$ -векторного пространства. Однако есть задачи, в которых мы вынуждены отказаться от простой модели и одновременно рассматривать обе структуры векторного пространства. Подобного рода пространство мы будем называть **D -векторное пространство**.

Допустим, что в D -векторном пространстве $\bar{V}$ определены $\star\star D$ -базис $\bar{\bar{p}}_\star$ и $D^\star_\star$ -базис $\star\bar{\bar{p}}$. Вектор ${}_i\bar{p}$ $D^\star_\star$ -базиса $\star\bar{\bar{p}}$ имеет разложение

$$(6.4.1) \quad {}_i\bar{p} = \bar{p}_j \stackrel{j}{i} p_{12} \quad {}_i\bar{p} = \bar{p}_\star \star {}_i p_{12}$$

относительно $\star D$ -базиса $\bar{\bar{p}}_\star$. Вектор $\bar{p}_j$ $\star D$ -базиса $\bar{\bar{p}}_\star$ имеет разложение

$$(6.4.2) \quad \bar{p}_j = p_{21 \cdot j} \stackrel{i}{i} \bar{p} \quad \bar{p}_j = p_{21 \cdot j} \star {}_\star \bar{p}$$

относительно $D^\star_\star$ -базиса $\star\bar{\bar{p}}$.

Нетрудно видеть из построения, что p_{12} - координатная матрица $D^\star_\star$ -базиса $\star\bar{\bar{p}}$ относительно $\star D$ -базиса $\bar{\bar{p}}_\star$. $\star$ -строки матрицы p_{12} $D^\star_\star$ -линейно независимы.

Аналогично, p_{21} - координатная матрица $\star D$ -базиса $\bar{\bar{p}}_\star$ относительно $D^\star_\star$ -базиса $\star\bar{\bar{p}}$. $\star$ -строки матрицы p_{21} $\star D$ -линейно независимы.

Из равенств (6.4.1) и (6.4.2) следует

$$(6.4.3) \quad {}_i\bar{p} = \bar{p}_j \stackrel{j}{i} p_{12} = p_{21 \cdot j} \stackrel{k}{k} \bar{p} \stackrel{j}{i} p_{12} \quad {}_i\bar{p} = \bar{p}_\star \star {}_i p_{12} = (p_{21} \star \star \bar{p}) \star {}_i p_{12}$$

Из равенства (6.4.3) видно, что порядок скобок существенен.

Хотя матрицы p_{21} и p_{12} не являются взаимно обратными, мы можем сказать, что равенство (6.4.3) описывает тождественное преобразование D -векторного пространства. Это преобразование можно записать также в виде

$$(6.4.4) \quad \begin{aligned} \bar{p}_j &= p_{21 \cdot j} \stackrel{i}{i} \bar{p} = p_{21 \cdot j} \stackrel{i}{i} (\bar{p}_k \stackrel{k}{k} p_{12}) \\ \bar{p}_j &= p_{21 \cdot j} \star {}_\star \bar{p} = p_{21 \cdot j} \star {}_\star (\bar{p}_\star \star p_{12}) \end{aligned}$$

Из сравнения равенств (6.4.3) и (6.4.4) следует, что изменение порядка скобок приводят к изменению порядка суммирования. Эти равенства выражают симметрию в выборе $D^\star_\star$ -базиса $\star\bar{\bar{p}}$ и $\star D$ -базиса $\bar{\bar{p}}_\star$.

Вектор $\bar{r} \in \bar{V}$ имеет разложение

$$(6.4.5) \quad \bar{r} = r^i \stackrel{i}{i} \bar{p} = \bar{p}_j \stackrel{j}{j} r \quad \bar{r} = r^\star \star \bar{p} = \bar{p}_\star \star r$$

Подставим (6.4.1) в (6.4.5)

$$(6.4.6) \quad r^i \bar{p}_j \stackrel{j}{i} p_{12} = \bar{p}_j \stackrel{j}{j} r \quad r^\star \star (\bar{p}_\star \star p_{12}) = \bar{p}_\star \star r$$

Подставим (6.4.5) в (6.4.3)

$$(6.4.7) \quad \begin{aligned} r^i \stackrel{i}{i} \bar{p} &= r^i \bar{p}_j \stackrel{j}{i} p_{12} &= r^i p_{21 \cdot j} \stackrel{k}{k} \bar{p} \stackrel{j}{i} p_{12} \\ r^\star \star \bar{p} &= r^\star \star (\bar{p}_\star \star p_{12}) &= r^\star \star ((p_{21} \star \star \bar{p}) \star p_{12}) \end{aligned}$$

Определение 6.4.1. Координаты

$$r^\star = \begin{pmatrix} r^1 \\ \dots \\ r^n \end{pmatrix}$$

вектора $\bar{r}$ относительно D^* -базиса ${}^*\bar{\bar{p}}$ называются D^* -компонентой координат вектора $\bar{r}$. Координаты

$${}^*r = \begin{pmatrix} 1_r \\ \dots \\ n_r \end{pmatrix}$$

вектора $\bar{r}$ относительно *D -базиса $\bar{\bar{p}}_*$ называются *D -компонентой координат вектора $\bar{r}$. $\square$

Замечание 6.4.2. Чтобы не перегружать текст символикой, мы будем следовать соглашению. Если D^* -компонента координат вектора или *D -компонента координат вектора участвует в операции умножения или мы записываем соответствующие индексы, то мы будем опускать символ $*$, так как из записи будет ясно, какие компоненты вектора мы используем. Аналогичное соглашение распространяется на *D -базис $\bar{\bar{p}}_*$ и *D -базис ${}^*\bar{\bar{p}}$. Мы не будем пользоваться соглашением в тех случаях, когда сокращённая запись может быть прочтена неоднозначно. $\square$

В отображении (6.4.7) мы видим, что *D -базис подвергается определённому преобразованию. Разложение вектора относительно *D -базиса остаётся неизменным до и после преобразования. В разделе 5.2 мы определили активное и пассивное преобразования на многообразии базисов *D -векторного пространства. По аналогии мы можем предположить, что преобразование (6.4.3) является пассивным преобразованием.

Произведение представлений

7.1. Бимодуль

Определение 7.1.1. $\bar{V}$ - $(S\star, \star T)$ -бимодуль, если на множестве $\bar{V}$ определены структуры $S\star$ -векторного пространства и $\star T$ -векторного пространства. ^{7.1} $\square$

Мы также пользуемся записью ${}_S\bar{V}_T$, когда мы хотим сказать, что $\bar{V}$ - (S, T) -бимодуль.

Пример 7.1.2. В разделе 6.4 мы рассмотрели D -векторное пространство, в котором можно определить структуру $(D^*, {}^*D)$ -бимодуля. $\square$

Пример 7.1.3. Множество $n \times m$ матриц порождает $(D\star, \star D)$ -бимодуль. $D\star$ -базис можно представить в виде множества матриц ${}_i^j e = (\delta_i^l \delta_k^j)$. $\square$

Пример 7.1.4. Чтобы увидеть пример $(S_*, {}^*T)$ -бимодуля, мы можем взять множество матриц

$$(7.1.1) \quad \begin{pmatrix} (A_1, {}^1B) & \dots & (A_1, {}^mB) \\ \dots & \dots & \dots \\ (A_n, {}^1B) & \dots & (A_n, {}^mB) \end{pmatrix}$$

Формально мы можем представить эту матрицу в виде

$$\begin{pmatrix} (A_1, {}^1B) & \dots & (A_1, {}^mB) \\ \dots & \dots & \dots \\ (A_n, {}^1B) & \dots & (A_n, {}^mB) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ \dots \\ A_n \end{pmatrix} {}^* \begin{pmatrix} {}^1B & \dots & {}^mB \end{pmatrix}$$

Это представление ясно показывает, что S_*^* -размерность $(S_*^*, {}^*T)$ -бимодуля равна n и *T -размерность равна m . Однако в отличие от примера 7.1.2 мы не можем построить S_*^* -базис или *T -базис, который порождал бы $(S_*^*, {}^*T)$ -бимодуль. На самом деле базис $(S_*^*, {}^*T)$ -бимодуля имеет вид $({}^a\bar{e}, \bar{f}_b)$, и любой вектор $(S_*^*, {}^*T)$ -бимодуля имеет разложение

$$(7.1.2) \quad (\bar{A}, \bar{B}) = A_a ({}^a\bar{e}, \bar{f}_b) {}^b B$$

коэффициенты которого порождают матрицу (7.1.1). $\square$

Мы можем записать равенство (7.1.2) в виде

$$(7.1.3) \quad (\bar{A}, \bar{B}) = (A_* {}^* \bar{e}, \bar{f}_* {}^* B)$$

^{7.1}Напомним, что в наших обозначениях $S\star$ -векторное пространство означает левое S -векторное пространство и $\star T$ -векторное пространство означает правое T -векторное пространство.

Равенство (7.1.3) выглядит необычно, но оно становится понятным, если мы положим

$$(\overline{A}, \overline{B}) = (\overline{A}, \overline{0}) + (\overline{0}, \overline{B})$$

Соглашение 4.2.6 справедливо для представления векторов *T -векторного пространства независимо от представления векторов $S_*{}^*$ -векторного пространства. Мы можем записать это равенство в виде

$$(7.1.4) \quad (\overline{A}, \overline{B}) = (A^* {}^*\overline{e}, B_* {}^*\overline{f})$$

При этом координаты вектора $(\overline{A}, \overline{B})$ не порождают матрицы. Однако это для нас сейчас не имеет значения.

Мы хотим записать компоненты A и B в равенстве (7.1.2) с одной стороны по отношению к векторам $({}^a\overline{e}, {}^b\overline{f})$. На первый взгляд это кажется невозможной задачей. Однако мы примем соглашение записывать это равенство в виде

$$(\overline{A}, \overline{B}) = (A_a, B^b)({}^a\overline{e}, {}^b\overline{f}) = (A_*^*, B^{*}_*)({}^a\overline{e}, {}^b\overline{f})$$

Эта конструкция легко поддаётся обобщению.

7.2. Прямое произведение тел

Определение 7.2.1. Пусть $\mathcal{A}$ - категория. Пусть $\{B_i, i \in I\}$ - множество объектов из $\mathcal{A}$. Объект

$$P = \prod_{i \in I} B_i$$

и множество морфизмов

$$\{f_i : P \longrightarrow B_i, i \in I\}$$

называется **произведением объектов** $\{B_i, i \in I\}$ в категории $\mathcal{A}^{7.2}$, если для любого объекта R и множества морфизмов

$$\{g_i : R \longrightarrow B_i, i \in I\}$$

существует единственный морфизм

$$h : R \longrightarrow P$$

такой, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{f_i} & B_i \\ h \uparrow & \nearrow g_i & \\ R & & \end{array} \quad f_i \circ h = g_i$$

коммутативна для всех $i \in I$. □

Если $|I| = n$, то для произведения объектов $\{B_i, i \in I\}$ в $\mathcal{A}$ мы так же будем пользоваться записью

$$G = \prod_{i=1}^n B_i = B_1 \times \dots \times B_n$$

^{7.2}Определение дано согласно [1], стр. 45

Определение 7.2.2. Пусть $\{G_i, i \in I\}$ - множество групп. Пусть

$$G = \prod_{i \in I} G_i$$

декартово произведение множеств $G_i, i \in I$. Мы определим на G групповую структуру посредством покомпонентного умножения. Если $x = (x_i, i \in I) \in D$ и $y = (y_i, i \in I) \in D$, мы определим их произведение

$$xy = (x_i y_i, i \in I)$$

Если $x = (x_i, i \in I) \in D$, мы определим обратный элемент

$$x^{-1} = (x_i^{-1}, i \in I)$$

Множество G называется **произведением групп**^{7.3} $G_i, i \in I$. □

Если $|I| = n$, то для произведения групп $G_1, \dots, G_n$ мы так же будем пользоваться записью

$$G = \prod_{i=1}^n G_i = G_1 \times \dots \times G_n$$

Теорема 7.2.3. *Произведение абелевых групп является абелевой группой.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $x = (x_i, i \in I) \in G$ и $y = (y_i, i \in I) \in G$. Тогда

$$x + y = (x_i + y_i, i \in I) = (y_i + x_i, i \in I) = y + x$$

□

Определение 7.2.4. Пусть $\{D_i, i \in I\}$ - множество тел. Пусть

$$D = \prod_{i \in I} D_i$$

произведение аддитивных групп тел $D_i, i \in I$. Если $x = (x_i, i \in I) \in D$ и $y = (y_i, i \in I) \in D$, мы определим их произведение покомпонентно

$$xy = (x_i y_i, i \in I)$$

Мультипликативная единица - это $e = (e_i, i \in I) \in D$, где $e_i, i \in I$ - мультипликативная единица тела D_i . Множество D называется **прямым произведением тел**^{7.4} $D_i, i \in I$. □

Если $|I| = n$, то для прямого произведения тел $D_1, \dots, D_n$ мы так же будем пользоваться записью

$$D = \prod_{i=1}^n D_i = D_1 \times \dots \times D_n$$

Прямое произведение тел $D_i, i \in I$, вообще говоря, не является телом. Например, пусть $x_1 \in D_1, x_1 \neq 0, x_2 \in D_2, x_2 \neq 0$. Тогда

$$(x_1, 0)(0, x_2) = (0, 0)$$

Однако прямое произведение тел является кольцом. Следовательно, прямое произведение не определено в категории тел, но прямое произведение тел определено в категории колец.

^{7.3}Определение дано согласно [1], стр. 47, 48

^{7.4}Определение дано согласно предложению 1 из [1], стр. 79

7.3. Прямое произведение D_*^* -векторных пространств

Теорема 7.3.1. *Допустим категория $\mathcal{A}$ $\mathfrak{F}$ -алгебр имеет произведение. Тогда в категории $T \star \mathcal{A}$ ^{7.5} существует произведение однотранзитивных $T \star$ -представлений $\mathfrak{F}$ -алгебры.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть

$$P = \prod_{i \in I} B_i$$

произведение множества $\mathfrak{F}$ -алгебр $\{B_i, i \in I\}$ и для любого $i \in I$

$$t_i : P \longrightarrow B_i$$

морфизм из $\mathfrak{F}$ -алгебры P в $\mathfrak{F}$ -алгебру B_i . Пусть R другой объект категории $\mathcal{A}$ и для любого $i \in I$

$$r_i : R \longrightarrow B_i$$

морфизм из $\mathfrak{F}$ -алгебры R в $\mathfrak{F}$ -алгебру B_i . Согласно определению 7.2.1 существует единственный морфизм

$$s : R \longrightarrow P$$


такой, что

$$t_i \circ s = r_i$$

Положим

$$N = \prod_{i \in I} K_i$$

декартово произведение множеств $K_i, i \in I$. Для каждого $i \in I$ рассмотрим соответствующие морфизмы представлений $\mathfrak{F}$ -алгебры на диаграмме



Из диаграмм (2), (3) и теоремы 3.2.10 следует коммутативность диаграммы (1). Пусть $m \in M$. Согласно теореме 3.2.8 отображение S определено однозначно, если мы выберем образ $S(m) \in N$. Так как диаграмма (1) коммутативна, то мы полагаем $S(m) = (R_i(m), i \in I)$. $\square$

^{7.5}Смотри определение 3.2.11

Теорема 7.3.2. В категории $T \star \mathcal{G}$ T -представлений группы существует произведение эффективных T -представлений группы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы является следствием теорем 7.3.1 и 3.5.10 $\square$

Определение 7.3.3. Пусть $\{\bar{V}_i, i \in I\}$ - множество *D_i -векторных пространств. T -Представление кольца $D = \prod_{i \in I} D_i$ в абелевой группе $\bar{V} = \prod_{i \in I} \bar{V}_i$ называется прямым произведением

$$\bar{V} = \prod_{i \in I} \bar{V}_i$$

*D_i -векторных пространств $\bar{V}_i, i \in I$. $\square$

Если $|I| = n$, то для прямого произведения *D_i -векторных пространств $\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n$ мы так же будем пользоваться записью

$$\bar{V} = \prod_{i=1}^n \bar{V}_i = \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n$$

Согласно определению представление кольца D в абелевой группе $\bar{V}$ определено покомпонентно. Если $a = (a_i, i \in I) \in D$ и $\bar{v} = (\bar{v}_i, i \in I) \in \bar{V}$, мы определим $\star T$ -представление, соответствующее элементу a

$$\bar{v}a = (\bar{v}_i a_i, i \in I)$$

Мы рассматриваем соглашение, описанное в замечании 2.2.15, покомпонентно. Линейную комбинацию *D -векторов $\bar{v}_k$ мы будем записывать в виде

$$\bar{v}_* a = (\bar{v}_{i*} a_i, i \in I) = (\bar{v}_{i \cdot k} {}^k a_i, i \in I)$$

Мы так же будем пользоваться записью

$$(7.3.1) \quad \bar{v}_* a = (\bar{v}_{i \cdot *}, i \in I) ({}^* a_i, i \in I) = (\bar{v}_{i \cdot k}, i \in I) ({}^k a_i, i \in I)$$

Если $|I| = n$, то равенство (7.3.1) можно записать в виде

$$\bar{v}_* a = (\bar{v}_{1 \cdot *}, \dots, \bar{v}_{n \cdot *}) ({}^* a_1, \dots, {}^* a_n) = (\bar{v}_{1 \cdot k_1}, \dots, \bar{v}_{n \cdot k_n}) ({}^{k_1} a_1, \dots, {}^{k_n} a_n)$$

Так как прямое произведение тел не является телом, то прямое произведение *D_i -векторных пространств, вообще говоря, является модулем. Однако структура этого модуля близка к структуре *D -векторного пространства.

Теорема 7.3.4. Пусть $\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n$ - множество *D_i -векторных пространств. Пусть $\bar{e}_i$ - *D_i -базис векторного пространства $\bar{V}_i$. Множество векторов $(\bar{e}_{1 \cdot i_1}, \dots, \bar{e}_{n \cdot i_n})$ порождает базис прямого произведения

$$\bar{V} = \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем утверждение теоремы индукцией по n .

При $n = 1$ утверждение очевидно.

^{7.6}Определение дано согласно [1], стр. 98

Допустим утверждение справедливо при $n = k - 1$. Мы можем представить пространство $\bar{V}$ в виде^{7.7}

$$\bar{V} = \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_k = (\bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_{k-1}) \times \bar{V}_k$$

Соответственно, произвольный вектор $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) \in \bar{V}$ можно представить в виде

$$(7.3.2) \quad (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) = ((\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{k-1}), \bar{v}_k) = ((\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{k-1}), \bar{0}) + (\bar{0}, \bar{v}_k)$$

Вектор $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{k-1}) \in \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_{k-1}$ и согласно предположению индукции

$$(7.3.3) \quad (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{k-1}) = (\bar{e}_{1*}, \dots, \bar{e}_{k-1*}) (*v_1, \dots, *v_{k-1})$$

Из равенств (7.3.2) и (7.3.3) следует


$$\begin{aligned} (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) &= ((\bar{e}_{1*}, \dots, \bar{e}_{k-1*}) (*v_1, \dots, *v_{k-1}), \bar{0}) + (\bar{0}, \bar{e}_{k*} *v_k) \\ &= (\bar{e}_{1*}, \dots, \bar{e}_{k-1*}, \bar{e}_k) (*v_1, \dots, *v_{k-1}, 0) + (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{k-1}, \bar{e}_{k*}) (0, \dots, *v_k) \\ &= (\bar{e}_{1*}, \dots, \bar{e}_{k-1*}, \bar{e}_{k*}) (*v_1, \dots, *v_{k-1}, *v_k) \end{aligned}$$

Следовательно утверждение справедливо при $n = k$. $\square$

Если $\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n$ - D -векторные пространства, то прямое произведение называется **прямым произведением D -векторных пространств**.

Теорема 7.3.5. Допустим категория $\mathcal{A}$ $\mathfrak{F}$ -алгебр имеет произведение. Тогда в категории $T \star A$ ^{7.8}, где A - $\mathfrak{F}$ -алгебра, существует произведение однотранзитивных $T \star$ -представлений $\mathfrak{F}$ -алгебры A .

Доказательство. Доказательство теоремы похоже на доказательство теоремы 7.3.1 с той разницей, что мы пользуемся диаграммой



$\square$

^{7.7}Вообще говоря, мы должны рассматривать более широкий класс модулей вида

$$\bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_k$$

включая ассоциативность произведения.

^{7.8}Смотри определение 3.2.19

Рассмотрим связь между произведением однотранзитивных $T\star$ -представлений $\mathfrak{F}$ -алгебры A в категории $T\star\mathcal{A}$ и произведением однотранзитивных $T\star$ -представлений $\mathfrak{F}$ -алгебры A в категории $T\star A$. Пусть для каждого $i \in I$ определено представление $\mathfrak{F}$ -алгебры A на множестве K_i . Для каждого $i \in I$ рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} A & \xrightarrow{f_i} & A \\ \uparrow g & \nearrow id & \\ A & & \end{array}$$

где g - отображение алгебры A на диагональ в $\prod_{i \in I} A$ и f_i - проекция на множитель i . Из диаграммы следует, что отображения g и f_i инъективны. Следовательно оба произведения эквивалентны.

7.4. Морфизмы прямого произведения *D -векторных пространств

Пусть $\overline{V}_i, i \in I, \overline{W}_j, j \in J$ - *D -векторные пространства. Положим

$$\begin{aligned} \overline{V} &= \prod_{i \in I} \overline{V}_i \\ \overline{W} &= \prod_{j \in J} \overline{W}_j \end{aligned}$$

*D -линейное отображение

$$(7.4.1) \quad \overline{f} : \overline{V} \longrightarrow \overline{W}$$

сохраняет линейные операции. Так как операции в модуле $\overline{W}$ мы выполняем покомпонентно, то мы можем представить отображение $\overline{f}$ в виде

$$\overline{f} = (\overline{f}_j : \overline{V} \longrightarrow \overline{W}_j, j \in J)$$

Пусть

$$\overline{I}_i : \overline{V}_i \longrightarrow \overline{V} \quad i \in I$$

вложение $\overline{V}_i$ в $\overline{V}$. Тогда для любого вектора $\overline{v} = (\overline{v}_i, i \in I)$ справедливо

$$\overline{f}_j(\overline{v}) = \sum_{i \in I} \overline{f}_{j*} {}^* \overline{I}_i {}^* \overline{v}_i$$

Следовательно, отображение (7.4.1) можно представить в виде матрицы *D -линейных отображений

$$\overline{f} = (\overline{f}_{ij} = \overline{f}_{j*} {}^* \overline{I}_i : \overline{V}_i \longrightarrow \overline{W}_j, i \in I, j \in J)$$

Геометрия тела

8.1. Центр тела

Определение 8.1.1. Пусть D - кольцо.^{8.1} Множество $Z(D)$ элементов $a \in D$ таких, что

$$(8.1.1) \quad ax = xa$$

для всех $x \in D$, называется **центром кольца** D . □

Теорема 8.1.2. Центр $Z(D)$ кольца D является подкольцом кольца D .

Доказательство. Непосредственно следует из определения 8.1.1. □

Теорема 8.1.3. Центр $Z(D)$ тела D является подполем тела D .

Доказательство. Согласно теореме 8.1.2 достаточно проверить, что $a^{-1} \in Z(D)$, если $a \in Z(D)$. Пусть $a \in Z(D)$. Многократно применяя равенство (8.1.1), мы получим цепочку равенств

$$(8.1.2) \quad aa^{-1}x = x = xaa^{-1} = axa^{-1}$$

Из (8.1.2) следует

$$a^{-1}x = xa^{-1}$$

Следовательно, $a^{-1} \in Z(D)$. □

Определение 8.1.4. Пусть D - кольцо с единицей e .^{8.2} Отображение

$$l : Z \rightarrow D$$

для которого $l(n) = ne$ будет гомоморфизмом колец, и его ядро является идеалом (n) , порождённым целым числом $n \geq 0$. Канонический инъективный гомоморфизм

$$Z/nZ \rightarrow D$$

является изоморфизмом между Z/nZ и подкольцом в D . Если nZ - простой идеал, то у нас возникает два случая.

- $n = 0$. D содержит в качестве подкольца кольцо, изоморфное Z и часто отождествляемое с Z . В этом случае мы говорим, что D имеет **характеристику 0**.
- $n = p$ для некоторого простого числа p . D имеет **характеристику p** , и D содержит изоморфный образ $F_p = Z/pZ$. □

^{8.1}[1], стр. 84.

^{8.2}Определение дано согласно определению из [1], стр. 84, 85.

Теорема 8.1.5. Пусть D - кольцо характеристики 0 и пусть $d \in D$. Тогда любое целое число $n \in \mathbb{Z}$ коммутирует с d .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы доказывается по индукции. При $n = 0$ и $n = 1$ утверждение очевидно. Допустим утверждение справедливо при $n = k$. Из цепочки равенств

$$(k+1)d = kd + d = dk + d = d(k+1)$$

следует очевидность утверждения при $n = k+1$. $\square$

Теорема 8.1.6. Пусть D - кольцо характеристики 0. Тогда кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ является подкольцом центра $Z(D)$ кольца D .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теоремы 8.1.5. $\square$

Пусть D - тело. Если D имеет характеристику 0, D содержит в качестве подполя изоморфный образ поля $\mathbb{Q}$ рациональных чисел. Если D имеет характеристику p , D содержит в качестве подполя изоморфный образ F_p . В обоих случаях это подполе будет называться простым полем. Так как простое поле является наименьшим подполем в D , содержащим 1 и не имеющим автоморфизмов, кроме тождественного, его обычно отождествляют с $\mathbb{Q}$ или F_p , в зависимости от того, какой случай имеет место.

Теорема 8.1.7. Пусть D - тело характеристики 0 и пусть $d \in D$. Тогда для любого целого числа $n \in \mathbb{Z}$

$$(8.1.3) \quad n^{-1}d = dn^{-1}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 8.1.5 справедлива цепочка равенств

$$(8.1.4) \quad n^{-1}dn = nn^{-1}d = d$$

Умножив правую и левую части равенства (8.1.4) на n^{-1} , получим

$$(8.1.5) \quad n^{-1}d = n^{-1}dnn^{-1} = dn^{-1}$$

Из (8.1.5) следует (8.1.3). $\square$

Теорема 8.1.8. Пусть D - тело характеристики 0 и пусть $d \in D$. Тогда любое рациональное число $p \in \mathbb{Q}$ коммутирует с d .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы можем представить рациональное число $p \in \mathbb{Q}$ в виде $p = mn^{-1}$, $m, n \in \mathbb{Z}$. Утверждение теоремы следует из цепочки равенств

$$pd = mn^{-1}d = n^{-1}dm = dmn^{-1} = dp$$

основанной на утверждении теоремы 8.1.5 и равенстве (8.1.3). $\square$

Теорема 8.1.9. Пусть D - тело характеристики 0. Тогда поле рациональных чисел $\mathbb{Q}$ является подполем центра $Z(D)$ тела D .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие теоремы 8.1.8. $\square$

8.2. Геометрия тела над полем

Мы можем рассматривать тело D как векторное пространство над полем $F \subset Z(D)$. При этом мы будем пользоваться следующими соглашениями.

- (1) Мы не будем для элемента тела D пользоваться стандартными обозначениями для вектора, если мы будем рассматривать этот элемент как вектор над полем F . Однако мы будем пользоваться другим цветом для индекса при записи координат элемента тела D как вектора над полем F .
- (2) Так как F - поле, то мы можем писать все индексы справа от корневой буквы.

Пусть $\bar{e}$ - базис тела D над полем F . Тогда произвольный элемент $a \in D$ можно представить в виде

$$(8.2.1) \quad a = \bar{e}_i a^i \quad a^i \in F$$

Если размерность тела D над полем F бесконечна, то базис может быть либо счётным, либо его мощность может быть не меньше, чем мощность континуума. Если базис счётный, то на коэффициенты a^i разложения (8.2.1) накладываются определённые ограничения. Если мощность множества I континуум, то предполагается, что на множестве I определена мера и сумма в разложении (8.2.1) является интегралом по этой мере.

Замечание 8.2.1. Поскольку в теле D определена операция произведения, то мы можем рассматривать тело как алгебру над полем $F \subset Z(D)$. Для элементов базиса мы положим

$$(8.2.2) \quad \bar{e}_i \bar{e}_j = \bar{e}_k B_{ij}^k$$

Коэффициенты B_{ij}^k разложения (8.2.2) называются **структурными константами тела D над полем F** .

Из равенств (8.2.1), (8.2.2) следует

$$(8.2.3) \quad ab = \bar{e}_k B_{ij}^k a^i b^j$$

Из равенства (8.2.3) следует

$$(8.2.4) \quad (ab)c = \bar{e}_k B_{ij}^k (ab)^i c^j = \bar{e}_k B_{ij}^k B_{mn}^i a^m b^n c^j$$

$$(8.2.5) \quad a(bc) = \bar{e}_k B_{ij}^k a^i (bc)^j = \bar{e}_k B_{ij}^k a^i B_{mn}^j b^m c^n$$

Из ассоциативности произведения

$$(ab)c = a(bc)$$

и равенств (8.2.4) и (8.2.5) следует

$$(8.2.6) \quad \bar{e}_k B_{ij}^k B_{mn}^i a^m b^n c^j = \bar{e}_k B_{ij}^k a^i B_{mn}^j b^m c^n$$

Так как векторы a, b, c произвольны, а векторы $\bar{e}_k$ линейно независимы, то из равенства (8.2.6) следует

$$(8.2.7) \quad B_{jn}^k B_{im}^j = B_{ij}^k B_{mn}^j$$

Теорема 8.2.2. Координаты a^j вектора a являются тензором

$$(8.2.8) \quad a^j = A_i^j a^i$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\bar{e}'$ - другой базис. Пусть

$$(8.2.9) \quad \bar{e}'_i = \bar{e}_j A^j_i$$

преобразование, отображающее базис $\bar{e}$ в базис $\bar{e}'$. Так как вектор a не меняется, то

$$(8.2.10) \quad a = \bar{e}'_i a'^i = \bar{e}_j a^j$$

Из равенств (8.2.9) и (8.2.10) следует

$$(8.2.11) \quad \bar{e}_j a^j = \bar{e}'_i a'^i = \bar{e}_j A^j_i a'^i$$

Так как векторы $\bar{e}_j$ линейно независимы, то равенство (8.2.8) следует из равенства (8.2.11). Следовательно, компоненты вектора являются тензором. $\square$

Теорема 8.2.3. Структурные константы тела D над полем F являются тензором

$$(8.2.12) \quad A^l_k B'^k_{ij} A^{-1 \cdot i}_n A^{-1 \cdot j}_m = B^l_{nm}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим аналогичным образом преобразование произведения. Равенство (8.2.3) в базисе $\bar{e}'$ имеет вид

$$(8.2.13) \quad ab = \bar{e}'_k B'^k_{ij} a'^i b'^j$$

Подставив (8.2.8) и (8.2.9) в (8.2.13), получим

$$(8.2.14) \quad ab = \bar{e}_l A^l_k B'^k_{ij} a^n A^{-1 \cdot i}_n b^m A^{-1 \cdot j}_m$$

Из (8.2.3) и (8.2.14) следует

$$(8.2.15) \quad \bar{e}_l A^l_k B'^k_{ij} A^{-1 \cdot i}_n a^n A^{-1 \cdot j}_m b^m = \bar{e}_l B^l_{nm} a^n b^m$$

Так как векторы a и b произвольны, а векторы $\bar{e}_l$ линейно независимы, то равенство (8.2.12) следует из равенства (8.2.15). Следовательно, структурные константы являются тензором. $\square$

Линейное отображение тела

9.1. Линейное отображение тела

Согласно замечанию 8.2.1, мы рассматриваем тело D как алгебру над полем $F \subset Z(D)$.

Определение 9.1.1. Пусть D_1, D_2 - тела. Пусть F - поле такое, что $F \subset Z(D_1), F \subset Z(D_2)$. Линейное отображение

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

F -векторного пространства D_1 в F -векторное пространство D_2 называется **линейным отображением тела D_1 в тело D_2** . $\square$

Согласно определению 9.1.1, линейное отображение f тела D_1 в тело D_2 удовлетворяет свойству

$$\begin{aligned} f(a+b) &= f(a) + f(b) & a, b \in D \\ f(pa) &= pf(a) & p \in F \end{aligned}$$

Теорема 9.1.2. Пусть отображение

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

является линейным отображением тела D_1 характеристики 0 в тело D_2 характеристики 0. Тогда^{9.1}

$$f(nx) = nf(x)$$

для любого целого n .

Доказательство. Мы докажем теорему индукцией по n . При $n = 1$ утверждение очевидно, так как

$$f(1x) = f(x) = 1f(x)$$

Допустим уравнение справедливо при $n = k$. Тогда

$$f((k+1)x) = f(kx+x) = f(kx) + f(x) = kf(x) + f(x) = (k+1)f(x)$$

$\square$

^{9.1}Допустим

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

является линейным отображением тела D_1 характеристики 2 в тело D_2 характеристики 3. Тогда для любого $a \in D_1$, $2a = 0$, хотя $2f(a) \neq 0$. Следовательно, если мы предположим, что характеристика тела D_1 больше 0, то мы должны потребовать, чтобы характеристика тела D_1 равнялась характеристике тела D_2 .

Теорема 9.1.3. Пусть отображение

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

является линейным отображением тела D_1 характеристики 0 в тело D_2 характеристики 0. Тогда

$$f(ax) = af(x)$$

для любого рационального a .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Запишем a в виде $a = \frac{p}{q}$. Положим $y = \frac{1}{q}x$. Тогда согласно теореме 9.1.2

$$(9.1.1) \quad f(x) = f(qy) = qf(y) = qf\left(\frac{1}{q}x\right)$$

Из равенства (9.1.1) следует

$$(9.1.2) \quad \frac{1}{q}f(x) = f\left(\frac{1}{q}x\right)$$

Из равенства (9.1.2) следует

$$f\left(\frac{p}{q}x\right) = pf\left(\frac{1}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x)$$

□

Мы не можем распространить утверждение теоремы 9.1.3 на произвольное подполе центра $Z(D)$ тела D .

Теорема 9.1.4. Пусть тело D является алгеброй над полем $F \subset Z(D)$. Если $F \neq Z(D)$, то существует линейное отображение

$$f : D \rightarrow D$$

которое нелинейно над полем $Z(D)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для доказательства теоремы достаточно рассмотреть поле комплексных чисел C так как $C = Z(C)$. Так как поле комплексных чисел является алгеброй над полем вещественных чисел, то функция

$$z \rightarrow \bar{z}$$

линейна. Однако равенство

$$\overline{az} = a\bar{z}$$

неверно. □

Из теоремы 9.1.4 возникает вопрос. Для чего мы рассматриваем линейные отображения над полем $F \neq Z(D)$, если это приводит к резкому расширению множества линейных отображений? Ответом на этот вопрос служит богатый опыт теории функции комплексного переменного.

Теорема 9.1.5. Пусть отображения

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

$$g : D_1 \rightarrow D_2$$

являются линейными отображениями тела D_1 в тело D_2 . Тогда отображение $f + g$ также является линейным.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы следует из цепочки равенств

$$\begin{aligned}(f + g)(x + y) &= f(x + y) + g(x + y) = f(x) + f(y) + g(x) + g(y) \\ &= (f + g)(x) + (f + g)(y) \\ (f + g)(px) &= f(px) + g(px) = pf(x) + pg(x) = p(f(x) + g(x)) \\ &= p(f + g)(x)\end{aligned}$$

□

Теорема 9.1.6. Пусть отображение

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

является линейным отображением тела D_1 в тело D_2 . Тогда отображения af , fb , a , $b \in R_2$, также являются линейными.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы следует из цепочки равенств

$$\begin{aligned}(af)(x + y) &= a(f(x + y)) = a(f(x) + f(y)) = af(x) + af(y) \\ &= (af)(x) + (af)(y) \\ (af)(px) &= a(f(px)) = a(pf(x)) = p(af(x)) \\ &= p(af)(x) \\ (fb)(x + y) &= (f(x + y))b = (f(x) + f(y))b = f(x)b + f(y)b \\ &= (fb)(x) + (fb)(y) \\ (fb)(px) &= (f(px))b = (pf(x))b = p(f(x)b) \\ &= p(fb)(x)\end{aligned}$$

□

Определение 9.1.7. Обозначим $\mathcal{L}(D_1; D_2)$ множество линейных отображений

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

тела D_1 в тело D_2 .

□

Теорема 9.1.8. Мы можем представить линейное отображение

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

тела D_1 в тело D_2 в виде

$$(9.1.3) \quad f(x) = f_{k \cdot s_k \cdot 0} G_k(x) f_{k \cdot s_k \cdot 1}$$

где $(G_k, k \in K)$ - множество аддитивных отображений тела D_1 в тело D_2 .^{9.2} Выражение $f_{k \cdot s_k \cdot p}$, $p = 0, 1$, в равенстве (9.1.3) называется **компонентой линейного отображения** f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение теоремы следует из теорем 9.1.5 и 9.1.6.

□

^{9.2}Здесь и в дальнейшем мы будем предполагать сумму по индексу, который встречается в произведении несколько раз. Равенство (9.1.3) является рекурсивным определением и есть надежда, что мы можем его упростить.

Если в теореме 9.1.8 $|K| = 1$, то равенство (9.1.3) имеет вид

$$(9.1.4) \quad f(x) = f_{s \cdot 0} G(x) f_{s \cdot 1}$$

и отображение f называется **линейным отображением, порождённым отображением G** . Отображение G мы будем называть **образующей линейного отображения**.

Теорема 9.1.9. Пусть D_1, D_2 - тела характеристики 0. Пусть $F, F \subset Z(D_1), F \subset Z(D_2)$, - поле. Пусть G - F -линейное отображение. Пусть $\bar{e}$ - базис тела D_2 над полем F . **Стандартное F -представление линейного отображения (9.1.4) имеет вид^{9.3}**

$$(9.1.5) \quad f(x) = f_G^{ij} \bar{e}_i G(x) \bar{e}_j$$

Выражение f_G^{ij} в равенстве (9.1.5) называется **стандартной F -компонентой линейного отображения f** .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Компоненты аддитивного отображения f имеют разложение

$$(9.1.6) \quad f_{s \cdot p} = f_{s \cdot p}^i \bar{e}_i$$

относительно базиса $\bar{e}$. Если мы подставим (9.1.6) в (9.1.4), мы получим

$$(9.1.7) \quad f(x) = f_{s \cdot 0}^i \bar{e}_i G(x) f_{s \cdot 1}^j \bar{e}_j$$

Подставив в равенство (9.1.7) выражение

$$f_G^{ij} = f_{s \cdot 0}^i f_{s \cdot 1}^j$$

мы получим равенство (9.1.5). $\square$

Теорема 9.1.10. Пусть D_1, D_2 - тела характеристики 0. Пусть $F, F \subset Z(D_1), F \subset Z(D_2)$, - поле. Пусть G - F -линейное отображение. Пусть $\bar{e}_1$ - базис тела D_1 над полем F . Пусть $\bar{e}_2$ - базис тела D_2 над полем F . Пусть $B_{2 \cdot kl}^p$ - структурные константы тела D_2 . Тогда линейное отображение (9.1.4), порождённое F -линейным отображением G , можно записать в виде

$$(9.1.8) \quad \begin{aligned} f(a) &= \bar{e}_{2 \cdot j} f_i^j a^i & f_k^j &\in F \\ a &= \bar{e}_{1 \cdot i} a^i & a^i &\in F \quad a \in D_1 \end{aligned}$$

$$(9.1.9) \quad f_i^j = G_i^l f_G^{kr} B_{2 \cdot kl}^p B_{1 \cdot pr}^j$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем отображение

$$(9.1.10) \quad \begin{aligned} G : D_1 \rightarrow D_2 \quad a = \bar{e}_{1 \cdot i} a^i \rightarrow G(a) &= \bar{e}_{2 \cdot j} G_i^j a^i \\ x^i &\in F \quad G_i^j \in F \end{aligned}$$

Согласно теореме 4.4.3 линейное отображение $f(a)$ относительно базисов $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$ принимает вид (9.1.8). Из равенств (9.1.5) и (9.1.10) следует

$$(9.1.11) \quad f(a) = G_i^l a^i f_G^{kj} \bar{e}_{2 \cdot k} \bar{e}_{2 \cdot l} \bar{e}_{2 \cdot j}$$

^{9.3}Представление линейного отображения тела с помощью компонент линейного отображения неоднозначно. Чисто алгебраическими методами мы можем увеличить либо уменьшить число слагаемых. Если размерность тела D_2 над полем F конечна, то стандартное представление линейного отображения гарантирует конечность множества слагаемых в представлении отображения.

Из равенств (9.1.8) и (9.1.11) следует

$$(9.1.12) \quad \bar{e}_{2 \cdot j} f_i^j a^i = G_i^l a^i f_G^{kr} \bar{e}_{2 \cdot k} \bar{e}_{2 \cdot l} \bar{e}_{2 \cdot r} = G_i^l a^i f_G^{kr} B_{2 \cdot kl}^p B_{2 \cdot pr}^j \bar{e}_{2 \cdot j}$$

Так как векторы $\bar{e}_{2 \cdot r}$ линейно независимы над полем F и величины a^k произвольны, то из равенства (9.1.12) следует равенство (9.1.9). $\square$

При рассмотрении отображений

$$(9.1.13) \quad f : D \rightarrow D$$

мы будем полагать $G(x) = x$.

Теорема 9.1.11. Пусть D является телом характеристики 0. Линейное отображение (9.1.13) имеет вид

$$(9.1.14) \quad f(x) = f_{s \cdot 0} x f_{s \cdot 1}$$

Теорема 9.1.12. Пусть D - тело характеристики 0. Пусть $\bar{e}$ - базис тела D над центром $Z(D)$. Стандартное представление линейного отображения (9.1.14) тела имеет вид

$$(9.1.15) \quad f(x) = f^{ij} \bar{e}_i x \bar{e}_j$$

Теорема 9.1.13. Пусть D является телом характеристики 0. Пусть $\bar{e}$ - базис тела D над полем $Z(D)$. Тогда линейное отображение (9.1.13) можно записать в виде

$$(9.1.16) \quad \begin{aligned} f(a) &= \bar{e}_j f_i^j a^i & f_k^j &\in Z(D) \\ a &= \bar{e}_i a^i & a^i &\in F \quad a \in D \end{aligned}$$

$$(9.1.17) \quad f_i^j = f^{kr} B_{ki}^p B_{pr}^j$$

Теорема 9.1.14. Рассмотрим матрицу

$$(9.1.18) \quad \mathcal{B} = \left(\mathcal{B}_{i \cdot kr}^j \right) = \left(B_{ki}^p B_{pr}^j \right)$$

строки которой пронумерованы индексом $\cdot j$ и столбцы пронумерованы индексом $\cdot kr$. Если $\det \mathcal{B} \neq 0$, то для заданных координат линейного преобразования f_i^j система линейных уравнений (9.1.17) относительно стандартных компонент этого преобразования f^{kr} имеет единственное решение. Если $\det \mathcal{B} = 0$, то условием существования решения системы линейных уравнений (9.1.17) является равенство

$$(9.1.19) \quad \text{rank} \left(\mathcal{B}_{i \cdot kr}^j \quad f_i^j \right) = \text{rank } \mathcal{B}$$

В этом случае система линейных уравнений (9.1.17) имеет бесконечно много решений и существует линейная зависимость между величинами f_i^j .

Доказательство. Равенство (9.1.14) является частным случаем равенства (9.1.4) при условии $G(x) = x$. Теорема 9.1.12 является частным случаем теоремы 9.1.9 при условии $G(x) = x$. Теорема 9.1.13 является частным случаем теоремы 9.1.10 при условии $G(x) = x$. Утверждение теоремы 9.1.14 является следствием теории линейных уравнений над полем. $\square$

Теорема 9.1.15. Стандартные компоненты тождественного отображения имеют вид

$$(9.1.20) \quad f^{kr} = \delta_0^k \delta_0^r$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (9.1.20) является следствием равенства

$$x = \bar{e}_0 \text{ и } \bar{e}_0$$

Убедимся, что стандартные компоненты (9.1.20) линейного преобразования удовлетворяют уравнению

$$(9.1.21) \quad \delta_i^j = f^{kr} B_{ki}^p B_{pr}^j$$

которое следует из уравнения (9.1.17) если $f = \delta$. Из равенств (9.1.20), (9.1.21) следует

$$(9.1.22) \quad \delta_i^j = B_{0i}^p B_{p0}^j$$

Равенство (9.1.22) верно, так как из равенств

$$\bar{e}_j \bar{e}_0 = \bar{e}_0 \bar{e}_j = \bar{e}_j$$

следует

$$B_{0r}^j = \delta_r^j \quad B_{r0}^j = \delta_r^j$$

Если $\det \mathcal{B} \neq 0$, то решение (9.1.20) единственно. Если $\det \mathcal{B} = 0$, то система линейных уравнений (9.1.21) имеет бесконечно много решений. Однако нас интересует по крайней мере одно. $\square$

Теорема 9.1.16. Если $\det \mathcal{B} \neq 0$, то стандартные компоненты нулевого отображения

$$z : A \rightarrow A \quad z(x) = 0$$

определены однозначно и имеют вид $z^{ij} = 0$. Если $\det \mathcal{B} = 0$, то множество стандартных компонент нулевого отображения порождает векторное пространство.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорема верна, поскольку стандартные компоненты z^{ij} являются решением однородной системы линейных уравнений

$$0 = z^{kr} B_{ki}^p B_{pr}^j$$

$\square$

Замечание 9.1.17. Рассмотрим равенство

$$(9.1.23) \quad a^{kr} \bar{e}_k \text{ и } \bar{e}_r = b^{kr} \bar{e}_k \text{ и } \bar{e}_r$$

Из теоремы 9.1.16 следует, что только при условии $\det \mathcal{B} \neq 0$ из равенства (9.1.23) следует

$$(9.1.24) \quad a^{kr} = b^{kr}$$

В противном случае мы должны предполагать равенство

$$(9.1.25) \quad a^{kr} = b^{kr} + z^{kr}$$

Несмотря на это, мы и в случае $\det \mathcal{B} = 0$ будем пользоваться стандартным представлением так как в общем случае указать множество линейно независимых векторов - задача достаточно сложная. Если мы хотим определить операцию над линейными отображениями, записанными в стандартном представлении, то также как в случае теоремы 9.1.15 мы будем выбирать представитель из множества возможных представлений. $\square$

Теорема 9.1.18. *Выражение*

$$f_k^r = f^{ij} B_{ik}^p B_{pj}^r$$

является тензором над полем F

$$(9.1.26) \quad f_i^j = A_i^k f_k^l A^{-1 \cdot j}_l$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. D -линейное отображение относительно базиса $\bar{e}$ имеет вид (9.1.16). Пусть $\bar{e}'$ - другой базис. Пусть

$$(9.1.27) \quad \bar{e}'_i = \bar{e}_j A_i^j$$

преобразование, отображающее базис $\bar{e}$ в базис $\bar{e}'$. Так как линейное отображение f не меняется, то

$$(9.1.28) \quad f(x) = \bar{e}'_i f'^l_i x'^k$$

Подставим (8.2.8), (9.1.27) в равенство (9.1.28)

$$(9.1.29) \quad f(x) = \bar{e}_j A_i^j f'^l_i A^{-1 \cdot k}_i x^i$$

Так как векторы $\bar{e}_j$ линейно независимы и компоненты вектора x^i произвольны, то равенство (9.1.26) следует из равенства (9.1.29). Следовательно, выражение f_k^r является тензором над полем F . $\square$

Определение 9.1.19. Множество

$$\ker f = \{x \in D_1 : f(x) = 0\}$$

называется **ядром линейного отображения**

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

тела D_1 в тело D_2 . $\square$

Теорема 9.1.20. *Ядро линейного отображения*

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

является подгруппой аддитивной группы тела D_1 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $a, b \in \ker f$. Тогда

$$f(a) = 0$$

$$f(b) = 0$$

$$f(a + b) = f(a) + f(b) = 0$$

Следовательно, $a + b \in \ker f$. $\square$

Определение 9.1.21. Линейное отображение

$$f : D_1 \rightarrow D_2$$

тела D_1 в тело D_2 называется **вырожденным**, если

$$\ker f \neq \{0\}$$

$\square$

Теорема 9.1.22. Пусть D - тело характеристики 0. Пусть $\bar{e}$ - базис тела D над центром $Z(D)$ тела D . Пусть

$$(9.1.30) \quad f : D \rightarrow D \quad f(x) = f_{s \cdot 0} x f_{s \cdot 1}$$

$$(9.1.31) \quad = f^{ij} \bar{e}_i x \bar{e}_j$$

$$(9.1.32) \quad g : D \rightarrow D \quad g(x) = g_{t \cdot 0} x g_{t \cdot 1}$$

$$(9.1.33) \quad = g^{ij} \bar{e}_i x \bar{e}_j$$

линейные отображения тела D . Отображение

$$(9.1.34) \quad h(x) = gf(x) = g(f(x))$$

является линейным отображением

$$(9.1.35) \quad h(x) = h_{ts \cdot 0} x h_{ts \cdot 1}$$

$$(9.1.36) \quad = h^{pr} \bar{e}_p x \bar{e}_r$$

где

$$(9.1.37) \quad h_{ts \cdot 0} = g_{t \cdot 0} f_{s \cdot 0}$$

$$(9.1.38) \quad h_{ts \cdot 1} = f_{s \cdot 1} g_{t \cdot 1}$$

$$(9.1.39) \quad h^{pr} = g^{ij} f^{kl} B_{ik}^p B_{lj}^r$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отображение (9.1.34) линейно так как

$$h(x + y) = g(f(x + y)) = g(f(x) + f(y)) = g(f(x)) + g(f(y)) = h(x) + h(y)$$

$$h(ax) = g(f(ax)) = g(af(x)) = ag(f(x)) = ah(x)$$

Если мы подставим (9.1.30) и (9.1.32) в (9.1.34), то мы получим

$$(9.1.40) \quad h(x) = g_{t \cdot 0} f(x) g_{t \cdot 1} = g_{t \cdot 0} f_{s \cdot 0} x f_{s \cdot 1} g_{t \cdot 1}$$

Сравнивая (9.1.40) и (9.1.35), мы получим (9.1.37), (9.1.38).

Если мы подставим (9.1.31) и (9.1.33) в (9.1.34), то мы получим

$$(9.1.41) \quad \begin{aligned} h(x) &= g^{ij} \bar{e}_i f(x) \bar{e}_j \\ &= g^{ij} \bar{e}_i f^{kl} \bar{e}_k x \bar{e}_l \bar{e}_j \\ &= g^{ij} f^{kl} B_{ik}^p B_{lj}^r \bar{e}_p x \bar{e}_r \end{aligned}$$

Сравнивая (9.1.41) и (9.1.36), мы получим (9.1.39). $\square$

9.2. Полилинейное отображение тела

Определение 9.2.1. Пусть $R_1, \dots, R_n, P$ - кольца характеристики 0. Пусть S - модуль над кольцом P . Пусть F - коммутативное кольцо, которое для любого i является подкольцом центра кольца R_i . Отображение

$$f : R_1 \times \dots \times R_n \rightarrow S$$

называется **полилинейным над коммутативным кольцом F** , если

$$f(p_1, \dots, p_i + q_i, \dots, p_n) = f(p_1, \dots, p_i, \dots, p_n) + f(p_1, \dots, q_i, \dots, p_n)$$

$$f(a_1, \dots, ba_i, \dots, a_n) = bf(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

для любого i , $1 \leq i \leq n$, и любых $p_i, q_i \in R_i$, $b \in F$. Обозначим $\mathcal{L}(R_1, \dots, R_n; S)$ множество полилинейных отображений колец $R_1, \dots, R_n$ в модуль S . $\square$

Теорема 9.2.2. Пусть D - тело характеристики 0. Полилинейное отображение

$$(9.2.1) \quad f : D^n \rightarrow D, d = f(d_1, \dots, d_n)$$

имеет вид

$$(9.2.2) \quad d = f_{s \cdot 0}^n \sigma_s(d_1) f_{s \cdot 1}^n \dots \sigma_s(d_n) f_{s \cdot n}^n$$

σ_s - перестановка множества переменных $\{d_1, \dots, d_n\}$

$$\sigma_s = \begin{pmatrix} d_1 & \dots & d_n \\ \sigma_s(d_1) & \dots & \sigma_s(d_n) \end{pmatrix}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем утверждение индукцией по n .

При $n = 1$ доказываемое утверждение является следствием теоремы 9.1.11.

При этом мы можем отождествить^{9.4}

$$f_{s \cdot p}^1 = f_{s \cdot p} \quad p = 0, 1$$

Допустим, что утверждение теоремы справедливо при $n = k - 1$. Тогда отображение (9.2.1) можно представить в виде

$$\begin{array}{ccc} D^k & \xrightarrow{f} & D \\ & \searrow g(d_k) & \uparrow h \\ & & D^{k-1} \end{array}$$

$$d = f(d_1, \dots, d_k) = g(d_k)(d_1, \dots, d_{k-1})$$

Согласно предположению индукции полилинейное отображение h имеет вид

$$d = h_{t \cdot 0}^{k-1} \sigma_t(d_1) h_{t \cdot 1}^{k-1} \dots \sigma_t(d_{k-1}) h_{t \cdot k-1}^{k-1}$$

Согласно построению $h = g(d_k)$. Следовательно, выражения $h_{t \cdot p}$ являются функциями d_k . Поскольку $g(d_k)$ - линейная функция d_k , то только одно выражение $h_{t \cdot p}$ является линейной функцией переменной d_k , и остальные выражения $h_{t \cdot q}$ не зависят от d_k .

Не нарушая общности, положим $p = 0$. Согласно равенству (9.1.14) для заданного t

$$h_{t \cdot 0}^{k-1} = g_{tr \cdot 0} d_k g_{tr \cdot 1}$$

Положим $s = tr$ и определим перестановку σ_s согласно правилу

$$\sigma_s = \sigma_{tr} = \begin{pmatrix} d_k & d_1 & \dots & d_{k-1} \\ d_k & \sigma_t(d_1) & \dots & \sigma_t(d_{k-1}) \end{pmatrix}$$

^{9.4}В представлении (9.2.2) мы будем пользоваться следующими правилами.

- Если область значений какого-либо индекса - это множество, состоящее из одного элемента, мы будем опускать соответствующий индекс.
- Если $n = 1$, то σ_s - тождественное преобразование. Это преобразование можно не указывать в выражении.

Положим

$$\begin{aligned} f_{tr \cdot q+1}^k &= h_{t \cdot q}^{k-1} & q &= 1, \dots, k-1 \\ f_{tr \cdot q}^k &= g_{tr \cdot q} & q &= 0, 1 \end{aligned}$$

Мы доказали шаг индукции. $\square$

Определение 9.2.3. Выражение $_{s \cdot p} f^n$ в равенстве (9.2.2) называется **компонентой полилинейного отображения** f . $\square$

Теорема 9.2.4. Пусть D - тело характеристики 0. Допустим $\bar{e}$ - базис тела D над полем $F \subset Z(D)$. **Стандартное представление полилинейного отображения тела** имеет вид

$$(9.2.3) \quad f(d_1, \dots, d_n) = f_t^{i_0 \dots i_n} \bar{e}_{i_0} \sigma_t(d_1) \bar{e}_{i_1} \dots \sigma_t(d_n) \bar{e}_{i_n}$$

Индекс t нумерует всевозможные перестановки σ_t множества переменных $\{d_1, \dots, d_n\}$. Выражение $f_t^{i_0 \dots i_n}$ в равенстве (9.2.3) называется **стандартной компонентой полилинейного отображения** f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Компоненты полилинейного отображения f имеют разложение

$$(9.2.4) \quad f_{s \cdot p}^n = \bar{e}_i f_{s \cdot p}^{ni}$$

относительно базиса $\bar{e}$. Если мы подставим (9.2.4) в (9.2.2), мы получим

$$(9.2.5) \quad d = f_{s \cdot 0}^{nj_1} \bar{e}_{j_1} \sigma_s(d_1) f_{s \cdot 1}^{nj_2} \bar{e}_{j_2} \dots \sigma_s(d_n) f_{s \cdot n}^{nj_n} \bar{e}_{j_n}$$

Рассмотрим выражение

$$(9.2.6) \quad f_t^{j_0 \dots j_n} = f_{s \cdot 0}^{nj_1} \dots f_{s \cdot n}^{nj_n}$$

В правой части подразумевается сумма тех слагаемых с индексом s , для которых перестановка σ_s совпадает. Каждая такая сумма будет иметь уникальный индекс t . Подставив в равенство (9.2.5) выражение (9.2.6) мы получим равенство (9.2.3). $\square$

Теорема 9.2.5. Пусть $\bar{e}$ - базис тела D над полем $F \subset Z(D)$. Полилинейное отображение (9.2.1) можно представить в виде D -значной формы степени n над полем $F \subset Z(D)$ ^{9.5}

$$(9.2.7) \quad f(a_1, \dots, a_n) = a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} f_{i_1 \dots i_n}$$

где

$$(9.2.8) \quad \begin{aligned} a_j &= \bar{e}_i a_j^i \\ f_{i_1 \dots i_n} &= f(\bar{e}_{i_1}, \dots, \bar{e}_{i_n}) \end{aligned}$$

и величины $f_{i_1 \dots i_n}$ являются координатами D -значного ковариантного тензора над полем F .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно определению 9.2.1 равенство (9.2.7) следует из цепочки равенств

$$f(a_1, \dots, a_n) = f(\bar{e}_{i_1} a_1^{i_1}, \dots, \bar{e}_{i_n} a_n^{i_n}) = a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} f(\bar{e}_{i_1}, \dots, \bar{e}_{i_n})$$

Пусть $\bar{e}'$ - другой базис. Пусть

$$(9.2.9) \quad \bar{e}'_i = \bar{e}_j A_i^j$$

^{9.5}Теорема доказана по аналогии с теоремой в [3], с. 107, 108

преобразование, отображающее базис $\bar{e}$ в базис $\bar{e}'$. Из равенств (9.2.9) и (9.2.8) следует

$$\begin{aligned}
 f'_{i_1 \dots i_n} &= f(\bar{e}'_{i_1}, \dots, \bar{e}'_{i_n}) \\
 (9.2.10) \quad &= f(\bar{e}_{j_1} A_{i_1}^{j_1}, \dots, \bar{e}_{j_n} A_{i_n}^{j_n}) \\
 &= A_{i_1}^{j_1} \dots A_{i_n}^{j_n} f(\bar{e}_{j_1}, \dots, \bar{e}_{j_n}) \\
 &= A_{i_1}^{j_1} \dots A_{i_n}^{j_n} f_{j_1 \dots j_n}
 \end{aligned}$$

Из равенства (9.2.10) следует тензорный закон преобразования координат полилинейного отображения. Из равенства (9.2.10) и теоремы 8.2.2 следует, что значение отображения $f(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$ не зависит от выбора базиса. $\square$

Полилинейное отображение (9.2.1) **симметрично**, если

$$f(d_1, \dots, d_n) = f(\sigma(d_1), \dots, \sigma(d_n))$$

для любой перестановки σ множества $\{d_1, \dots, d_n\}$.

Теорема 9.2.6. Если полилинейное отображение f симметрично, то

$$(9.2.11) \quad f_{i_1, \dots, i_n} = f_{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_n)}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (9.2.11) следует из равенства

$$\begin{aligned}
 a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} f_{i_1 \dots i_n} &= f(a_1, \dots, a_n) \\
 &= f(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)) \\
 &= a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} f_{\sigma(i_1) \dots \sigma(i_n)}
 \end{aligned}$$

$\square$

Полилинейное отображение (9.2.1) **косо симметрично**, если

$$f(d_1, \dots, d_n) = |\sigma| f(\sigma(d_1), \dots, \sigma(d_n))$$

для любой перестановки σ множества $\{d_1, \dots, d_n\}$. Здесь

$$|\sigma| = \begin{cases} 1 & \text{перестановка } \sigma \text{ чётная} \\ -1 & \text{перестановка } \sigma \text{ нечётная} \end{cases}$$

Теорема 9.2.7. Если полилинейное отображение f косо симметрично, то

$$(9.2.12) \quad f_{i_1, \dots, i_n} = |\sigma| f_{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_n)}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (9.2.12) следует из равенства

$$\begin{aligned}
 a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} f_{i_1 \dots i_n} &= f(a_1, \dots, a_n) \\
 &= |\sigma| f(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)) \\
 &= a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n} |\sigma| f_{\sigma(i_1) \dots \sigma(i_n)}
 \end{aligned}$$

$\square$

Теорема 9.2.8. Координаты полилинейного над полем F отображения (9.2.1) и его компоненты относительно базиса $\bar{e}$ удовлетворяют равенству

$$(9.2.13) \quad f_{j_1 \dots j_n} = f_t^{i_0 \dots i_n} B_{i_0 \sigma_t(j_1)}^{k_1} B_{k_1 i_1}^{l_1} \dots B_{l_{n-1} \sigma_t(j_n)}^{k_n} B_{k_n i_n}^{l_n} \bar{e}_{l_n}$$

$$(9.2.14) \quad f_{j_1 \dots j_n}^p = f_t^{i_0 \dots i_n} B_{i_0 \sigma_t(j_1)}^{k_1} B_{k_1 i_1}^{l_1} \dots B_{l_{n-1} \sigma_t(j_n)}^{k_n} B_{k_n i_n}^{l_n} B_{k_n i_n}^p$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В равенстве (9.2.3) положим

$$d_i = \bar{e}_{j_i} d_i^{j_i}$$

Тогда равенство (9.2.3) примет вид

$$\begin{aligned} f(d_1, \dots, d_n) &= f_t^{i_0 \dots i_n} \bar{e}_{i_0} \sigma_t(d_1^{j_1} \bar{e}_{j_1}) \bar{e}_{i_1} \dots \sigma_t(d_n^{j_n} \bar{e}_{j_n}) \bar{e}_{i_n} \\ &= d_1^{j_1} \dots d_n^{j_n} f_t^{i_0 \dots i_n} \bar{e}_{i_0} \sigma_t(\bar{e}_{j_1}) \bar{e}_{i_1} \dots \sigma_t(\bar{e}_{j_n}) \bar{e}_{i_n} \\ (9.2.15) \quad &= d_1^{j_1} \dots d_n^{j_n} f_t^{i_0 \dots i_n} B_{i_0 \sigma_t(j_1)}^{k_1} B_{k_1 i_1}^{l_1} \\ &\quad \dots B_{l_{n-1} \sigma_t(j_n)}^{k_n} B_{k_n i_n}^{l_n} \bar{e}_{l_n} \end{aligned}$$

Из равенства (9.2.7) следует

$$(9.2.16) \quad f(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) = \bar{e}_p f_{i_1 \dots i_n}^p a_1^{i_1} \dots a_n^{i_n}$$

Равенство (9.2.13) следует из сравнения равенств (9.2.15) и (9.2.7). Равенство (9.2.14) следует из сравнения равенств (9.2.15) и (9.2.16). $\square$

Алгебра кватернионов

10.1. Линейная функция комплексного поля

Теорема 10.1.1 (Уравнения Коши-Римана). *Рассмотрим поле комплексных чисел C как двумерную алгебру над полем действительных чисел. Положим*

$$(10.1.1) \quad \bar{e}_{C \cdot 0} = 1 \quad \bar{e}_{C \cdot 1} = i$$

базис алгебры C . Тогда в этом базисе произведение имеет вид

$$(10.1.2) \quad \bar{e}_{C \cdot 1}^2 = -\bar{e}_{C \cdot 0}$$

и структурные константы имеют вид

$$(10.1.3) \quad \begin{aligned} B_{C \cdot 00} &= 1 & B_{C \cdot 01} &= 1 \\ B_{C \cdot 10} &= 1 & B_{C \cdot 11} &= -1 \end{aligned}$$

Матрица линейной функции

$$y^i = x^j f_j^i$$

поля комплексных чисел над полем действительных чисел удовлетворяет соотношению

$$(10.1.4) \quad f_0^0 = f_1^1$$

$$(10.1.5) \quad f_0^1 = -f_1^0$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенства (10.1.2) и (10.1.3) следуют из равенства $i^2 = -1$. Пользуясь равенством (9.1.17) получаем соотношения

$$(10.1.6) \quad f_0^0 = f^{kr} B_{C \cdot k0} B_{C \cdot pr} = f^{0r} B_{C \cdot 00} B_{C \cdot 0r} + f^{1r} B_{C \cdot 10} B_{C \cdot 1r} = f^{00} - f^{11}$$

$$(10.1.7) \quad f_0^1 = f^{kr} B_{C \cdot k0} B_{C \cdot pr} = f^{0r} B_{C \cdot 00} B_{C \cdot 0r} + f^{1r} B_{C \cdot 10} B_{C \cdot 1r} = f^{01} + f^{10}$$

$$(10.1.8) \quad f_1^0 = f^{kr} B_{C \cdot k1} B_{C \cdot pr} = f^{0r} B_{C \cdot 01} B_{C \cdot 0r} + f^{1r} B_{C \cdot 11} B_{C \cdot 0r} = -f^{01} - f^{10}$$

$$(10.1.9) \quad f_1^1 = f^{kr} B_{C \cdot k1} B_{C \cdot pr} = f^{0r} B_{C \cdot 01} B_{C \cdot 1r} + f^{1r} B_{C \cdot 11} B_{C \cdot 0r} = f^{00} - f^{11}$$

Из равенств (10.1.6) и (10.1.9) следует (10.1.4). Из равенств (10.1.7) и (10.1.8) следует (10.1.5). $\square$

10.2. Алгебра кватернионов

В этой статье я рассматриваю множество кватернионных алгебр, определённых в [15].

Определение 10.2.1. Пусть F - поле. Расширение $F(i, j, k)$ поля F называется алгеброй $E(F, a, b)$ кватернионов над полем $F^{10.1}$, если произведение в алгебре E определено согласно правилам

$$(10.2.1) \quad \begin{array}{c|ccc} & i & j & k \\ \hline i & a & k & aj \\ j & -k & b & -bi \\ k & -aj & bi & -ab \end{array}$$

где $a, b \in F$, $ab \neq 0$.

Элементы алгебры $E(F, a, b)$ имеют вид

$$x = x^0 + x^1 i + x^2 j + x^3 k$$

где $x^i \in F$, $i = 0, 1, 2, 3$. Кватернион

$$\bar{x} = x^0 - x^1 i - x^2 j - x^3 k$$

называется сопряжённым кватерниону x . Мы определим норму кватерниона x равенством

$$(10.2.2) \quad |x|^2 = x\bar{x} = (x^0)^2 - a(x^1)^2 - b(x^2)^2 + ab(x^3)^2$$

Из равенства (10.2.2) следует, что $E(F, a, b)$ является алгеброй с делением только когда $a < 0$, $b < 0$. Тогда мы можем пронормировать базис так, что $a = -1$, $b = -1$.

Мы будем обозначать символом $E(F)$ алгебру $E(F, -1, -1)$ кватернионов с делением над полем F . Произведение в алгебре $E(F)$ определено согласно правилам

$$(10.2.3) \quad \begin{array}{c|ccc} & i & j & k \\ \hline i & -1 & k & -j \\ j & -k & -1 & i \\ k & j & -i & -1 \end{array}$$

□

В алгебре $E(F)$ норма кватерниона имеет вид

$$(10.2.4) \quad |x|^2 = x\bar{x} = (x^0)^2 + (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2$$

При этом обратный элемент имеет вид

$$(10.2.5) \quad x^{-1} = |x|^{-2} \bar{x}$$

Мы будем полагать $H = E(R, -1, -1)$.

Внутренний автоморфизм алгебры кватернионов $H^{10.2}$

$$(10.2.6) \quad \begin{aligned} p &\rightarrow qpq^{-1} \\ q(ix + jy + kz)q^{-1} &= ix' + jy' + kz' \end{aligned}$$

^{10.1}Я буду следовать определению из [15].

^{10.2}См. [16], с. 643.

описывает вращение вектора с координатами x, y, z . Если q записан в виде суммы скаляра и вектора

$$q = \cos \alpha + (ia + jb + kc) \sin \alpha \quad a^2 + b^2 + c^2 = 1$$

то (10.2.6) описывает вращение вектора (x, y, z) вокруг вектора (a, b, c) на угол 2α .

10.3. Линейная функция алгебры кватернионов

Теорема 10.3.1. *Положим*

$$(10.3.1) \quad \bar{e}_0 = 1 \quad \bar{e}_1 = i \quad \bar{e}_2 = j \quad \bar{e}_3 = k$$

базис алгебры кватернионов H . Тогда в базисе (10.3.1) структурные константы имеют вид

$$\begin{aligned} B_{00}^0 &= 1 & B_{01}^1 &= 1 & B_{02}^2 &= 1 & B_{03}^3 &= 1 \\ B_{10}^1 &= 1 & B_{11}^0 &= -1 & B_{12}^3 &= 1 & B_{13}^2 &= -1 \\ B_{20}^2 &= 1 & B_{21}^3 &= -1 & B_{22}^0 &= -1 & B_{23}^1 &= 1 \\ B_{30}^3 &= 1 & B_{31}^2 &= 1 & B_{32}^1 &= -1 & B_{33}^0 &= -1 \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Значение структурных констант следует из таблицы умножения (10.2.3). $\square$

Так как вычисления в этом разделе занимают много места, я собрал в одном месте ссылки на теоремы в этом разделе.

Теорема 10.3.2: определение координат линейного отображения алгебры кватернионов H через стандартные компоненты этого отображения.

Равенство (10.3.22): матричная форма зависимости координат линейного отображения алгебры кватернионов H от стандартных компонент этого отображения.

Равенство (10.3.23): матричная форма зависимости стандартных компонент линейного отображения алгебры кватернионов H от координат этого отображения.

Theorem 10.3.4: зависимость стандартных компонент линейного отображения алгебры кватернионов H от координат этого отображения.

Теорема 10.3.2. *Стандартные компоненты линейной функции алгебры кватернионов H относительно базиса (10.3.1) и координаты соответствующего линейного преобразования удовлетворяют соотношениям*

$$(10.3.2) \quad \left\{ \begin{aligned} f_0^0 &= f^{00} - f^{11} - f^{22} - f^{33} \\ f_1^1 &= f^{00} - f^{11} + f^{22} + f^{33} \\ f_2^2 &= f^{00} + f^{11} - f^{22} + f^{33} \\ f_3^3 &= f^{00} + f^{11} + f^{22} - f^{33} \end{aligned} \right.$$

$$(10.3.3) \quad \begin{cases} f_{\mathbf{0}}^{\mathbf{1}} = f^{\mathbf{01}} + f^{\mathbf{10}} + f^{\mathbf{23}} - f^{\mathbf{32}} \\ f_{\mathbf{1}}^{\mathbf{0}} = -f^{\mathbf{01}} - f^{\mathbf{10}} + f^{\mathbf{23}} - f^{\mathbf{32}} \\ f_{\mathbf{2}}^{\mathbf{3}} = -f^{\mathbf{01}} + f^{\mathbf{10}} - f^{\mathbf{23}} - f^{\mathbf{32}} \\ f_{\mathbf{3}}^{\mathbf{2}} = f^{\mathbf{01}} - f^{\mathbf{10}} - f^{\mathbf{23}} - f^{\mathbf{32}} \end{cases}$$

$$(10.3.4) \quad \begin{cases} f_{\mathbf{0}}^{\mathbf{2}} = f^{\mathbf{02}} - f^{\mathbf{13}} + f^{\mathbf{20}} + f^{\mathbf{31}} \\ f_{\mathbf{1}}^{\mathbf{3}} = f^{\mathbf{02}} - f^{\mathbf{13}} - f^{\mathbf{20}} - f^{\mathbf{31}} \\ f_{\mathbf{2}}^{\mathbf{0}} = -f^{\mathbf{02}} - f^{\mathbf{13}} - f^{\mathbf{20}} + f^{\mathbf{31}} \\ f_{\mathbf{3}}^{\mathbf{1}} = -f^{\mathbf{02}} - f^{\mathbf{13}} + f^{\mathbf{20}} - f^{\mathbf{31}} \end{cases}$$

$$(10.3.5) \quad \begin{cases} f_{\mathbf{0}}^{\mathbf{3}} = f^{\mathbf{03}} + f^{\mathbf{12}} - f^{\mathbf{21}} + f^{\mathbf{30}} \\ f_{\mathbf{1}}^{\mathbf{2}} = -f^{\mathbf{03}} - f^{\mathbf{12}} - f^{\mathbf{21}} + f^{\mathbf{30}} \\ f_{\mathbf{2}}^{\mathbf{1}} = f^{\mathbf{03}} - f^{\mathbf{12}} - f^{\mathbf{21}} - f^{\mathbf{30}} \\ f_{\mathbf{3}}^{\mathbf{0}} = -f^{\mathbf{03}} + f^{\mathbf{12}} - f^{\mathbf{21}} - f^{\mathbf{30}} \end{cases}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пользуясь равенством (9.1.17) получаем соотношения

$$(10.3.6) \quad \begin{aligned} f_{\mathbf{0}}^{\mathbf{0}} &= f^{kr} B_{k\mathbf{0}}^p B_{pr}^{\mathbf{0}} \\ &= f^{\mathbf{00}} B_{\mathbf{00}}^{\mathbf{0}} B_{\mathbf{00}}^{\mathbf{0}} + f^{\mathbf{11}} B_{\mathbf{10}}^{\mathbf{1}} B_{\mathbf{11}}^{\mathbf{0}} + f^{\mathbf{22}} B_{\mathbf{20}}^{\mathbf{2}} B_{\mathbf{22}}^{\mathbf{0}} + f^{\mathbf{33}} B_{\mathbf{30}}^{\mathbf{3}} B_{\mathbf{33}}^{\mathbf{0}} \\ &= f^{\mathbf{00}} - f^{\mathbf{11}} - f^{\mathbf{22}} - f^{\mathbf{33}} \end{aligned}$$

$$(10.3.7) \quad \begin{aligned} f_{\mathbf{0}}^{\mathbf{1}} &= f^{kr} B_{k\mathbf{0}}^p B_{pr}^{\mathbf{1}} \\ &= f^{\mathbf{01}} B_{\mathbf{00}}^{\mathbf{0}} B_{\mathbf{01}}^{\mathbf{1}} + f^{\mathbf{10}} B_{\mathbf{10}}^{\mathbf{1}} B_{\mathbf{10}}^{\mathbf{1}} + f^{\mathbf{23}} B_{\mathbf{20}}^{\mathbf{2}} B_{\mathbf{23}}^{\mathbf{1}} + f^{\mathbf{32}} B_{\mathbf{30}}^{\mathbf{3}} B_{\mathbf{32}}^{\mathbf{1}} \\ &= f^{\mathbf{01}} + f^{\mathbf{10}} + f^{\mathbf{23}} - f^{\mathbf{32}} \end{aligned}$$

$$(10.3.8) \quad \begin{aligned} f_{\mathbf{0}}^{\mathbf{2}} &= f^{kr} B_{k\mathbf{0}}^p B_{pr}^{\mathbf{2}} \\ &= f^{\mathbf{02}} B_{\mathbf{00}}^{\mathbf{0}} B_{\mathbf{02}}^{\mathbf{2}} + f^{\mathbf{13}} B_{\mathbf{10}}^{\mathbf{1}} B_{\mathbf{13}}^{\mathbf{2}} + f^{\mathbf{20}} B_{\mathbf{20}}^{\mathbf{2}} B_{\mathbf{20}}^{\mathbf{2}} + f^{\mathbf{31}} B_{\mathbf{30}}^{\mathbf{3}} B_{\mathbf{31}}^{\mathbf{2}} \\ &= f^{\mathbf{02}} - f^{\mathbf{13}} + f^{\mathbf{20}} + f^{\mathbf{31}} \end{aligned}$$

$$(10.3.9) \quad \begin{aligned} f_{\mathbf{0}}^{\mathbf{3}} &= f^{kr} B_{k\mathbf{0}}^p B_{pr}^{\mathbf{3}} \\ &= f^{\mathbf{03}} B_{\mathbf{00}}^{\mathbf{0}} B_{\mathbf{03}}^{\mathbf{3}} + f^{\mathbf{12}} B_{\mathbf{10}}^{\mathbf{1}} B_{\mathbf{12}}^{\mathbf{3}} + f^{\mathbf{21}} B_{\mathbf{20}}^{\mathbf{2}} B_{\mathbf{21}}^{\mathbf{3}} + f^{\mathbf{30}} B_{\mathbf{30}}^{\mathbf{3}} B_{\mathbf{30}}^{\mathbf{3}} \\ &= f^{\mathbf{03}} + f^{\mathbf{12}} - f^{\mathbf{21}} + f^{\mathbf{30}} \end{aligned}$$

$$(10.3.10) \quad \begin{aligned} f_{\mathbf{1}}^{\mathbf{0}} &= f^{kr} B_{k\mathbf{1}}^p B_{pr}^{\mathbf{0}} \\ &= f^{\mathbf{01}} B_{\mathbf{01}}^{\mathbf{1}} B_{\mathbf{11}}^{\mathbf{0}} + f^{\mathbf{10}} B_{\mathbf{11}}^{\mathbf{0}} B_{\mathbf{00}}^{\mathbf{0}} + f^{\mathbf{23}} B_{\mathbf{21}}^{\mathbf{3}} B_{\mathbf{33}}^{\mathbf{0}} + f^{\mathbf{32}} B_{\mathbf{31}}^{\mathbf{2}} B_{\mathbf{22}}^{\mathbf{0}} \\ &= -f^{\mathbf{01}} - f^{\mathbf{10}} + f^{\mathbf{23}} - f^{\mathbf{32}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.11) \quad f_1^1 &= f^{kr} B_{k1}^p B_{pr}^1 \\
&= f^{00} B_{01}^1 B_{10}^1 + f^{11} B_{11}^0 B_{01}^1 + f^{22} B_{21}^3 B_{32}^1 + f^{33} B_{31}^2 B_{23}^1 \\
&= f^{00} - f^{11} + f^{22} + f^{33}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.12) \quad f_1^2 &= f^{kr} B_{k1}^p B_{pr}^2 \\
&= f^{03} B_{01}^1 B_{13}^2 + f^{12} B_{11}^0 B_{02}^2 + f^{21} B_{21}^3 B_{31}^2 + f^{30} B_{31}^2 B_{20}^2 \\
&= -f^{03} - f^{12} - f^{21} + f^{30}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.13) \quad f_1^3 &= f^{kr} B_{k1}^p B_{pr}^3 \\
&= f^{02} B_{01}^1 B_{12}^3 + f^{13} B_{11}^0 B_{03}^3 + f^{20} B_{21}^3 B_{30}^3 + f^{31} B_{31}^2 B_{21}^3 \\
&= f^{02} - f^{13} - f^{20} - f^{31}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.14) \quad f_2^0 &= f^{kr} B_{k2}^p B_{pr}^0 \\
&= f^{02} B_{02}^2 B_{22}^0 + f^{13} B_{12}^3 B_{33}^0 + f^{20} B_{22}^0 B_{00}^0 + f^{31} B_{32}^1 B_{11}^0 \\
&= -f^{02} - f^{13} - f^{20} + f^{31}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.15) \quad f_2^1 &= f^{kr} B_{k2}^p B_{pr}^1 \\
&= f^{03} B_{02}^2 B_{23}^1 + f^{12} B_{12}^3 B_{32}^1 + f^{21} B_{22}^0 B_{01}^1 + f^{30} B_{32}^1 B_{10}^1 \\
&= f^{03} - f^{12} - f^{21} - f^{30}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.16) \quad f_2^2 &= f^{kr} B_{k2}^p B_{pr}^2 \\
&= f^{00} B_{02}^2 B_{20}^2 + f^{11} B_{12}^3 B_{31}^2 + f^{22} B_{22}^0 B_{02}^2 + f^{33} B_{32}^1 B_{13}^2 \\
&= f^{00} + f^{11} - f^{22} + f^{33}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.17) \quad f_2^3 &= f^{kr} B_{k2}^p B_{pr}^3 \\
&= f^{01} B_{02}^2 B_{21}^3 + f^{10} B_{12}^3 B_{30}^3 + f^{23} B_{22}^0 B_{03}^3 + f^{32} B_{32}^1 B_{12}^3 \\
&= -f^{01} + f^{10} - f^{23} - f^{32}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.18) \quad f_3^0 &= f^{kr} B_{k3}^p B_{pr}^0 \\
&= f^{03} B_{03}^3 B_{33}^0 + f^{12} B_{13}^2 B_{22}^0 + f^{21} B_{23}^1 B_{11}^0 + f^{30} B_{33}^0 B_{00}^0 \\
&= -f^{03} + f^{12} - f^{21} - f^{30}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.19) \quad f_3^1 &= f^{kr} B_{k3}^p B_{pr}^1 \\
&= f^{02} B_{03}^3 B_{32}^1 + f^{13} B_{13}^2 B_{23}^1 + f^{20} B_{23}^1 B_{10}^1 + f^{31} B_{33}^0 B_{01}^1 \\
&= -f^{02} - f^{13} + f^{20} - f^{31}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.20) \quad f_{\mathbf{3}}^2 &= f^{kr} B_{k3}^p B_{pr}^2 \\
&= f^{01} B_{03}^3 B_{31}^2 + f^{10} B_{13}^2 B_{20}^2 + f^{23} B_{23}^1 B_{13}^2 + f^{32} B_{33}^0 B_{02}^2 \\
&= f^{01} - f^{10} - f^{23} - f^{32}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.21) \quad f_{\mathbf{3}}^3 &= f^{kr} B_{k3}^p B_{pr}^3 \\
&= f^{00} B_{03}^3 B_{30}^3 + f^{11} B_{13}^2 B_{21}^3 + f^{22} B_{23}^1 B_{12}^3 + f^{33} B_{33}^0 B_{03}^3 \\
&= f^{00} + f^{11} + f^{22} - f^{33}
\end{aligned}$$

Уравнения (10.3.6), (10.3.11), (10.3.16), (10.3.21) формируют систему линейных уравнений (10.3.2).

Уравнения (10.3.7), (10.3.10), (10.3.17), (10.3.20) формируют систему линейных уравнений (10.3.3).

Уравнения (10.3.8), (10.3.13), (10.3.14), (10.3.19) формируют систему линейных уравнений (10.3.4).

Уравнения (10.3.9), (10.3.12), (10.3.15), (10.3.18) формируют систему линейных уравнений (10.3.5). $\square$

Теорема 10.3.3. Рассмотрим алгебру кватернионов H с базисом (10.3.1). Стандартные компоненты аддитивной функции над полем F и координаты этой функции над полем F удовлетворяют соотношениям

$$\begin{aligned}
(10.3.22) \quad & \begin{pmatrix} f_0^0 & f_1^0 & f_2^0 & f_3^0 \\ f_1^1 & -f_0^1 & f_3^1 & -f_2^1 \\ f_2^2 & -f_3^2 & -f_0^2 & f_1^2 \\ f_3^3 & f_2^3 & -f_1^3 & -f_0^3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{00} & -f^{01} & -f^{02} & -f^{03} \\ f^{11} & f^{10} & f^{13} & -f^{12} \\ f^{22} & -f^{23} & f^{20} & f^{21} \\ f^{33} & f^{32} & -f^{31} & f^{30} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(10.3.23) \quad & \begin{pmatrix} f^{00} & -f^{01} & -f^{02} & -f^{03} \\ f^{11} & f^{10} & f^{13} & -f^{12} \\ f^{22} & -f^{23} & f^{20} & f^{21} \\ f^{33} & f^{32} & -f^{31} & f^{30} \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0^0 & f_1^0 & f_2^0 & f_3^0 \\ f_1^1 & -f_0^1 & f_3^1 & -f_2^1 \\ f_2^2 & -f_3^2 & -f_0^2 & f_1^2 \\ f_3^3 & f_2^3 & -f_1^3 & -f_0^3 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

где

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Запишем систему линейных уравнений (10.3.2) в виде произведения матриц

$$(10.3.24) \quad \begin{pmatrix} f_0^0 \\ f_1^1 \\ f_2^2 \\ f_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{00} \\ f^{11} \\ f^{22} \\ f^{33} \end{pmatrix}$$

Запишем систему линейных уравнений (10.3.3) в виде произведения матриц

$$(10.3.25) \quad \begin{pmatrix} f_0^1 \\ f_1^0 \\ f_2^3 \\ f_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{01} \\ f^{10} \\ f^{23} \\ f^{32} \end{pmatrix}$$

Из равенства (10.3.25) следует

$$(10.3.26) \quad \begin{aligned} \begin{pmatrix} -f_0^1 \\ f_1^0 \\ f_2^3 \\ -f_3^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{01} \\ f^{10} \\ f^{23} \\ f^{32} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{01} \\ f^{10} \\ -f^{23} \\ f^{32} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} f_1^0 \\ -f_0^1 \\ -f_3^2 \\ f_2^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{01} \\ f^{10} \\ -f^{23} \\ f^{32} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Запишем систему линейных уравнений (10.3.4) в виде произведения матриц

$$(10.3.27) \quad \begin{pmatrix} f_0^2 \\ f_1^3 \\ f_2^0 \\ f_3^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{02} \\ f^{13} \\ f^{20} \\ f^{31} \end{pmatrix}$$

Из равенства (10.3.27) следует

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} -f_0^2 \\ -f_1^3 \\ f_2^0 \\ f_3^1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{02} \\ f^{13} \\ f^{20} \\ f^{31} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{02} \\ f^{13} \\ f^{20} \\ -f^{31} \end{pmatrix} \\
 (10.3.28) \quad \begin{pmatrix} f_2^0 \\ f_3^1 \\ -f_0^2 \\ -f_1^3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{02} \\ f^{13} \\ f^{20} \\ -f^{31} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Запишем систему линейных уравнений (10.3.5) в виде произведения матриц

$$(10.3.29) \quad \begin{pmatrix} f_0^3 \\ f_1^2 \\ f_2^1 \\ f_3^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{03} \\ f^{12} \\ f^{21} \\ f^{30} \end{pmatrix}$$

Из равенства (10.3.29) следует

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} -f_0^3 \\ f_1^2 \\ -f_2^1 \\ f_3^0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f^{03} \\ f^{12} \\ f^{21} \\ f^{30} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{03} \\ -f^{12} \\ f^{21} \\ f^{30} \end{pmatrix} \\
 (10.3.30) \quad \begin{pmatrix} f_3^0 \\ -f_2^1 \\ f_1^2 \\ -f_0^3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f^{03} \\ -f^{12} \\ f^{21} \\ f^{30} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Мы объединяем равенства (10.3.24), (10.3.26), (10.3.28), (10.3.30) в равенстве (10.3.22). $\square$

Теорема 10.3.4. *Стандартные компоненты линейной функции алгебры кватернионов H относительно базиса (10.3.1) и координаты соответствующего*

линейного преобразования удовлетворяют соотношениям

$$(10.3.31) \quad \begin{cases} 4f^{00} = f_0^0 + f_1^1 + f_2^2 + f_3^3 \\ 4f^{11} = -f_0^0 - f_1^1 + f_2^2 + f_3^3 \\ 4f^{22} = -f_0^0 + f_1^1 - f_2^2 + f_3^3 \\ 4f^{33} = -f_0^0 + f_1^1 + f_2^2 - f_3^3 \end{cases}$$

$$(10.3.32) \quad \begin{cases} 4f^{10} = -f_1^0 + f_0^1 - f_3^2 + f_2^3 \\ 4f^{01} = -f_1^0 + f_0^1 + f_3^2 - f_2^3 \\ 4f^{32} = -f_1^0 - f_0^1 - f_3^2 - f_2^3 \\ 4f^{23} = f_1^0 + f_0^1 - f_3^2 - f_2^3 \end{cases}$$

$$(10.3.33) \quad \begin{cases} 4f^{20} = -f_2^0 + f_3^1 + f_0^2 - f_1^3 \\ 4f^{31} = f_2^0 - f_3^1 + f_0^2 - f_1^3 \\ 4f^{02} = -f_2^0 - f_3^1 + f_0^2 + f_1^3 \\ 4f^{13} = -f_2^0 - f_3^1 - f_0^2 - f_1^3 \end{cases}$$

$$(10.3.34) \quad \begin{cases} 4f^{30} = -f_3^0 - f_2^1 + f_1^2 + f_0^3 \\ 4f^{21} = -f_3^0 - f_2^1 - f_1^2 - f_0^3 \\ 4f^{12} = f_3^0 - f_2^1 - f_1^2 + f_0^3 \\ 4f^{03} = -f_3^0 + f_2^1 - f_1^2 + f_0^3 \end{cases}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Системы линейных уравнений (10.3.31), (10.3.32), (10.3.33), (10.3.34) получены в результате перемножения матриц в равенстве (10.3.23). $\square$

Теорема 10.3.5. Мы можем отождествить кватернион

$$(10.3.35) \quad a = a^0 + a^1 i + a^2 j + a^3 k$$

и матрицу

$$(10.3.36) \quad J_a = \begin{pmatrix} a^0 & -a^1 & -a^2 & -a^3 \\ a^1 & a^0 & -a^3 & a^2 \\ a^2 & a^3 & a^0 & -a^1 \\ a^3 & -a^2 & a^1 & a^0 \end{pmatrix}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Произведение кватернионов (10.3.35) и

$$x = x^0 + x^1 i + x^2 j + x^3 k$$

имеет вид

$$\begin{aligned} ax = & a^0 x^0 - a^1 x^1 - a^2 x^2 - a^3 x^3 + (a^0 x^1 + a^1 x^0 + a^2 x^3 - a^3 x^2) i \\ & + (a^0 x^2 + a^2 x^0 + a^3 x^1 - a^1 x^3) j + (a^0 x^3 + a^3 x^0 + a^1 x^2 - a^2 x^1) k \end{aligned}$$

Следовательно, функция $f_a(x) = ax$ имеет матрицу Якоби (10.3.36). Очевидно, что $f_a \circ f_b = f_{ab}$. Аналогичное равенство верно для матриц

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} a^0 & -a^1 & -a^2 & -a^3 \\ a^1 & a^0 & -a^3 & a^2 \\ a^2 & a^3 & a^0 & -a^1 \\ a^3 & -a^2 & a^1 & a^0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b^0 & -b^1 & -b^2 & -b^3 \\ b^1 & b^0 & -b^3 & b^2 \\ b^2 & b^3 & b^0 & -b^1 \\ b^3 & -b^2 & b^1 & b^0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a^0 b^0 - a^1 b^1 & -a^0 b^1 - a^1 b^0 & -a^0 b^2 + a^1 b^3 & -a^0 b^3 - a^1 b^2 \\ -a^2 b^2 - a^3 b^3 & -a^2 b^3 + a^3 b^2 & -a^2 b^0 - a^3 b^1 & +a^2 b^1 - a^3 b^0 \\ a^0 b^1 + a^1 b^0 & a^0 b^0 - a^1 b^1 & -a^0 b^3 - a^1 b^2 & a^0 b^2 - a^1 b^3 \\ +a^2 b^3 - a^3 b^2 & -a^2 b^2 - a^3 b^3 & +a^2 b^1 - a^3 b^0 & +a^2 b^0 + a^3 b^1 \\ a^0 b^2 - a^1 b^3 & a^0 b^3 + a^1 b^2 & a^0 b^0 - a^1 b^1 & -a^0 b^1 - a^1 b^0 \\ +a^2 b^0 + a^3 b^1 & -a^2 b^1 + a^3 b^0 & -a^2 b^2 - a^3 b^3 & -a^2 b^3 - a^3 b^2 \\ a^0 b^3 + a^1 b^2 & -a^0 b^2 + a^1 b^3 & a^0 b^1 + a^1 b^0 & a^0 b^0 - a^1 b^1 \\ -a^2 b^1 + a^3 b^0 & -a^2 b^0 - a^3 b^1 & +a^2 b^3 - a^3 b^2 & -a^2 b^2 - a^3 b^3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Следовательно, мы можем отождествить кватернион a и матрицу J_a . □

Линейное отображение D -векторных пространств

11.1. Линейное отображение D -векторных пространств

При изучении линейного отображения D -векторных пространств мы будем рассматривать тело D как конечно мерную алгебру над полем F .

Определение 11.1.1. Пусть поле F является подкольцом центра $Z(D)$ тела D . Пусть $\bar{V}$ и $\bar{W}$ - D -векторные пространства. Мы будем называть отображение

$$\bar{A} : \bar{V} \rightarrow \bar{W}$$

D -векторного пространства $\bar{V}$ в D -векторное пространство $\bar{W}$ **линейным отображением над полем F** , если

$$\begin{aligned} \bar{A}(\bar{x} + \bar{y}) &= \bar{A}(\bar{x}) + \bar{A}(\bar{y}) & \bar{x}, \bar{y} \in \bar{V} \\ \bar{A}(p\bar{x}) &= p\bar{A}(\bar{x}) & p \in F \end{aligned}$$

Обозначим $\mathcal{L}(D; \bar{V}; \bar{W})$ множество линейных отображений

$$\bar{A} : \bar{V} \rightarrow \bar{W}$$

D -векторного пространства $\bar{V}$ в D -векторное пространство $\bar{W}$. $\square$

Очевидно, что D_*^* -линейное отображение, так же как *_D -линейное отображение являются линейными отображениями. Множество морфизмов D -векторного пространства шире, чем множество морфизмов D_*^* -векторного пространства. Чтобы рассмотреть линейное отображение векторных пространств, мы будем следовать методике, предложенной в разделе 4.4.

Теорема 11.1.2. Пусть D - тело характеристики 0. Линейное отображение

$$\bar{A} : \bar{V} \rightarrow \bar{W}$$

относительно *_D -базиса $\bar{e}_{V,*}$ в D -векторном пространстве $\bar{V}$ и *_D -базиса $\bar{e}_{W,*}$ в D -векторном пространстве $\bar{W}$ имеет вид

$$(11.1.1) \quad \bar{A}(\bar{v}) = \bar{e}_{W,j} A_i^j(v^i) \quad \bar{v} = \bar{e}_{V,*} v$$

где $A_i^j(v^i)$ линейно зависит от одной переменной v^i и не зависит от остальных координат вектора $\bar{v}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно определению 11.1.1

$$(11.1.2) \quad \bar{A}(\bar{v}) = \bar{A}(\bar{e}_{V,*} v) = \bar{A} \left(\sum_i \bar{e}_{V,i} v^i \right) = \sum_i \bar{A}(\bar{e}_{V,i} v^i)$$

Для любого заданного i вектор $\overline{A}(\overline{e}_{V \cdot i} v^i) \in \overline{W}$ имеет единственное разложение

$$(11.1.3) \quad \overline{A}(\overline{e}_{V \cdot i} v^i) = \overline{e}_{W \cdot j} A_i^j(v^i) \quad \overline{A}(\overline{e}_{V \cdot i} v^i) = \overline{e}_{W * *} A_i(v^i)$$

относительно $*D$ -базиса $\overline{e}_{W * *}$. Подставив (11.1.3) в (11.1.2), мы получим (11.1.1). $\square$

Определение 11.1.3. Линейное отображение

$$A_i^j : D \rightarrow D$$

называется **частным линейным отображением переменной v^i** . $\square$

Мы можем записать линейное отображение в виде произведения матриц

$$(11.1.4) \quad \overline{A}(\overline{v}) = \begin{pmatrix} \overline{e}_{W \cdot 1} & \dots & \overline{e}_{W \cdot m} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} A_i^1(v^i) \\ \dots \\ A_i^m(v^i) \end{pmatrix}$$

Определим произведение матриц

$$(11.1.5) \quad \begin{pmatrix} A_1^1 & \dots & A_n^1 \\ \dots & \dots & \dots \\ A_1^m & \dots & A_n^m \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_i^1(v^i) \\ \dots \\ A_i^m(v^i) \end{pmatrix}$$

где $A = ({}_i A^j)$ - матрица частных линейных отображений. Используя равенство (11.1.5), мы можем записать равенство (11.1.4) в виде

$$(11.1.6) \quad \overline{A}(\overline{v}) = \begin{pmatrix} \overline{e}_{W \cdot 1} & \dots & \overline{e}_{W \cdot m} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} A_1^1 & \dots & A_n^1 \\ \dots & \dots & \dots \\ A_1^m & \dots & A_n^m \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} v^1 \\ \dots \\ v^n \end{pmatrix}$$

Теорема 11.1.4. Пусть D - тело характеристики 0. Линейное отображение

$$(11.1.7) \quad \overline{A} : \overline{v} \in \overline{V} \rightarrow \overline{w} \in \overline{W} \quad \overline{w} = \overline{A}(\overline{v})$$

относительно $*D$ -базиса $\overline{e}_{V * *}$ в D -векторном пространстве $\overline{V}$ и $*D$ -базиса $\overline{e}_{W * *}$ в D -векторном пространстве $\overline{W}$ ^{11.1} имеет вид

$$(11.1.8) \quad \overline{v} = \overline{e}_{V * *} v$$

$$(11.1.9) \quad \overline{w} = \overline{e}_{W * *} w$$

$$(11.1.9) \quad w^j = A_i^j(v^i) = A_{s \cdot 0 \cdot i}^j v^i A_{s \cdot 1 \cdot i}^j$$

Доказательство. Согласно теореме 11.1.2 линейное отображение $\overline{A}(\overline{v})$ можно записать в виде (11.1.1). Так как для заданных индексов i, j частное линейное отображение $A_i^j(v^i)$ линейно по переменной v^i , то согласно (9.1.14) выражение $A_i^j(v^i)$ можно представить в виде

$$(11.1.10) \quad A_i^j(v^i) = A_{s \cdot 0 \cdot i}^j v^i A_{s \cdot 1 \cdot i}^j$$

^{11.1}Координатная запись отображения (11.1.7) зависит от выбора базиса. Равенства изменят свой вид, если например мы выберем $*D$ -базис $\overline{e}_*$ в D -векторном пространстве $\overline{W}$.

где индекс s нумерует слагаемые. Множество значений индекса s зависит от индексов i и j . Комбинируя равенства (11.1.2) и (11.1.10), мы получим

$$(11.1.11) \quad \begin{aligned} \overline{A}(\overline{v}) &= \overline{e}_{W \cdot j} A_i^j(v^i) = \overline{e}_{W \cdot j} A_{s \cdot 0 \cdot i}^j v^i A_{s \cdot 1 \cdot i}^j \\ \overline{A}(\overline{v}) &= \overline{e}_{W * *} A_i(v^i) = \overline{e}_{W * *} (A_{s \cdot 0 \cdot i} v^i A_{s \cdot 1 \cdot i}) \end{aligned}$$

В равенстве (11.1.11) мы суммируем также по индексу i . Равенство (11.1.9) следует из сравнения равенств (11.1.8) и (11.1.11). $\square$

Определение 11.1.5. Выражение $A_{s \cdot p \cdot i}^j$ в равенстве (11.1.3) называется компонентой линейного отображения $\overline{A}$. $\square$

Теорема 11.1.6. Пусть D - тело характеристики 0. Пусть $\overline{e}_{V \cdot * - *}$ D -базис в D -векторном пространстве $\overline{V}$, $\overline{e}_{U \cdot * - *}$ D -базис в D -векторном пространстве $\overline{U}$, и $\overline{e}_{W \cdot * - *}$ D -базис в D -векторном пространстве $\overline{W}$. Предположим, что мы имеем коммутативную диаграмму отображений

$$\begin{array}{ccc} \overline{V} & \xrightarrow{\overline{C}} & \overline{W} \\ & \searrow \overline{A} \quad \nearrow \overline{B} & \\ & \overline{U} & \end{array}$$

где линейное отображение A имеет представление

$$(11.1.12) \quad \overline{u} = \overline{A}(\overline{v}) = \overline{e}_{U \cdot j} A_i^j(v^i) = \overline{e}_{U \cdot j} A_{s \cdot 0 \cdot i}^j v^i A_{s \cdot 1 \cdot i}^j$$

относительно заданных базисов и линейное отображение B имеет представление

$$(11.1.13) \quad \overline{w} = \overline{B}(\overline{u}) = \overline{e}_{W \cdot k} B_j^k(u^j) = \overline{e}_{W \cdot k} B_{t \cdot 0 \cdot j}^k u^j B_{t \cdot 1 \cdot j}^k$$

относительно заданных базисов. Тогда отображение C линейно и имеет представление

$$(11.1.14) \quad \overline{w} = \overline{C}(\overline{v}) = \overline{e}_{W \cdot k} C_i^k(v^i) = \overline{e}_{W \cdot k} C_{u \cdot 0 \cdot i}^k v^i C_{u \cdot 1 \cdot i}^k$$

относительно заданных базисов, где^{11.2}

$$(11.1.15) \quad \begin{aligned} C_i^k(v^i) &= B_j^k(A_i^j(v^i)) \\ C_{u \cdot 0 \cdot i}^k &= C_{ts \cdot 0 \cdot i}^k = B_{t \cdot 0 \cdot j}^k A_{s \cdot 0 \cdot i}^j \\ C_{u \cdot 1 \cdot i}^k &= C_{ts \cdot 1 \cdot i}^k = A_{s \cdot 1 \cdot i}^j B_{t \cdot 1 \cdot j}^k \end{aligned}$$

^{11.2}Индекс u оказался составным индексом, $u = st$. Однако не исключено, что некоторые слагаемые в (11.1.15) могут быть объединены вместе.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отображение $\overline{C}$ линейно, так как

$$\begin{aligned}
 \overline{C}(\overline{a} + \overline{b}) &= \overline{B}(\overline{A}(\overline{a} + \overline{b})) \\
 &= \overline{B}(\overline{A}(\overline{a}) + \overline{A}(\overline{b})) \\
 &= \overline{B}(\overline{A}(\overline{a})) + \overline{B}(\overline{A}(\overline{b})) \\
 &= \overline{C}(\overline{a}) + \overline{C}(\overline{b}) \\
 \overline{C}(a\overline{b}) &= \overline{B}(\overline{A}(a\overline{b})) = \overline{B}(a\overline{A}(\overline{b})) \\
 &= a\overline{B}(\overline{A}(\overline{b})) = a\overline{C}(\overline{b}) \\
 \overline{a}, \overline{b} &\in \overline{V} \\
 a &\in F
 \end{aligned}$$

Равенство (11.1.14) следует из подстановки (11.1.12) в (11.1.13). $\square$

Теорема 11.1.7. Для линейного отображения $\overline{A}$ существует линейное отображение $\overline{B}$ такое, что

$$\begin{aligned}
 \overline{A}(a\overline{x}b) &= \overline{B}(\overline{x}) \\
 B_{s \cdot 0 \cdot i}^j &= A_{s \cdot 0 \cdot i}^j a \\
 B_{s \cdot 1 \cdot i}^j &= b A_{s \cdot 1 \cdot i}^j
 \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отображение $\overline{B}$ линейно, так как

$$\begin{aligned}
 \overline{B}(\overline{x} + \overline{y}) &= \overline{A}(a(\overline{x} + \overline{y})b) = \overline{A}(a\overline{x}b + a\overline{y}b) = \overline{A}(a\overline{x}b) + \overline{A}(a\overline{y}b) = \overline{B}(\overline{x}) + \overline{B}(\overline{y}) \\
 \overline{B}(c\overline{x}) &= \overline{A}(ac\overline{x}b) = \overline{A}(ca\overline{x}b) = c\overline{A}(a\overline{x}b) = c\overline{B}(\overline{x}) \\
 \overline{x}, \overline{y} &\in \overline{V}, c \in F
 \end{aligned}$$

Согласно равенству (11.1.9)

$$B_{s \cdot 0 \cdot i}^j v^i B_{s \cdot 1 \cdot i}^j = A_{s \cdot 0 \cdot i}^j (a v^i b) A_{s \cdot 1 \cdot i}^j = (A_{s \cdot 0 \cdot i}^j a) v^i (b A_{s \cdot 1 \cdot i}^j)$$

$\square$

Теорема 11.1.8. Пусть D - тело характеристики 0. Пусть

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

линейное отображение D -векторного пространства $\overline{V}$ в D -векторное пространство $\overline{W}$. Тогда $\overline{A}(\overline{0}) = \overline{0}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Следствие равенства

$$\overline{A}(\overline{a} + \overline{0}) = \overline{A}(\overline{a}) + \overline{A}(\overline{0})$$

$\square$

Определение 11.1.9. Множество

$$\ker \overline{A} = \{\overline{x} \in \overline{V} : \overline{A}(\overline{x}) = \overline{0}\}$$

называется **ядром линейного отображения**

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

D -векторного пространства $\overline{V}$ в D -векторное пространство $\overline{W}$. $\square$

Определение 11.1.10. Линейное отображение

$$\overline{A} : \overline{V} \rightarrow \overline{W}$$

D -векторного пространства $\overline{V}$ в D -векторное пространство $\overline{W}$ называется **вырожденным**, если

$$\ker \overline{A} = \overline{V}$$

□

11.2. Полилинейное отображение D -векторного пространства

Определение 11.2.1. Пусть поле F является подкольцом центра $Z(D)$ тела D характеристики 0. Пусть $\overline{V}_1, \dots, \overline{V}_n, \overline{W}_1, \dots, \overline{W}_m$ - D -векторные пространства. Мы будем называть отображение

$$(11.2.1) \quad \begin{aligned} \overline{A} : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n &\rightarrow \overline{W}_1 \times \dots \times \overline{W}_m \\ \overline{w}_1 \times \dots \times \overline{w}_m &= \overline{A}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) \end{aligned}$$

полилинейным отображением $\times$ - D -векторного пространства $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$ в $\times$ - D -векторное пространство $\overline{W}_1 \times \dots \times \overline{W}_m$, если

$$\begin{aligned} \overline{A}(\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_i + \overline{q}_i, \dots, \overline{p}_n) &= \overline{A}(\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_i, \dots, \overline{p}_n) + \overline{A}(\overline{p}_1, \dots, \overline{q}_i, \dots, \overline{p}_n) \\ \overline{A}(\overline{p}_1, \dots, a\overline{p}_i, \dots, \overline{p}_n) &= a\overline{A}(\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_i, \dots, \overline{p}_n) \\ 1 \leq i \leq n \quad \overline{p}_i, \overline{q}_i &\in \overline{V}_i \quad a \in F \end{aligned}$$

□

Определение 11.2.2. Обозначим $\mathcal{L}(D; \overline{V}_1, \dots, \overline{V}_n; \overline{W}_1, \dots, \overline{W}_m)$ множество полилинейных отображений $\times$ - D -векторного пространства $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$ в $\times$ - D -векторное пространство $\overline{W}_1 \times \dots \times \overline{W}_m$. □

Теорема 11.2.3. Пусть D - тело характеристики 0. Для каждого $k \in K = [1, n]$ допустим $\overline{e}_{V_k \cdot *}$ - $*$ - D -базис в D -векторном пространстве $\overline{V}_k$ и

$$\overline{v}_k = \overline{e}_{V_k \cdot *} v_k \quad \overline{v}_k \in \overline{V}_k$$

Для каждого $l, 1 \leq l \leq m$, допустим $\overline{e}_{W_l \cdot *} - *$ - D -базис в D -векторном пространстве $\overline{W}_l$ и

$$\overline{w}_l = \overline{e}_{W_l \cdot *} w_l \quad \overline{w}_l \in \overline{W}_l$$

Полилинейное отображение (11.2.1) относительно базиса $\overline{e}_{V_1 \cdot *} \times \dots \times \overline{e}_{V_n \cdot *}$ и базиса $\overline{e}_{W_1 \cdot *} \times \dots \times \overline{e}_{W_m \cdot *}$ имеет вид

$$(11.2.2) \quad \begin{aligned} w_l^j &= A_{i_1, \dots, i_n \cdot l}^j(v_1^{i_1}, \dots, v_n^{i_n}) \\ &= A_{s \cdot 0 \cdot i_1, \dots, i_n \cdot l}^j \sigma_s(v_1^{i_1}) A_{s \cdot 1 \cdot i_1, \dots, i_n \cdot l}^j \dots \sigma_s(v_n^{i_n}) A_{s \cdot n \cdot i_1, \dots, i_n \cdot l}^j \end{aligned}$$

Область значений S индекса s зависит от значений индексов $i_1, \dots, i_n$. σ_s - перестановка множества переменных $\{v_1^{i_1}, \dots, v_n^{i_n}\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как отображение $\overline{A}$ в $\times$ - D -векторное пространство $\overline{W}_1 \times \dots \times \overline{W}_m$ можно рассматривать покомпонентно, то мы можем ограничиться рассмотрением отображения

$$(11.2.3) \quad \overline{A}_l : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \rightarrow \overline{W}_l \quad \overline{w}_l = \overline{A}_l(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$$

Мы докажем утверждение индукцией по n .

При $n = 1$ доказываемое утверждение является утверждением теоремы 11.1.4. При этом мы можем отождествить^{11.3}

$$A_{s,p \cdot i}^1 = A_{s,p \cdot i}^j \quad p = 0, 1$$

Допустим, что утверждение теоремы справедливо при $n = k - 1$. Тогда отображение (11.2.3) можно представить в виде

$$\begin{array}{ccc} \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_k & \xrightarrow{\overline{A}_l} & \overline{W}_l \\ & \searrow \overline{C}_l(\overline{v}_k) & \uparrow \overline{B}_l \\ & & \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_{k-1} \end{array}$$

$$\overline{w}_l = \overline{A}_l(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_k) = \overline{C}_l(\overline{v}_k)(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_{k-1})$$

Согласно предположению индукции полилинейное отображение $\overline{B}_l$ имеет вид

$$w_l^j = B_{t \cdot 0 \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j} \sigma_t(v_1^{i_1}) B_{t \cdot 1 \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j} \dots \sigma_t(v_{k-1}^{i_{k-1}}) B_{t \cdot k-1 \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j}$$

Согласно построению $\overline{B}_l = \overline{C}_l(\overline{v}_k)$. Следовательно, выражения $B_{t \cdot p \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j}$ являются функциями $\overline{v}_k$. Поскольку $\overline{C}_l(\overline{v}_k)$ - линейная функция $\overline{v}_k$, то только одно выражение $B_{t \cdot p \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j}$ является линейной функцией $\overline{v}_k$, и остальные выражения $B_{t \cdot q \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j}$ не зависят от $\overline{v}_k$.

Не нарушая общности, положим $p = 0$. Согласно теореме 11.1.4

$$B_{t \cdot 0 \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j} = C_{tr \cdot 0 \cdot i_k i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^k v_k^{i_k} C_{tr \cdot 1 \cdot i_k i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^k$$

Положим $s = tr$ и определим перестановку σ_s согласно правилу

$$\sigma_s = \sigma(tr) = \begin{pmatrix} v_k^{i_k} & v_1^{i_1} & \dots & v_{k-1}^{i_{k-1}} \\ v_k^{i_k} & \sigma_t(v_1^{i_1}) & \dots & \sigma_t(v_{k-1}^{i_{k-1}}) \end{pmatrix}$$

Положим

$$\begin{aligned} A_{tr \cdot q+1 \cdot i_k i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^k &= B_{t \cdot q \cdot i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^{k-1, j} & q = 1, \dots, k-1 \\ A_{tr \cdot q \cdot i_k i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^k &= C_{tr \cdot q \cdot i_k i_1, \dots, i_{k-1} \cdot l}^k & q = 0, 1 \end{aligned}$$

Мы доказали шаг индукции. □

Определение 11.2.4. Выражение $A_{s,p \cdot i_1, \dots, i_n \cdot l}^n$ в равенстве (11.2.2) называется компонентой полилинейного отображения $\overline{A}$. □

^{11.3}В представлении (11.2.2) мы будем пользоваться следующими правилами.

- Если область значений какого-либо индекса - это множество, состоящее из одного элемента, мы будем опускать соответствующий индекс.
- Если $n = 1$, то σ_s - тождественное преобразование. Это преобразование можно не указывать в выражении.

Тензорное произведение

12.1. Тензорное произведение колец

Теорема 12.1.1. Пусть G - полугруппа. Пусть M - свободный модуль с базисом G над коммутативным кольцом F . Тогда на M определена структура кольца таким образом, что F является подкольцом центра $Z(M)$ кольца M .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Произвольные векторы $a, b, c \in M$ имеют единственное разложение

$$a = a^i g_i \quad b = b^j g_j \quad c = c^k g_k$$

относительно базиса G . $i \in I, j \in J, k \in K$, где I, J, K - конечные множества. Не нарушая общности, мы можем положить $i, j, k \in I \cup J \cup K$.

Для a и b определим произведение равенством

$$(12.1.1) \quad ab = (a^i b^j)(g_i g_j)$$

Из цепочки равенств

$$\begin{aligned} (a + b)c &= ((a^i + b^i)g_i)(c^j g_j) \\ &= ((a^i + b^i)c^j)(g_i g_j) \\ &= (a^i c^j + b^i c^j)(g_i g_j) \\ &= (a^i c^j)(g_i g_j) + (b^i c^j)(g_i g_j) \\ &= (a^i g_i)(c^j g_j) + (b^i g_i)(c^j g_j) \\ &= ac + bc \end{aligned}$$

следует, что предложенное произведение дистрибутивно справа по отношению к сложению. Аналогично доказывается, что предложенное произведение дистрибутивно слева по отношению к сложению. Из цепочки равенств

$$\begin{aligned} (ab)c &= ((a^i g_i)(b^j g_j))(c^k g_k) \\ &= ((a^i b^j)(g_i g_j))(c^k g_k) \\ &= ((a^i b^j)c^k)((g_i g_j)g_k) \\ &= (a^i(b^j c^k))(g_i(g_j g_k)) \\ &= (a^i g_i)((b^j c^k)(g_j g_k)) \\ &= (a^i g_i)((b^j g_j)(c^k g_k)) \\ &= a(bc) \end{aligned}$$

следует, что предложенное произведение ассоциативно.

Пусть $e \in G$ - единица полугруппы G . Из равенства

$$ae = (a^i g_i)e = a^i(g_i e) = a^i g_i = a$$

следует, что e является единицей кольца M .

Отображение

$$f : p \in F \rightarrow pe \in M$$

является гомоморфным вложением кольца F в кольцо M , откуда следует, что кольцо F содержится в центре $Z(M)$ кольца M . $\square$

Пусть $R_1, \dots, R_n$ - кольца характеристики 0.^{12.1} Пусть F - максимальное коммутативное кольцо, являющееся подкольцом центра $Z(R_i)$ для любого $i, i = 1, \dots, n$. Рассмотрим категорию $\mathcal{A}$ объектами которой являются полилинейные над коммутативным кольцом F отображения

$$f : R_1 \times \dots \times R_n \longrightarrow S_1 \quad g : R_1 \times \dots \times R_n \longrightarrow S_2$$

где S_1, S_2 - модули над кольцом F . Мы определим морфизм $f \rightarrow g$ как линейное над коммутативным кольцом F отображение $h : S_1 \rightarrow S_2$, для которого коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} & & S_1 \\ & \nearrow f & \downarrow h \\ R_1 \times \dots \times R_n & & \\ & \searrow g & \downarrow \\ & & S_2 \end{array}$$

Универсальный объект $R_1 \otimes \dots \otimes R_n$ категории $\mathcal{A}$ называется **тензорным произведением колец $R_1, \dots, R_n$ над коммутативным кольцом F** .

Теорема 12.1.2. *Тензорное произведение колец существует.*

Доказательство. Пусть M - модуль над кольцом F , порождённый произведением $R_1 \times \dots \times R_n$ мультипликативных полугрупп колец $R_1, \dots, R_n$. Инъекция

$$i : R_1 \times \dots \times R_n \longrightarrow M$$

определена по правилу

$$(12.1.2) \quad i(d_1, \dots, d_n) = (d_1, \dots, d_n)$$

и является гомоморфизмом мультипликативной полугруппы кольца $R_1 \times \dots \times R_n$ на базис модуля M . Следовательно, произведение векторов базиса определено покомпонентно

$$(12.1.3) \quad (d_1, \dots, d_n)(c_1, \dots, c_n) = (d_1 c_1, \dots, d_n c_n)$$

Пусть $N \subset M$ - подмодуль, порождённый элементами вида

$$(12.1.4) \quad (d_1, \dots, d_i + c_i, \dots, d_n) - (d_1, \dots, d_i, \dots, d_n) - (d_1, \dots, c_i, \dots, d_n)$$

$$(12.1.5) \quad (d_1, \dots, ad_i, \dots, d_n) - a(d_1, \dots, d_i, \dots, d_n)$$

где $d_i \in R_i, c_i \in R_i, a \in F$. Пусть

$$j : M \rightarrow M/N$$

^{12.1}Я определяю тензорное произведение колец по аналогии с определением в [1], с. 456 - 458.

каноническое отображение на фактормодуль. Рассмотрим коммутативную диаграмму

$$(12.1.6) \quad \begin{array}{ccc} & & M/N \\ & \nearrow f & \nearrow j \\ R_1 \times \dots \times R_n & \xrightarrow{i} & M \end{array}$$

Поскольку элементы (12.1.4) и (12.1.5) принадлежат ядру линейного отображения j , то из равенства (12.1.2) следует

$$(12.1.7) \quad f(d_1, \dots, d_i + c_i, \dots, d_n) = f(d_1, \dots, d_i, \dots, d_n) + f(d_1, \dots, c_i, \dots, d_n)$$

$$(12.1.8) \quad f(d_1, \dots, ad_i, \dots, d_n) = af(d_1, \dots, d_i, \dots, d_n)$$

Из равенств (12.1.7) и (12.1.8) следует, что отображение f полилинейно над полем F . Поскольку M - модуль с базисом $R_1 \times \dots \times R_n$, то согласно теореме [1]-1, на с. 104 для любого модуля V и любого полилинейного над F отображения

$$g : R_1 \times \dots \times R_n \longrightarrow V$$

существует единственный гомоморфизм $k : M \rightarrow V$, для которого коммутативна следующая диаграмма

$$(12.1.9) \quad \begin{array}{ccc} R_1 \times \dots \times R_n & \xrightarrow{i} & M \\ & \searrow g & \searrow k \\ & & V \end{array}$$

Так как g - полилинейно над F , то $\ker k \subseteq N$. Согласно утверждению на с. [1]-94 отображение j универсально в категории гомоморфизмов векторного пространства M , ядро которых содержит N . Следовательно, определён гомоморфизм

$$h : M/N \rightarrow V$$

для которого коммутативна диаграмма

$$(12.1.10) \quad \begin{array}{ccc} & M/N & \\ & \downarrow h & \\ M & \begin{array}{c} \nearrow j \\ \searrow k \end{array} & V \end{array}$$

Объединяя диаграммы (12.1.6), (12.1.9), (12.1.10), получим коммутативную диаграмму

$$(12.1.11) \quad \begin{array}{ccccc} & & & & M/N \\ & & & & \downarrow h \\ & & & & V \\ & \nearrow f & \nearrow j & \nearrow k & \\ R_1 \times \dots \times R_n & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{k} & V \\ & \searrow g & \searrow k & \searrow k & \end{array}$$

Так как $\text{Im} f$ порождает M/N , то отображение h однозначно определено. $\square$

Согласно доказательству теоремы 12.1.2

$$R_1 \otimes \dots \otimes R_n = M/N$$

Для $d_i \in R_i$ будем записывать

$$(12.1.12) \quad j(d_1, \dots, d_n) = d_1 \otimes \dots \otimes d_n$$

Из равенств (12.1.2) и (12.1.12) следует

$$(12.1.13) \quad f(d_1, \dots, d_n) = d_1 \otimes \dots \otimes d_n$$

Равенства (12.1.7) и (12.1.8) можно записать в виде

$$(12.1.14) \quad \begin{aligned} & d_1 \otimes \dots \otimes (d_i + c_i) \otimes \dots \otimes d_n \\ &= d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n + d_1 \otimes \dots \otimes c_i \otimes \dots \otimes d_n \end{aligned}$$

$$(12.1.15) \quad d_1 \otimes \dots \otimes (ad_i) \otimes \dots \otimes d_n = a(d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n)$$

Теорема 12.1.3. Тензорное произведение $R_1 \otimes \dots \otimes R_n$ колец $R_1, \dots, R_n$ характеристики 0 над кольцом F является кольцом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно доказательству теоремы 12.1.2 базис модуля M над кольцом F является полугруппой. Согласно теореме 12.1.1 в модуле M определена структура кольца. Подмодуль N является двусторонним идеалом кольца M . Каноническое отображение на фактормодуль

$$j : M \rightarrow M/N$$

является также каноническим гомоморфизмом в факторкольцо. Следовательно, в модуле $M/N = R_1 \otimes \dots \otimes R_n$ определена структура кольца. Из равенства (12.1.3) следует

$$(12.1.16) \quad (d_1 \otimes \dots \otimes d_n)(c_1 \otimes \dots \otimes c_n) = (d_1 c_1) \otimes \dots \otimes (d_n c_n)$$

Из равенства (12.1.14) следует

$$\begin{aligned} & d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n \\ &= d_1 \otimes \dots \otimes (d_i + 0) \otimes \dots \otimes d_n \\ &= d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n + d_1 \otimes \dots \otimes 0 \otimes \dots \otimes d_n \end{aligned}$$

Следовательно, мы можем отождествить тензор $d_1 \otimes \dots \otimes 0 \otimes \dots \otimes d_n$ с нулём $0 \otimes \dots \otimes 0$. В силу условия теоремы произведение равно $0 \otimes \dots \otimes 0$ только, если один из сомножителей равен $0 \otimes \dots \otimes 0$. Единицей произведения служит тензор $e_1 \otimes \dots \otimes e_n$. $\square$

12.2. Тензорное произведение тел

Пусть $D_1, \dots, D_n$ - тела характеристики 0. Пусть F - поле, являющееся подкольцом центра $Z(D_i)$ для любого $i, i = 1, \dots, n$. Тензор

$$a_1 \otimes \dots \otimes a_n \in D_1 \otimes \dots \otimes D_n$$

имеет обратный

$$(a_1 \otimes \dots \otimes a_n)^{-1} = (a_1)^{-1} \otimes \dots \otimes (a_n)^{-1}$$

Однако **тензорное произведение** $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$ тел $D_1, \dots, D_n$, вообще говоря, не является телом, так как мы не можем сказать, является ли обратим элемент

$$p(a_1 \otimes \dots \otimes a_n) + q(b_1 \otimes \dots \otimes b_n)$$

Замечание 12.2.1. Представление тензора в виде

$$(12.2.1) \quad a^s d_{s \cdot 1} \otimes \dots \otimes d_{s \cdot n}$$

неоднозначно. Если $r \in F$, то

$$(d_1 r) \otimes d_2 = d_1 \otimes (r d_2)$$

Чисто алгебраическими методами мы можем увеличить либо уменьшить число слагаемых. К числу допустимых преобразований относится

$$\begin{aligned} & d_1 \otimes d_2 + c_1 \otimes c_2 \\ &= d_1 \otimes (d_2 - c_2 + c_2) + c_1 \otimes c_2 \\ &= d_1 \otimes (d_2 - c_2) + d_1 \otimes c_2 + c_1 \otimes c_2 \\ &= d_1 \otimes (d_2 - c_2) + (d_1 + c_1) \otimes c_2 \end{aligned}$$

□

В качестве иллюстрации замечания 12.2.1 рассмотрим следующую теорему.

Теорема 12.2.2. Если в теле D характеристики 0 существуют элементы a, b, c , произведение которых не коммутативно, то существует нетривиальная запись нулевого тензора.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство теоремы следует из цепочки равенств

$$\begin{aligned} 0 \otimes 0 &= a \otimes a - a \otimes a + b \otimes b - b \otimes b \\ &= (a + c) \otimes a - c \otimes a - a \otimes (a - c) - a \otimes c \\ &\quad + (b - c) \otimes b + c \otimes b - b \otimes (b + c) + b \otimes c \\ &= (a + c) \otimes a - a \otimes (a - c) + (b - c) \otimes b \\ &\quad + c \otimes (b - a) - b \otimes (b + c) + (b - a) \otimes c \end{aligned}$$

□

Неоднозначность представления тензора приводит к тому, что мы должны найти каноническое представление тензора. Мы можем найти решение поставленной задачи в случае тензорного произведения тел. Допустим тело D_i является векторным пространством над полем $F \subset Z(D_i)$. Допустим это векторное пространство имеет конечный базис $\bar{e}_{i \cdot s_i}, s_i \in S_i, |S_i| = m_i$. Следовательно, любой элемент f_i тела D_i можно представить в виде

$$f_i = e_{i \cdot s_i} f_i^{s_i}$$

В этом случае тензор (12.2.1) можно записать в виде

$$(12.2.2) \quad a^s (f_{s \cdot 1}^{s_1} \bar{e}_{1 \cdot s_1}) \otimes \dots \otimes (f_{s \cdot n}^{s_n} \bar{e}_{n \cdot s_n})$$

где $a^s, f_{s \cdot 1}^{s_1} \in F$. Мы можем упростить выражение (12.2.2)

$$(12.2.3) \quad a^s f_{s \cdot 1}^{s_1} \dots f_{s \cdot n}^{s_n} \bar{e}_{1 \cdot s_1} \otimes \dots \otimes \bar{e}_{n \cdot s_n}$$

Положим

$$a^s f_{s \cdot 1}^{s_1} \dots f_{s \cdot n}^{s_n} = f^{s_1 \dots s_n}$$

Тогда равенство (12.2.3) примет вид

$$(12.2.4) \quad f^{s_1 \dots s_n} \bar{e}_{1 \cdot s_1} \otimes \dots \otimes \bar{e}_{n \cdot s_n}$$

Выражение (12.2.4) определено однозначно с точностью до выбора базиса. Мы будем называть выражение $f^{s_1 \dots s_n}$ **стандартной компонентой тензора**.

12.3. Тензорное произведение D_*^* -векторных пространств

Пусть $D_1, \dots, D_n$ - тела характеристики 0.^{12.2} Пусть $\bar{V}_i$ - D_{i*}^* -векторное пространство, $i = 1, \dots, n$. Рассмотрим категорию $\mathcal{A}$, объектами которой являются полилинейные отображения

$$\bar{f} : \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n \longrightarrow \bar{W}_1 \quad \bar{g} : \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n \longrightarrow \bar{W}_2$$

где $\bar{W}_1, \bar{W}_2$ - D_* -модули над кольцом $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$. Мы определим морфизм $\bar{f} \rightarrow \bar{g}$ как аддитивное отображение $\bar{h} : \bar{W}_1 \rightarrow \bar{W}_2$, для которого коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} & & \bar{W}_1 \\ & \nearrow \bar{f} & \downarrow \bar{h} \\ \bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n & & \\ & \searrow \bar{g} & \downarrow \\ & & \bar{W}_2 \end{array}$$

Универсальный объект $\bar{V}_1 \otimes \dots \otimes \bar{V}_n$ категории $\mathcal{A}$ называется **тензорным произведением D_* -векторных пространств $\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n$** .

Теорема 12.3.1. *Тензорное произведение D_* -векторных пространств существует.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть F - поле, являющееся подкольцом центра $Z(D_i)$ для любого $i, i = 1, \dots, n$.

Пусть D - свободное векторное пространство над кольцом F , порождённое произведением $D_1 \times \dots \times D_n$ мультипликативных полугрупп тел $D_1, \dots, D_n$. Инъекция

$$i' : D_1 \times \dots \times D_n \longrightarrow D$$

определена по правилу

$$(12.3.1) \quad i'(d_1, \dots, d_n) = (d_1, \dots, d_n)$$

и является гомоморфизмом мультипликативной полугруппы кольца $D_1 \times \dots \times D_n$ на базис модуля D . Следовательно, произведение векторов базиса определено покомпонентно

$$(12.3.2) \quad (d_1, \dots, d_n)(c_1, \dots, c_n) = (d_1 c_1, \dots, d_n c_n)$$

Согласно теореме 12.1.1 на векторном пространстве D определена структура кольца.

^{12.2}Я определяю тензорное произведение D_*^* -векторных пространств по аналогии с определением в [1], с. 456 - 458.

Рассмотрим прямое произведение $F \times D$ поля F и кольца D . Мы будем отождествлять элемент (f, e) с элементом $f \in F$ и элемент $(1, d)$ с элементом $d \in D$.

Пусть $\overline{M}$ - свободный модуль над кольцом $F \times D$, порождённый декартовым произведением $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$. Если $\overline{v}_1 \in \overline{V}_1, \dots, \overline{v}_n \in \overline{V}_n$, то соответствующий вектор из $\overline{M}$ мы будем обозначать $(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$. Пусть

$$\bar{i}: \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \longrightarrow \overline{M}$$

инъекция, определённая по правилу

$$(12.3.3) \quad \bar{i}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) = (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$$

Пусть $\overline{N} \subset \overline{M}$ - векторное подпространство, порождённое элементами вида

$$(12.3.4) \quad (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i + \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n) - (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) - (\overline{v}_1, \dots, \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.3.5) \quad (\overline{v}_1, \dots, a\overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) - a(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.3.6) \quad (a_1, \dots, a_n)(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) - (a_1\overline{v}_1, \dots, a_n\overline{v}_n)$$

где $\overline{v}_i, \overline{w}_i \in \overline{V}_i, a \in F, a_i \in D_i$. Пусть

$$\bar{j}: \overline{M} \rightarrow \overline{M}/\overline{N}$$

каноническое отображение на фактормодуль. Рассмотрим коммутативную диаграмму

$$(12.3.7) \quad \begin{array}{ccc} & & \overline{M}/\overline{N} \\ & \nearrow \bar{f} & \\ \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\bar{i}} & \overline{M} \\ & \searrow \bar{j} & \end{array}$$

Поскольку элементы (12.3.4) и (12.3.5) принадлежат ядру линейного отображения $\bar{j}$, то из равенства (12.3.3) следует

$$(12.3.8) \quad \bar{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i + \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n) = \bar{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) + \bar{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.3.9) \quad \bar{f}(\overline{v}_1, \dots, a\overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) = a\bar{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

Из равенств (12.3.8) и (12.3.9) следует, что отображение f полилинейно над полем F . Поскольку $\overline{M}$ - модуль с базисом $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$, то согласно теореме [1]-1, на с. 104 для любого модуля $\overline{V}$ и любого полилинейного над F отображения

$$\bar{g}: \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \longrightarrow \overline{V}$$

существует единственный гомоморфизм $\bar{k}: \overline{M} \rightarrow \overline{V}$, для которого коммутативна следующая диаграмма

$$(12.3.10) \quad \begin{array}{ccc} \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\bar{i}} & \overline{M} \\ & \searrow \bar{g} & \downarrow \bar{k} \\ & & \overline{V} \end{array}$$

Так как $\bar{g}$ - полилинейно над F , то $\ker \bar{k} \subseteq \overline{N}$. Согласно утверждению на с. [1]-94 отображение $\bar{j}$ универсально в категории гомоморфизмов модуля $\overline{M}$, ядро

которых содержит $\overline{N}$. Следовательно, определён гомоморфизм

$$\overline{h} : \overline{M}/\overline{N} \rightarrow \overline{V}$$

для которого коммутативна диаграмма

$$(12.3.11) \quad \begin{array}{ccc} & & \overline{M}/\overline{N} \\ & \nearrow \overline{j} & \downarrow \overline{h} \\ \overline{M} & & \overline{V} \\ & \searrow \overline{k} & \end{array}$$

Объединяя диаграммы (12.3.7), (12.3.10), (12.3.11), получим коммутативную диаграмму

$$(12.3.12) \quad \begin{array}{ccccc} & & & & \overline{M}/\overline{N} \\ & & & \nearrow \overline{j} & \downarrow \overline{h} \\ \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\overline{i}} & \overline{M} & & \overline{V} \\ & \searrow \overline{g} & \searrow \overline{k} & & \end{array}$$

Так как $\text{Im } \overline{f}$ порождает $\overline{M}/\overline{N}$, то отображение $\overline{h}$ однозначно определено. $\square$

Согласно доказательству теоремы 12.3.1

$$\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n = \overline{M}/\overline{N}$$

Для $\overline{v}_i \in \overline{V}_i$ будем записывать

$$(12.3.13) \quad \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n = \overline{j}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$$

Из равенств (12.3.3) и (12.3.13) следует

$$(12.3.14) \quad \overline{p}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) = \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n$$

Равенства (12.3.8) и (12.3.9) можно записать в виде

$$(12.3.15) \quad \begin{aligned} & \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes (\overline{v}_i + \overline{w}_i) \otimes \dots \otimes \overline{v}_n \\ &= \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_i \otimes \dots \otimes \overline{v}_n + \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{w}_i \otimes \dots \otimes \overline{v}_n \end{aligned}$$

$$(12.3.16) \quad \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes (a\overline{v}_i) \otimes \dots \otimes \overline{v}_n = a(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_i \otimes \dots \otimes \overline{v}_n)$$

Теорема 12.3.2. Тензорное произведение $\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n$ является модулем над тензорным произведением $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$.

Доказательство. Для доказательства утверждения теоремы необходимо доказать, что действие

$$(d_1 \otimes \dots \otimes d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) = (d_1, \dots, d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n)$$

кольца $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$ на модуле $\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n$ определено корректно. Это следует из цепочек равенств

$$\begin{aligned} (d_1 \otimes \dots \otimes (ad_i) \otimes \dots \otimes d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) &= (d_1, \dots, ad_i, \dots, d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) \\ &= (d_1 \overline{v}_1) \otimes \dots \otimes (ad_i \overline{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \overline{v}_n) \\ &= a(d_1 \overline{v}_1) \otimes \dots \otimes (d_n \overline{v}_n) \\ &= a((d_1, \dots, d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n)) \\ &= a((d_1 \otimes \dots \otimes d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n)) \\ &= (a(d_1 \otimes \dots \otimes d_n))(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &(d_1 \otimes \dots \otimes (d_i + c_i) \otimes \dots \otimes d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) \\ &= (d_1, \dots, d_i + c_i, \dots, d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) \\ &= (d_1 \overline{v}_1) \otimes \dots \otimes ((d_i + c_i) \overline{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \overline{v}_n) \\ &= (d_1 \overline{v}_1) \otimes \dots \otimes (d_i \overline{v}_i + c_i \overline{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \overline{v}_n) \\ &= (d_1 \overline{v}_1) \otimes \dots \otimes (d_i \overline{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \overline{v}_n) + (d_1 \overline{v}_1) \otimes \dots \otimes (c_i \overline{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \overline{v}_n) \\ &= (d_1 \overline{v}_1) \otimes \dots \otimes (d_i \overline{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \overline{v}_n) + (d_1 \overline{v}_1) \otimes \dots \otimes (c_i \overline{v}_i) \otimes \dots \otimes (d_n \overline{v}_n) \\ &= (d_1, \dots, d_i, \dots, d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) + (d_1, \dots, c_i, \dots, d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) \\ &= (d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) + (d_1 \otimes \dots \otimes c_i \otimes \dots \otimes d_n)(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) \\ &= ((d_1 \otimes \dots \otimes d_i \otimes \dots \otimes d_n) + (d_1 \otimes \dots \otimes c_i \otimes \dots \otimes d_n))(\overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n) \end{aligned}$$

□

12.4. Тензорное произведение D -векторных пространств

Пусть $D_1, \dots, D_n$ - тела характеристики 0.^{12.3} Пусть $\overline{V}_i$ - D_i -векторное пространство, $i = 1, \dots, n$. Рассмотрим категорию $\mathcal{A}$ объектами которой являются полилинейные отображения

$$\overline{f} : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \longrightarrow \overline{W}_1 \quad \overline{g} : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \longrightarrow \overline{W}_2$$

где $\overline{W}_1, \overline{W}_2$ - модули над кольцом $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$. Мы определим морфизм $\overline{f} \rightarrow \overline{g}$ как линейное отображение $\overline{h} : \overline{W}_1 \rightarrow \overline{W}_2$, для которого коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} & & \overline{W}_1 \\ & \nearrow \overline{f} & \downarrow \overline{h} \\ \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & & \overline{W}_2 \\ & \searrow \overline{g} & \end{array}$$

Универсальный объект $\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n$ категории $\mathcal{A}$ называется **тензорным произведением D -векторных пространств $\overline{V}_1, \dots, \overline{V}_n$** .

Теорема 12.4.1. *Тензорное произведение D -векторных пространств существует.*

^{12.3}Я определяю тензорное произведение D -векторных пространств по аналогии с определением в [1], с. 456 - 458.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть F - поле, являющееся подкольцом центра $Z(D_i)$ для любого i , $i = 1, \dots, n$.

Пусть D - свободное векторное пространство над кольцом F , порождённое произведением $D_1 \times \dots \times D_n$ мультипликативных полугрупп тел $D_1, \dots, D_n$. Инъекция

$$i' : D_1 \times \dots \times D_n \longrightarrow D$$

определена по правилу

$$(12.4.1) \quad i'(d_1, \dots, d_n) = (d_1, \dots, d_n)$$

и является гомоморфизмом мультипликативной полугруппы кольца $D_1 \times \dots \times D_n$ на базис модуля D . Следовательно, произведение векторов базиса определено покомпонентно

$$(12.4.2) \quad (d_1, \dots, d_n)(c_1, \dots, c_n) = (d_1 c_1, \dots, d_n c_n)$$

Согласно теореме 12.1.1 на векторном пространстве D определена структура кольца.

Рассмотрим прямое произведение $F \times D$ поля F и кольца D . Мы будем отождествлять элемент (f, e) с элементом $f \in F$ и элемент $(1, d)$ с элементом $d \in D$.

Пусть $\overline{M}$ - свободный модуль над кольцом $F \times D$, порождённый декартовым произведением $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$. Если $\overline{v}_1 \in \overline{V}_1, \dots, \overline{v}_n \in \overline{V}_n$, то соответствующий вектор из $\overline{M}$ мы будем обозначать $(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$. Пусть

$$\bar{i} : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \longrightarrow \overline{M}$$

инъекция, определённая по правилу

$$(12.4.3) \quad \bar{i}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) = (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$$

Пусть $\overline{N} \subset \overline{M}$ - векторное подпространство, порождённое элементами вида

$$(12.4.4) \quad (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i + \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n) - (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) - (\overline{v}_1, \dots, \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.4.5) \quad (\overline{v}_1, \dots, a\overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) - a(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.4.6) \quad (a_1, \dots, a_n)(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) - (a_1 \overline{v}_1, \dots, a_n \overline{v}_n)$$

$$(12.4.7) \quad (\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)(a_1, \dots, a_n) - (\overline{v}_1 a_1, \dots, \overline{v}_n a_n)$$

где $\overline{v}_i, \overline{w}_i \in \overline{V}_i$, $a \in F$, $a_i \in D_i$. Пусть

$$\bar{j} : \overline{M} \rightarrow \overline{M}/\overline{N}$$

каноническое отображение на фактормодуль. Рассмотрим коммутативную диаграмму

$$(12.4.8) \quad \begin{array}{ccc} & & \overline{M}/\overline{N} \\ & \nearrow \bar{f} & \\ \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\bar{i}} & \overline{M} \end{array}$$

Поскольку элементы (12.4.4) и (12.4.5) принадлежат ядру линейного отображения $\bar{j}$, то из равенства (12.4.3) следует

$$(12.4.9) \quad \bar{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i + \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n) = \bar{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) + \bar{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{w}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

$$(12.4.10) \quad \bar{f}(\overline{v}_1, \dots, a\overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n) = a\bar{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_i, \dots, \overline{v}_n)$$

Из равенств (12.4.9) и (12.4.10) следует, что отображение f полилинейно над полем F . Поскольку $\overline{M}$ - модуль с базисом $\overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n$, то согласно теореме [1]-1, на с. 104 для любого модуля $\overline{V}$ и любого полилинейного над F отображения

$$\overline{g} : \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n \longrightarrow \overline{V}$$

существует единственный гомоморфизм $\overline{k} : \overline{M} \rightarrow \overline{V}$, для которого коммутативна следующая диаграмма

$$(12.4.11) \quad \begin{array}{ccc} \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\overline{i}} & \overline{M} \\ & \searrow \overline{g} & \downarrow \overline{k} \\ & & \overline{V} \end{array}$$

Так как $\overline{g}$ - полилинейно над F , то $\ker \overline{k} \subseteq \overline{N}$. Согласно утверждению на с. [1]-94 отображение $\overline{j}$ универсально в категории гомоморфизмов модуля $\overline{M}$, ядро которых содержит $\overline{N}$. Следовательно, определён гомоморфизм

$$\overline{h} : \overline{M}/\overline{N} \rightarrow \overline{V}$$

для которого коммутативна диаграмма

$$(12.4.12) \quad \begin{array}{ccc} & \overline{M}/\overline{N} & \\ \nearrow \overline{j} & \downarrow \overline{h} & \\ \overline{M} & & \overline{V} \\ \searrow \overline{k} & & \end{array}$$

Объединяя диаграммы (12.4.8), (12.4.11), (12.4.12), получим коммутативную диаграмму

$$(12.4.13) \quad \begin{array}{ccccc} & & & \overline{M}/\overline{N} & \\ & & \nearrow \overline{f} & \downarrow \overline{h} & \\ \overline{V}_1 \times \dots \times \overline{V}_n & \xrightarrow{\overline{i}} & \overline{M} & \nearrow \overline{j} & \\ & \searrow \overline{g} & \downarrow \overline{k} & & \overline{V} \end{array}$$

Так как $\text{Im } \overline{f}$ порождает $\overline{M}/\overline{N}$, то отображение $\overline{h}$ однозначно определено. $\square$

Согласно доказательству теоремы 12.4.1

$$\overline{V}_1 \otimes \dots \otimes \overline{V}_n = \overline{M}/\overline{N}$$

Для $\overline{v}_i \in \overline{V}_i$ будем записывать

$$(12.4.14) \quad \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n = \overline{j}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n)$$

Из равенств (12.4.3) и (12.4.14) следует

$$(12.4.15) \quad \overline{f}(\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_n) = \overline{v}_1 \otimes \dots \otimes \overline{v}_n$$

Равенства (12.4.9) и (12.4.10) можно записать в виде

$$(12.4.16) \quad \begin{aligned} & \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes (\bar{v}_i + \bar{w}_i) \otimes \dots \otimes \bar{v}_n \\ &= \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_i \otimes \dots \otimes \bar{v}_n + \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{w}_i \otimes \dots \otimes \bar{v}_n \end{aligned}$$

$$(12.4.17) \quad \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes (a\bar{v}_i) \otimes \dots \otimes \bar{v}_n = a(\bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_i \otimes \dots \otimes \bar{v}_n)$$

Теорема 12.4.2. *Тензорное произведение $\bar{V}_1 \otimes \dots \otimes \bar{V}_n$ является бимодулем над тензорным произведением $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство утверждения теоремы аналогично доказательству утверждения теоремы 12.3.2. $\square$

Список литературы

- [1] Серж Ленг, Алгебра, М. Мир, 1968
- [2] S. Burris, H.P. Sankappanavar, A Course in Universal Algebra, Springer-Verlag (March, 1982),
eprint <http://www.math.uwaterloo.ca/~snburris/htdocs/ualg.html>
(The Millennium Edition)
- [3] П. К. Рашевский, Риманова геометрия и тензорный анализ, М., Наука, 1967
- [4] А. Г. Куроп, Общая алгебра, (лекции 1969 - 70 учебного года), М., МГУ, 1970
- [5] Lev V. Sabinin, Smooth Quasigroups and Loops, Kluwer Academic Publisher, 1999
- [6] Г. Корн, Т. Корн, Справочник по математике для научных работников и инженеров, М., Наука, 1974
- [7] I. Gelfand, S. Gelfand, V. Retakh, R. Wilson, Quasideterminants,
eprint [arXiv:math.QA/0208146](https://arxiv.org/abs/math.QA/0208146) (2002)
- [8] I. Gelfand, V. Retakh, Quasideterminants, I,
eprint [arXiv:q-alg/9705026](https://arxiv.org/abs/q-alg/9705026) (1997)
- [9] К. Фейс, Алгебра: кольца, модули и категории, том I, М., Мир, 1973
- [10] Александр Клейн, Введение в геометрию над телом,
eprint [arXiv:0906.0135](https://arxiv.org/abs/0906.0135) (2010)
- [11] Александр Клейн, Представление $\mathfrak{F}$ -алгебры,
eprint [arXiv:0912.3315](https://arxiv.org/abs/0912.3315) (2010)
- [12] Александр Клейн, Матрица линейных отображений,
eprint [arXiv:1001.4852](https://arxiv.org/abs/1001.4852) (2010)
- [13] Александр Клейн, Линейные отображения свободной алгебры,
eprint [arXiv:1003.1544](https://arxiv.org/abs/1003.1544) (2010)
- [14] П. Кон, Универсальная алгебра, М., Мир, 1968
- [15] I. M. Gelfand, M. I. Graev, Representation of Quaternion Groups over Locally Compact and Functional Fields,
Functs. Anal. Prilozh. **2** (1968) 20 - 35;
Izrail Moiseevich Gelfand, Semen Grigorevich Gindikin,
Izrail M. Gelfand: Collected Papers, volume II, 435 - 449,
Springer, 1989
- [16] Sir William Rowan Hamilton, The Mathematical Papers, Vol. III, Algebra, Cambridge at the University Press, 1967

Предметный указатель

- 1- $*$ - D -форма 87
- $\binom{a}{b}$ - $*$ -квазидетерминант 24
- $*$ -строка матрицы 16
- $*$ -матричная группа 72
- $*$ -обратный элемент бикольца 20
- $*$ -произведение матриц 18
- $*$ -степень 20
- $*$ - D -векторное пространство 54
- c -строка матрицы 16
- $D*$ -векторное пространство 54
- $D*$ -базис векторного пространства $*$ -строк 58
- $D*$ -вектор 57
- $D*$ -векторное пространство 54
- $D*$ -векторное пространство $*$ -строк 57
- $D*$ -представление группы 77
- $D*$ -компонента координат вектора $\bar{r}$ 92
- $D*$ -векторное пространство 52
- $D*$ -произведение вектора на скаляр 52
- D -векторное пространство 91
- $*$ - D -базис в векторном пространстве $*$ -строк 57
- $*$ - D -линейная оболочка в векторном пространстве 62
- $D*$ -базис, дуальный $*$ - D -базису в векторном пространстве 88
- $\binom{j}{i}$ - $*$ -квазидетерминант 23
- $*$ -строка матрицы 16
- $*$ -вырожденная матрица 64
- $*$ -главный минор 65
- $*$ -квазидетерминант 23
- $*$ -матричная группа 72
- $*$ -невыврожденная матрица 64
- $*$ -обратный элемент бикольца 20
- $*$ -произведение матриц 18
- $*$ -ранг матрицы 65
- $*$ -степень 19
- $*$ - D -линейно зависимые векторы 55
- $*$ - D -автоморфизм векторного пространства 75
- $*$ - D -базис в векторном пространстве 55
- $*$ - D -вектор 57
- $*$ - D -векторное пространство 55
- $*$ - D -векторное пространство $*$ -строк 57
- $*$ - D -изоморфизм векторных пространств 75
- $*$ - D -линейно независимые векторы 55
- $*$ - D -линейное отображение векторных пространств 59
- $*$ - D -линейным $T*$ -представление группы 77
- $R*$ -модуль 51
- r -строка матрицы 16
- $D*$ -произведением $*$ - D -линейного отображения A на скаляр 86
- $(*, S, *, T)$ -линейное отображение векторных пространств 58
- $(S*, *, T)$ -бимодуль 93
- $*$ - D -векторное пространство 52
- $*$ - R -модуль 51
- $*$ - D -компонента координат вектора $\bar{r}$ 92
- $*$ - T -представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M 27
- $*$ - T -преобразование 27
- $*$ - T -сдвиг 44
- $T*$ -векторное пространство матриц 53
- $T*$ -линейная комбинация векторов 53
- $T*$ -представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M 27
- $T*$ -преобразование 27
- $T*$ -сдвиг 43
- автоморфизм представления $\mathfrak{F}$ -алгебры 41
- активное $*$ - T -представление 79
- активное преобразование на множестве $*$ - D -базисов 79
- алгебра E кватернионов над полем F 118

- альтернативное представление матрицы 15
- бикольцо 19
- вырожденное линейное отображение D -векторного пространства 131
- вырожденное линейное отображение тела 111
- геометрический объект в координатном представлении, определённом в $*D$ -векторном пространстве 82
- геометрический объект типа A в векторном пространстве 83
- геометрический объект, определённый в $*D$ -векторном пространстве 82
- группа симметрии 80
- группа стабилизации 46
- дуальное пространство к $*D$ -векторному пространству 88
- закон ассоциативности для D -векторного пространства 52
- закон ассоциативности для $*D$ -линейных отображений векторных пространств 60
- закон ассоциативности для ковариантного T -представления 43
- закон ассоциативности для ковариантного T -представления 42
- закон ассоциативности для парных представлений 90
- закон дистрибутивности для D -векторного пространства 52
- закон унитарности для D -векторного пространства 52
- изоморфизм представлений Ω -алгебры 39
- категория T -представлений Ω -алгебры A 40
- категория T -представлений Ω_1 -алгебры из категории A 34
- ковариантное T -представление группы 42
- ковариантное T -представление группы 42
- кольцо имеет характеристику 0 101
- кольцо имеет характеристику p 101
- компонента линейного отображения D -векторного пространства 129
- компонента линейного отображения f тела 107
- компонента полилинейного отображения тела 114
- контравариантное T -представление группы 43
- контравариантное T -представление группы 42
- координатная матрица вектора в $*D$ -базисе 56
- координатная матрица множества векторов в векторном пространстве D - $*$ -строк 58
- координатная матрица множества векторов в векторном пространстве $*D$ -строк 57
- координатное $*D$ -векторное пространство 56
- координатное представление в $*D$ -векторном пространстве 82
- координатный $*D$ -изоморфизм 56
- координаты вектора в $*D$ -базисе 56
- координаты геометрического объекта в $*D$ -векторном пространстве 83
- координаты геометрического объекта в координатном $*D$ -векторном пространстве 82
- координаты множества векторов в D - $*$ -векторном пространстве 58
- координаты множества векторов в $*D$ -векторном пространстве 57
- координаты представления 81
- левое векторное пространство 52
- левостороннее представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M 27
- левостороннее преобразование 27
- левый модуль 51
- левый сдвиг на группе 43
- линейное отображение тела, порождённое отображением G 108
- линейное отображение D -векторных пространств над полем F 127
- линейное отображение тела 105
- лупа автоморфизмов представления 41
- малая группа 46
- матрица $*D$ -линейного отображения 59
- многообразие базисов $*D$ -векторного пространства 80
- морфизм представлений Ω_1 -алгебры в Ω_2 -алгебре 29
- морфизм представлений из f в g 29
- невырожденная система $*D$ -линейных уравнений 64
- невырожденное преобразование 43
- норма кватерниона 118
- образующая линейного отображения 108
- обращение Адамара матрицы 17
- однородное пространство группы 46
- однотранзитивное представление Ω -алгебры A 28
- орбита T -представления группы 44

- отображение колец полилинейное над коммутативным кольцом 112
- парные представления группы 49
- парные представления тела 89
- пассивное $\star T$ -представление 80
- пассивное преобразование на множестве $\star\star D$ -базисов 80
- полилинейное косо симметричное отображение 115
- полилинейное отображение (n) - D -векторных пространств 131
- полилинейное симметричное отображение 115
- правое векторное пространство 52
- правостороннее представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M 27
- правостороннее преобразование 27
- правый модуль 51
- правый сдвиг на группе 44
- представление Ω_1 -алгебры A в Ω_2 -алгебре M 28
- преобразование универсальной алгебры 27
- преобразование, согласованное с эквивалентностью 34
- принцип двойственности для бикольца 21
- принцип двойственности для бикольца матриц 21
- произведение геометрического объекта и константы 84
- произведение групп 95
- произведение морфизмов представлений универсальной алгебры 33
- произведением объектов в категории 94
- пространство орбит $T\star$ -представления 45
- прямое произведение D -векторных пространств 98
- прямое произведение $\star\star D$ -векторных пространств 97
- прямое произведение $T\star$ -представлений группы 45
- прямое произведение тел 95
- размерность $\star\star D$ -векторного пространства 75
- расширенная матрица $D_\star\star$ -линейных уравнений 68
- расширенная матрица $\star\star D$ -линейных уравнений 69
- свободное $T\star$ -представление группы 46
- символ Кронекера 17
- система $D_\star\star$ -линейных уравнений 63
- система $\star\star D$ -линейных уравнений 63
- стандартная F -компонента линейного отображения f 108
- стандартная компонента полилинейного отображения f тела 114
- стандартная компонента тензора 138
- стандартное F -представление линейного отображения тела 108
- стандартное представление матрицы 15
- стандартное представление полилинейного отображения тела 114
- стандартные координаты $\star\star D$ -базиса 81
- структурные константы тела D над полем F 103
- сумма $\star\star D$ -линейных отображений 86
- сумма геометрических объектов 84
- тензорное произведение D -векторных пространств 141
- тензорное произведение $D\star$ -векторных пространств 138
- тензорное произведение колец над коммутативным кольцом 134
- тензорное произведение тел 137
- тип векторного пространства 53
- транзитивное представление Ω -алгебры A 28
- центр кольца D 101
- частное линейное отображение переменной v^i 128
- эндоморфизм представления $\mathfrak{F}$ -алгебры 40
- эффективное $T\star$ -представление группы 46
- эффективное представление Ω -алгебры A 28
- эффективное представление тела 52
- ядро линейного отображения D -векторного пространства 130
- ядро линейного отображения тела 111
- ядро неэффективности $T\star$ -представления группы G 46

Специальные символы и обозначения

${}^j \det(A, *)_i$ $(\frac{a}{b})$ - $*$ -квазидетерминант 24

${}^b A_a$ минор 16

A_T минор 16

$S A$ минор 16

$A_{[a]}$ минор 16

$A_{[T]}$ минор 16

${}^{[b]} A$ минор 16

${}^{[S]} A$ минор 16

A_a $*$ -строка (s -строка) матрицы 16

$A_{s \cdot p \cdot i}^j$ компонента линейного отображения $\bar{A}$ D -векторного пространства 129

A^{n*} $*$ -степень элемента A бикольца 20

A^{-1*} $*$ -обратный элемент бикольца 20

$A * B$ $*$ -произведение матриц 18

${}^j \det(A, *)_i$ $(\frac{j}{i})$ - $*$ -квазидетерминант 23

$\mathfrak{A}(f)$ лупа автоморфизмов представления f 41

A_i^j частное линейное отображение переменной v^i 128

${}^b A$ $*$ -строка (r -строка) матрицы 16

A^{n*} $*$ -степень элемента A бикольца 19

A^{-1*} $*$ -обратный элемент бикольца 20

$A * B$ $*$ -произведение матриц 18

$\det(a, *)$ $*$ -квазидетерминант 23

$a = \begin{pmatrix} 1_a \\ \dots \\ n_a \end{pmatrix}$ $*$ - D -вектор 56

$\mathcal{L}(D_1; D_2)$ множество линейных отображений тела D_1 в тело D_2 107

$\mathcal{L}(R_1, \dots, R_n; S)$ множество полилинейных отображений колец $R_1, \dots, R_n$ в модуль S 112

$*t$ правый сдвиг 44

t_* левый сдвиг 43

$\mathcal{B}(\bar{V}, G)$ многообразие базисов $*$ - D -векторного пространства $\mathcal{V}$ 80

$B_1 \times \dots \times B_n$ произведением объектов $B_1, \dots, B_n$ в категории $\mathcal{A}$ 94

B_{ij}^k структурные константы тела D над полем F 103

D^n координатное $*$ - D -векторное пространство 56

$D_1 \times \dots \times D_n$ прямое произведение тел $D_1, \dots, D_n$ 95

D_n^m векторное пространство матриц 53

D_n D - $*$ -векторное пространство $*$ -строк 57

$D_1 \otimes \dots \otimes D_n$ тензорное произведение тел 137

$R_1 \otimes \dots \otimes R_n$ тензорное произведение колец 134

$D\star$ тип векторного пространства 53

$\bar{e} = (\bar{e}_i, i \in I)$ базис в векторном пространстве 55

$(\bar{e}_{1 \cdot i_1}, \dots, \bar{e}_{n \cdot i_n})$ базис (n) -векторного пространства 97

$E(F, a, b)$ алгебра кватернионов над полем F 118

${}^i f_j$ координаты базиса в $*$ - D -векторном пространстве $*$ -строк 57

${}^i f_j$ координаты базиса в D - $*$ -векторном пространстве $*$ -строк 58

$\bar{f} = \begin{pmatrix} \bar{f}_1 & \dots & \bar{f}_n \end{pmatrix}$ базис в $*$ - D -векторном пространстве $*$ -строк 57

$\bar{f} = \begin{pmatrix} {}^1 \bar{f} & \dots & {}^n \bar{f} \end{pmatrix}$ базис в D - $*$ -векторном пространстве $*$ -строк 58

$f_{k \cdot s_{k \cdot p}}$ компонента линейного отображения f тела 107

$s \cdot p f^n$ компонента полилинейного отображения тела 114

$f(G)v$ орбита представления группы G 44

f_G^{ij} стандартная F -компонента
линейного отображения f 108
 $f_t^{i_0 \dots i_n}$ стандартная компонента
полилинейного отображения f тела
114
 $f^{s_1 \dots s_n}$ стандартная компонента тензора
138

GL_n^{*D} $*$ -матричная группа 72

G_x малая группа элемента x 46

vG орбита ковариантного эффективного
 $\star T$ -представления группы 47

Gv орбита ковариантного эффективного
 $T\star$ -представления группы 47

$G_1 \times \dots \times G_n$ произведение групп $G_1, \dots,$
 G_n 95

GL_n^{*D} $*$ -матричная группа 72

G_x группа стабилизации элемента x 46

HA обращение Адамара матрицы 17

H алгебра кватернионов над полем
действительных чисел 118

$\ker \bar{A}$ ядро линейного отображения D -
векторного пространства 130

$\ker f$ ядро линейного отображения тела
111

$\bar{e}_*^* A$ пассивное преобразование 80

$\mathcal{L}(D_*^*; \bar{V}; \bar{W})$ $*$ - D -векторное
пространство D_*^* -линейных
отображений D_*^* -векторного
пространства $\bar{V}$ в D_*^* -векторное
пространство $\bar{W}$ 85

$\mathcal{L}(D; \bar{V}; \bar{W})$ множество линейных
отображений D -векторного
пространства $\bar{V}$ в D -векторное
пространство $\bar{W}$ 127

$\mathcal{L}(D; \bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n; \bar{W}_1, \dots, \bar{W}_m)$ множество
полилинейных отображений 131

$\mathcal{L}(*D; \bar{V}; \bar{W})$ D_*^* -векторное
пространство $*$ - D -линейных
отображений $*$ - D -векторного
пространства $\bar{V}$ в $*$ - D -векторное
пространство $\bar{W}$ 85

$\mathcal{L}(*T; S; R)$ множество $\star T$ -представлений
тела S в аддитивной группе тела R
85

$\mathcal{L}(T^*; S; R)$ множество $T\star$ -представлений
тела S в аддитивной группе тела R
85

M^* множество $\star T$ -преобразований
множества M 27

$*M$ множество преобразований
множества M 28

$*M$ множество $T\star$ -преобразований
множества M 27

$M/\star t(G)$ пространство орбит $\star T$ -
ковариантного эффективного
представления группы 47

$M/t_\star(G)$ пространство орбит $T\star$ -
ковариантного эффективного
представления группы 47

$M/f(G)$ пространство орбит $T\star$ -
представления группы G в
множестве M 45

$(A(G)^{-1} *^* w, \bar{e}_{\bar{V}} *^* G)$ геометрический
объект в координатном
представлении, определённом в $*$ - D -
векторном пространстве 82

$(A(G)^{-1} *^* w, \bar{e}_{\bar{N}} *^* A(G), \bar{e}_{\bar{V}} *^* G)$
геометрический объект,
определённый в $*$ - D -векторном
пространстве 82

$A_*^* \bar{e}$ активное преобразование 79

D^n $*$ - D -векторное пространство $*$ -строк
57

$\text{rank}_* A$ $*$ -ранг матрицы 68

r^* $D\star$ -компонента координат вектора $\bar{r}$
91

$\text{rank}_* A$ $*$ -ранг матрицы 65

$*r$ $\star D$ -компонента координат вектора $\bar{r}$
92

$\text{span}(\bar{A}_i, i \in I)$ линейная оболочка в
векторном пространстве 62

$T \star A$ категория $T\star$ -представлений Ω_1 -
алгебры A 40

$T \star \mathcal{A}$ категория $T\star$ -представлений Ω_1 -
алгебры из категории $\mathcal{A}$ 34

$\bar{V}_1 \times \dots \times \bar{V}_n$ прямое произведение $*$ - D_i
-векторных пространств $\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_n$
97

$\bar{V}^*$ дуальное пространство к $*$ - D -
векторному пространству $\bar{V}$ 88

$D_*^* \bar{V}$ D_*^* -векторное пространство 54

$\bar{D}_*^* \bar{V}$ D_*^* -векторное пространство 54

$\bar{V}_*^* D$ $*$ - D -векторное пространство 54

$\bar{V}_*^* D$ $*$ - D -векторное пространство 55

$\bar{V}_1 \otimes \dots \otimes \bar{V}_n$ тензорное произведение D -
векторных пространств 141

$\bar{V}_1 \otimes \dots \otimes \bar{V}_n$ тензорное произведение
 $D\star$ -векторных пространств 138

$Z(D)$ центр кольца D 101

δ тождественное преобразование 27

δ_j^i символ Кронекера 17

$\prod_{i \in I} D_i$ прямое произведение тел $D_i, i \in I$
95

$\prod_{i=1}^n D_i$ прямое произведение тел $D_1, \dots,$
 D_n 95

$\prod_{i \in I} \overline{V}_i$ прямое произведение $*^* D_i$ -
 векторных пространств $\overline{V}_i, i \in I$ 97

$\prod_{i=1}^n \overline{V}_i$ прямое произведение $*^* D_i$ -
 векторных пространств $\overline{V}_1, \dots, \overline{V}_n$
 97

$\prod_{i \in I} G_i$ произведение групп $G_i, i \in I$ 95

$\prod_{i=1}^n G_i$ произведение групп $G_1, \dots, G_n$ 95

$\prod_{i \in I} B_i$ произведением объектов
 $\{B_i, i \in I\}$ в категории $\mathcal{A}$ 94

$\prod_{i=1}^n B_i$ произведением объектов $B_1, \dots,$
 B_n в категории $\mathcal{A}$ 94